

Varianssianalyysi ja ei-parametriset menetelmät

Jyrki Möttönen

Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, kevät 2014

Esimerkkiaineisto 1/4

Luento-esimerkeissä käytetään Suomen ESS2010-aineistoa (European Social Survey). Halutaan tutkia mm. seuraavia kysymyksiä:

- Onko luottamus instituutioihin keskimäärin yhtä suuri miehillä ja naisilla?
- Onko luottamus instituutioihin keskimäärin yhtä suuri uskonnollisuuden mukaan jaettujen ryhmien välillä? Jos luottamuksissa on eroa, niin minkä ryhmien välillä?
- Onko luottamus instituutioihin keskimäärin yhtä suuri eri koulutusasteen ihmisillä? Jos luottamuksissa on eroa, niin minkä ryhmien välillä?
- Onko koulutusasteella ja uskonnollisuudella yhdysvaikutusta luottamukseen instituutioihin, ts. onko koulutusasteryhmien keskiarvoissa tapahtuva muutos erilaista eri uskonnollisuusryhmissä?

Johdanto

- Verrataan yhden tai useamman ryhmittelymuuttujan vaikutusta jatkuvan muuttujan vaihteluun.
- Kahden riippumattoman otoksen t-testissä perusjoukko on jaettu kahteen ryhmään.
- Yksisuuntainen varianssianalyysi on kahden riippumattoman otoksen t-testin yleistys tilanteeseen, jossa perusjoukko on jaettu useampaan kuin kahteen ryhmään.
- Kaksisuuntaisessa varianssianalyysissä perusjoukko on jaettu ryhmiin kahden ryhmittelymuuttujan perusteella.
- Tutkitaan sekä havaintojen vaihtelua ryhmien sisällä että ryhmäkeskiarvojen vaihtelua koko populaatiossa.
- Ennen varianssianalyysin suorittamista olisi tutkittava varianssien yhtäsuuruutta eri ryhmissä sekä normaalijakaumaoletuksen voimassaoloa.

Esimerkkiaineisto 2/4

Käytettävät muuttujat:

- *luottamus*: Muuttujien *trstprl*, *trstlgl*, *trstplc*, *trstplt*, *trstprt*, *trstep*, *trstun* painotettu summa, jossa painot on valittu siten, että *luottamus* selittäisi mahdollisimman suuren osuuden muuttujien *trstprl*, ..., *trstun* vaihtelusta (pääkomponentti-analyysin ensimmäisen pääkomponentin pistemäärä). Kaikki painot ovat positiivisia, joten pieni muuttujan *luottamus* arvo viittaa vähäiseen luottamukseen ja suuri muuttujan arvo suureen luottamukseen instituutioita kohtaan.

Esimerkkiaineisto 3/4

Käytettävät muuttujat:

- *sukupuoli*: Muuttuja *gndr* (Gender). 1=Mies, 2=Nainen.
- *uskonnollisuus*: Muuttujasta *rlgdgr* (How religious are you) tehty viisiluokkainen järjestysasteikon muuttuja. (0 – 1 → 1, 2 – 3 → 2, 4 – 6 → 3, 7 – 8 → 4, 9 – 10 → 5). Pieni arvo viittaa vähäiseen uskonnollisuuteen ja suuri arvo voimakkaaseen uskonnollisuuteen.
- *vasenoikea*: Muuttujasta *lrscale* (Placement on left right scale) tehty kolmiluokkainen järjestysasteikon muuttuja. (0 – 3 → 1, 4 – 6 → 2, 7 – 10 → 3). Pieni arvo viittaa vasemmistolaisuuteen ja suuri arvo oikeistolaisuuteen.

Normaalisuusoletukseen perustuva testi

Kahden riippumattoman otoksen t-testi

- Kahden riippumattoman otoksen t-testissä perusjoukko on jaettu kahteen ryhmään.
- Tutkitaan onko jatkuvan muuttujan arvot keskimäärin yhtäsuuria vertailtavien ryhmien välillä.

5

7

Esimerkkiaineisto 4/4

Käytettävät muuttujat:

- *koulutusaste*: Muuttujasta *edlvdfi* (Highest level of education, Finland) tehty viisiluokkainen järjestysasteikon muuttuja. (1 – 3 → 1, 4 – 6 → 2, 7 – 8 → 3, 9 – 11 → 4, 12 – 14 → 5). Pieni arvo viittaa alhaiseen koulutustasoon ja suuri arvo korkeaan koulutustasoon. 1="Perusaste", 2="Keskiaste", 3="Alin korkea-aste", 4="Alempi korkeakouluaste", 5="Ylempi korkeakouluaste+tutkijakouluaste".

Normaalisuusoletukseen perustuva testi

Mallioletukset 1/2

Malli 1: Ryhmien hajonnat voivat olla erisuuret

- Ensimmäisen ryhmän havainnot tulevat normaalijakaumasta $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, ts. normaalijakaumasta, jonka odotusarvo on μ ja hajonta σ_1 .
- Toisen ryhmän havainnot tulevat normaalijakaumasta $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ eli ryhmän odotusarvo voi poiketa ensimmäisen ryhmän odotusarvosta ja keskihajonta voi erota ensimmäisen ryhmän keskihajonnasta.

Malli 2: Ryhmien hajonnat ovat yhtäsuuret

- Ensimmäisen ryhmän havainnot tulevat normaalijakaumasta $N(\mu_1, \sigma^2)$.
- Toisen ryhmän havainnot tulevat normaalijakaumasta $N(\mu_2, \sigma^2)$ eli ryhmän odotusarvo voi poiketa ensimmäisen ryhmän odotusarvosta ja keskihajonta on sama kuin ensimmäisessä ryhmässä


6

8

Mallioletukset 2/2

- Varianssien yhtäsuuruuden testauksen avulla voidaan päättää kumpaa mallia käytetään (mallia 1 tai 2). Testaukseen voidaan käyttää esimerkiksi Levenen testiä.
- Normaalijakaumaoletuksen tutkimiseen voidaan käyttää esimerkiksi todennäköisyyspaperikuvaa (Q-Q Plot). Mitä paremmin pisteet asettuvat suoralle, sitä lähempänä jakauma on normaalijakaumaa.

Muuttujan *luottamus* jakauma miesten ja naisten joukossa



9

Testattava hypoteesi ja testisuure

Halutaan testata hypoteesia


$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

eli hypoteesia

H_0 : Ryhmien odotusarvot eli populaatiokeskiarvot ovat yhtäsuuret


- Jos ryhmien varianssit ovat yhtäsuuret (malli 2), niin hypoteesin H_0 testaukseen käytetään *t-testisuuretta* ja p-arvon laskemiseen *t-jakaumaa*.
- Jos ryhmien varianssit ovat erisuuret (malli 1), niin hypoteesin H_0 testaukseen käytetään *t-testisuuretta* (hiukan erilainen kaava kuin mallin 2 tapauksessa) ja *likimääräisen* p-arvon laskemiseen t-jakaumaa.

Todennäköisyyspaperikuva luottamus-muuttujalle miesten joukossa



10

Todennäköisyyspaperikuva luottamus-muuttujalle naisten joukossa



13

Kahden riippumattoman otoksen t-testi

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means			
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
luottamus	Equal variances assumed	.708	.400	-1.004	498	.316	-.36307
	Equal variances not assumed			-1.004	496.708	.316	-.36307

		t-test for Equality of Means		
		Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
			Lower	Upper
luottamus	Equal variances assumed	.36169	-1.07370	.34756
	Equal variances not assumed	.36169	-1.07371	.34757

15

Yksinkertaisia tunnuslukuja luottamus-muuttujalle sukupuolittain

Group Statistics

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
luottamus	mies	250	14.1587	4.14568	.26220
	nainen	250	14.5218	3.93940	.24915

14

Mannin-Whitney testi

Kahden riippumattoman otoksen t-testi olettaa havaintojen tulevan normaalijakaumasta. Jos huomataan, että havainnot eivät tulekaan normaalijakaumasta, niin ryhmien välisiä eroja voi tutkia ei-parametrisella Mannin-Whitney testillä. Ei-parametrisuus tarkoittaa tässä sitä, että havaintojen jakaumasta tehdään hyvin vähän oletuksia. Ainoastaan oletetaan, että havainnot tulevat jatkuvista samanmuotoisista jakaumista. Mannin-Whitney testisuure perustuu havainnoista laskettuihin järjestyslukuihin.

16

Mallioletukset

Oletukset:

- Ensimmäisen ryhmän havainnot tulevat jatkuvasta jakaumasta, jonka mediaani on τ_1 .
- Toisen ryhmän havainnot tulevat jatkuvasta jakaumasta, jonka mediaani on τ_2 .
- Havainnot tulevat *samanmuotoisista* jatkuvista jakaumista (voi olla myös vino jakauma).

Huom. Toinen oletus tarkoittaa sitä, että jakaumien tiheysfunktiot ovat täsmälleen samanmuotoisia mutta jakaumien sijainti voi vaihdella.

Testattava hypoteesi ja testisuure

Halutaan testata hypoteesia

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2$$

eli hypoteesia

$$H_0 : \text{Ryhmien mediaanit ovat yhtäsuuret}$$

Nollahypoteesin H_0 testaukseen voidaan käyttää Mannin-Whitneyn testisuuretta ja p-arvon laskemiseen voi käyttää tarkkaa jakaumaa tai normaaliapproksimaatiota.

Mannin-Whitneyn testi

Yksisuuntainen varianssianalyysi

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of luottamus is the same across categories of sukupuoli.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.441	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

- Yksisuuntaisessa varianssianalyysissä perusjoukko on jaettu k :hon ryhmään.
- Tutkitaan onko jatkuvan muuttujan arvot keskimäärin yhtäsuuria vertailtavien ryhmien välillä.

Mallioletukset 1/3

Vaihtoehto 1: Ryhmien hajonnat voivat olla erisuuret

- Ensimmäisen ryhmän havainnot (n_1 kpl) tulevat normaalijakaumasta $N(\mu_1, \sigma_1^2)$.
- Toisen ryhmän havainnot (n_2 kpl) tulevat normaalijakaumasta $N(\mu_2, \sigma_2^2)$.
- ...
- k :nnen ryhmän havainnot (n_k kpl) tulevat normaalijakaumasta $N(\mu_k, \sigma_k^2)$.

21

Mallioletukset 3/3

- Varianssien yhtäsuuruuden testauksen avulla voidaan päättää kumpaa mallia käytetään (vaihtoehtoa 1 tai 2). Testaukseen voidaan käyttää Levenen testiä.
- Normaalijakaumaoletuksen tutkimiseen voidaan käyttää todennäköisyyspaperikuvaa (Q-Q Plot).

23

Mallioletukset 2/3

Vaihtoehto 2: Ryhmien hajonnat ovat yhtäsuuret

- Ensimmäisen ryhmän havainnot (n_1 kpl) tulevat normaalijakaumasta $N(\mu_1, \sigma^2)$.
- Toisen ryhmän havainnot (n_2 kpl) tulevat normaalijakaumasta $N(\mu_2, \sigma^2)$.
- ...
- k :nnen ryhmän havainnot (n_k kpl) tulevat normaalijakaumasta $N(\mu_k, \sigma^2)$.

22

Testattava hypoteesi ja testisuure

Halutaan testata hypoteesia

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

eli hypoteesia

H_0 : Ryhmien odotusarvot eli populaatiokeskiarvot ovat yhtäsuuret

- Jos ryhmien varianssit ovat yhtäsuuret (malli 2), niin hypoteesin H_0 testaukseen käytetään *F-testisuuretta* ja p-arvon laskemiseen *F-jakaumaa*.
- Jos ryhmien varianssit ovat erisuuret (malli 1), niin hypoteesin H_0 testaukseen voi käyttää esimerkiksi *Welchin testisuuretta* ja *likimääräisen* p-arvon laskemiseen F-jakaumaa.


24

Pareittaiset vertailut (post hoc testit)

- Jos yksisuuntaisessa varianssianalyysissä H_0 hylätään, niin ainakin kahden ryhmän odotusarvot ovat erisuuria.
- Varianssianalyysi ei anna vastausta siihen mitkä odotusarvot eroavat toisistaan! Siihen kysymykseen voidaan etsiä vastausta parittaisten vertailujen testien avulla.

25

Muuttujan *luottamus* jakauma uskonnollisuusryhmittäin



27

Pareittaiset vertailut (post hoc testit)

Parittaisin vertailuihin on kehitetty lukuisa joukko erilaisia testejä. Field (2009) ehdottaa seuraavia yleisiä ohjeita testin valintaan.

- Populaatiohajonnat yhtäsuuria
 - Otoskoot n_i yhtäsuuria \Rightarrow REGWQ tai Tukey.
 - Otoskoot n_i eroavat vain hiukan \Rightarrow Gabriel.
 - Otoskoot n_i eroavat paljon \Rightarrow Hochberg's GT2.
- Populaatiohajonnat erisuuria \Rightarrow Games-Howell

26

Yksinkertaisia tunnuslukuja luottamus-muuttujalle uskonnollisuusryhmittäin

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
1.00	100	12.5251	4.89467	.48947	11.5539	13.4963	.50	23.05
2.00	100	13.6921	4.57804	.45780	12.7837	14.6005	2.50	24.45
3.00	100	13.9333	4.38555	.43856	13.0631	14.8035	3.28	22.69
4.00	100	14.8803	4.18595	.41859	14.0497	15.7109	2.77	23.49
5.00	100	14.9863	4.46116	.44612	14.1011	15.8715	1.82	24.30
Total	500	14.0034	4.57798	.20473	13.6012	14.4057	.50	24.45

28

Varianssien yhtäsuuruuden testaus uskonnollisuusryhmien välillä

Test of Homogeneity of Variances

luottamus

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.533	4	495	.191

Yksisuuntainen varianssianalyysi *luottamus*-muuttujalle. Ryhmittelijänä *uskonnollisuus*. Ryhmittäiset populaatiovarianssit oletettu yhtäsuuriksi.

ANOVA

luottamus

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	402.216	4	100.554	4.950	.001
Within Groups	10055.774	495	20.315		
Total	10457.990	499			

Yksisuuntainen varianssianalyysi *luottamus*-muuttujalle. Ryhmittelijänä *uskonnollisuus*. Ryhmittäiset populaatiovarianssit voivat erota.

Robust Tests of Equality of Means

luottamus

	Statistic ^a	df1	df2	Sig.
Welch	4.638	4	247.341	.001

a. Asymptotically F distributed.

Pareittaiset vertailut


Multiple Comparisons

Dependent Variable: luottamus
Tukey HSD

(I) uskonnollisuus	(J) uskonnollisuus	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1.00	2.00	-1.16695	.63741	.357	-2.9121	.5782
	3.00	-1.40816	.63741	.178	-3.1533	.3370
	4.00	-2.35515	.63741	.002	-4.1003	-.6100
	5.00	-2.46118	.63741	.001	-4.2063	-.7160
2.00	1.00	1.16695	.63741	.357	-.5782	2.9121
	3.00	-.24122	.63741	.996	-1.9864	1.5039
	4.00	-1.18821	.63741	.338	-2.9333	.5569
	5.00	-1.29424	.63741	.253	-3.0394	.4509
3.00	1.00	1.40816	.63741	.178	-.3370	3.1533
	2.00	.24122	.63741	.996	-1.5039	1.9864
	4.00	-.94699	.63741	.572	-2.6921	.7982
	5.00	-1.05302	.63741	.465	-2.7982	.6921
4.00	1.00	2.35515	.63741	.002	.6100	4.1003
	2.00	1.18821	.63741	.338	-.5569	2.9333
	3.00	.94699	.63741	.572	-.7982	2.6921
	5.00	-.10603	.63741	1.000	-1.8512	1.6391
5.00	1.00	2.46118	.63741	.001	.7160	4.2063
	2.00	1.29424	.63741	.253	-.4509	3.0394
	3.00	1.05302	.63741	.465	-.6921	2.7982
	4.00	.10603	.63741	1.000	-1.6391	1.8512

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Luottamus-muuttujan keskiarvot uskonnollisuusryhmissä



33

Mallioletukset

Oletukset:

- Ryhmän i havainnot (n_i kpl) tulevat jatkuvasta jakaumasta, jonka mediaani on τ_i , $i=1,2,\dots,k$.
- Havainnot tulevat *samanmuotoisista* jatkuvista jakaumista (voi olla myös vino jakauma).

Huom. Toinen oletus tarkoittaa sitä, että jakauman tiheysfunktio on täsmälleen samanmuotoinen mutta jakauman sijainti voi vaihdella. Esimerkiksi normaalijakaumien $N(0, 1)$, $N(2, 1)$, $N(4, 1)$ tiheysfunktiot ovat täsmälleen samanmuotoisia (koska hajonnat ovat samoja), ainoastaan sijainnit eroavat toisistaan.

35

Kruskalin-Wallis testin testi

Edellä käsitelty klassinen yksisuuntainen varianssianalyysi olettaa havaintojen tulevan normaalijakaumasta. Jos huomataan, että havainnot eivät tulekaan normaalijakaumasta, niin ryhmien välisiä eroja voi tutkia ei-parametrisella Kruskalin-Wallis testillä. Ei-parametrisuus tarkoittaa tässä sitä, että havaintojen jakaumasta tehdään hyvin vähän oletuksia. Ainoastaan oletetaan, että havainnot tulevat jatkuvista samanmuotoisista jakaumista. Kruskalin-Wallis testisuure perustuu havainnoista laskettuihin järjestyslukuihin.

34

Testattava hypoteesi ja testisuure

Halutaan testata hypoteesia

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_k$$

eli hypoteesia

$$H_0 : \text{Ryhmien mediaanit ovat yhtäsuuret}$$

Nollahypoteesin H_0 testaukseen voidaan käyttää Kruskalin-Wallis testisuuretta ja likimääräisen p-arvon laskemiseen χ^2 -jakaumaa.

36

Kruskalin-Wallis testisuureen yhteys varianssianalyysin F -testisuureeseen

Jos käytetään tavallisen F -testisuureen laskemiseen alkuperäisten havaintojen sijasta niiden järjestyslukuja, niin huomataan, että saatu testisuure on yhtäpitävä Kruskalin-Wallis testisuureen kanssa. Laskettaessa (esim. SPSS:n avulla) järjestyslukuaineistolle yksisuuntaisen varianssianalyysin p -arvo, niin Kruskal-Wallis testin pitäisi antaa suurinpiirtein sama p -arvo.

37

Kruskalin-Wallis testi *luottamus*-muuttujalle. Ryhmittelijänä *uskonnollisuus*.

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of <i>luottamus</i> is the same across categories of <i>uskonnollisuus</i> .	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	.001	Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

39

Kruskalin-Wallis testin käyttörajoitus

Kruskalin-Wallis testillä on hyvin lievät jakaumaoletukset. Havaintojen oletetaan ainoastaan tulevan joistain (tuntemattomista) jatkuvista samanmuotoisista jakaumista. Testi ei kuitenkaan sovellu aineistoihin, joissa ryhmittäiset varianssit eroavat selvästi toisistaan. Tällöin jakaumaoletus "kaikki havainnot tulevat *samanmuotoisesta* jatkuvasta jakaumasta" ei täyty.

38

Kaksisuuntainen varianssianalyysi

- Kaksisuuntaisessa varianssianalyysissä perusjoukko on jaettu ryhmiin kahden ryhmittelymuuttujan perusteella.
- Tarkoituksena on tutkia onko kahden ryhmittelymuuttujan välillä yhdysvaikutusta jatkuvan muuttujan arvoihin, ts. onko ensimmäisen ryhmittelymuuttujan keskiarvoissa tapahtuva muutos erilaista toisen ryhmittelymuuttujan eri ryhmissä.
- Jos ryhmittelymuuttujien välillä ei ole yhdysvaikutusta, niin sen jälkeen voidaan tutkia ryhmittelymuuttujien omavaikutuksia jatkuvan muuttujien arvoihin.

40

Tilastollinen malli

Olkoon A ensimmäinen ryhmittelymuuttuja, jolla on a ryhmää ja B toinen ryhmittelymuuttuja, jolla on b ryhmää. Jatkuvan muuttujan y arvot voidaan luokitella nyt $a \cdot b$ soluun seuraavasti:

A	B			
	1	2	...	b
1	$y_{111}, y_{112} \dots$	$y_{121}, y_{122} \dots$...	$y_{1b1}, y_{1b2} \dots$
2	$y_{211}, y_{212} \dots$	$y_{221}, y_{222} \dots$...	$y_{2b1}, y_{2b2} \dots$
...
a	y_{a11}, y_{a12}, \dots	$y_{a21}, y_{a22} \dots$...	$y_{ab1}, y_{ab2} \dots$

Esim. y =luottamus, A =uskonnollisuus, $a = 5$, B =koulutusaste, $b = 5$, solujen lukumäärä on $a \cdot b = 25$.

Tilastollinen malli

Yksittäisen solun havaintojen odotusarvo voidaan nyt jakaa osiin seuraavasti:

$$\mu_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij}, \quad i = 1, \dots, a, \quad j = 1, \dots, b,$$

jossa α_i on luokittelumuuttujan A i :n tason vaikutus, β_j on luokittelumuuttujan B j :n tason vaikutus ja $(\alpha\beta)_{ij}$ on luokittelumuuttujien A ja B yhdysvaikutus.

Jos yhdysvaikutusta ei ole (eli $(\alpha\beta)_{ij} = 0$ kaikilla i, j), niin $\mu_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j$. Tällöin odotusarvojen erot muuttujan B ryhmien välillä ovat samoja luokittelumuuttujan A ryhmässä. Luonnollisesti myös odotusarvojen erot muuttujan A ryhmien välillä ovat samoja luokittelumuuttujan B ryhmässä. Esimerkiksi, $\mu_{i2} - \mu_{i1} = \beta_2 - \beta_1$ ja $\mu_{i3} - \mu_{i1} = \beta_3 - \beta_1$ kaikilla $i = 1, \dots, a$.

Tilastollinen malli

Mallioletukset:

- Solun ($A = i, B = j$) havainnot tulevat normaalijakaumasta, jonka odotusarvo μ_{ij} ja varianssi σ^2 , $i = 1, \dots, a$, $j = 1, \dots, b$.
- Kaikki havainnot ovat riippumattomia.

Huom! Yksittäisen solun havainnot tulevat samasta jakaumasta mutta eri soluissa voi olla eri odotusarvot.

Esimerkki: Luokittelumuuttujat ovat kaksiluokkaisia 1/6

Esim. Oletetaan, että meillä on jatkuvana muuttujana *luottamus* ja seuraavanlaiset luokittelumuuttujat

$A =$ sukupuoli ($A=1$ ="Mies", $A=2$ ="Nainen") ja

$B =$ työssäkäynti ($B=1$ ="Työtön", $B=2$ ="Työssäkäyvä")

Oletetaan lisäksi, että $\alpha_1 = \beta_1 = (\alpha\beta)_{11} = (\alpha\beta)_{12} = (\alpha\beta)_{21} = 0$.

Tällöin solujen havaintojen odotusarvot ovat seuraavat:

Sukupuoli	Työssäkäynti	
	Työtön	Työssäkäyvä
Mies	μ	$\mu + \beta_2$
Nainen	$\mu + \alpha_2$	$\mu + \alpha_2 + \beta_2 + (\alpha\beta)_{22}$

Esimerkki: Luokittelumuuttujat ovat kaksiluokkaisia 2/6

Edellisiä odotusarvoja voidaan estimoida havaintoaineistosta laskettujen keskiarvojen avulla. Oletetaan, että on saatu seuraavanlaiset keskiarvot:


Sukuopuoli	Työssäkäynti	
	Työtön	Työssäkäyvä
Mies	$\bar{x}_{11}=13.3$	$\bar{x}_{12}=14.1(=13.3+0.8)$
Nainen	$\bar{x}_{21}=13.7(=13.3+0.4)$	$\bar{x}_{22}=14.55(=13.3+0.4+0.8+0.05)$

Kun verrataan työttömien ja työssäkäyvien luottamuksen eroa, niin naisilla luottamus kasvaa 0.05 verran enemmän kuin miehillä. Varianssianalyysin avulla voidaan testata onko tämä sukupuolten välinen ero merkitsevä eli testataan onko $(\alpha\beta)_{22} = 0$. Jos testin tulos viittaisi siihen, että $(\alpha\beta)_{22} \neq 0$, niin työssäkäymisellä ja sukupuolella olisi yhdysvaikutusta.

45

Esimerkki: Luokittelumuuttujat ovat kaksiluokkaisia 4/6

Keskiarvot miesten ja naisten ryhmässä työssäkäynnin mukaan jaoteltuna. Suorat ovat lähes samansuuntaisia, joten (ainakaan mitään suurta) yhdysvaikutusta ei ole sukupuolen ja työssäkäynnin välillä.



47

Esimerkki: Luokittelumuuttujat ovat kaksiluokkaisia 3/6

Jos muuttujilla *sukupuoli* ja *työssäkäynti* on yhdysvaikutusta (eli $(\alpha\beta)_{22} \neq 0$), niin

- ryhmien "Työtön" ja "Työssäkäyvä" odotusarvojen ero on erisuuri miesten ja naisten joukossa.
- ryhmien "Mies" ja "Nainen" odotusarvojen ero on erisuuri työttömien ja työssäkäyvien joukossa.


Jos muuttujilla *sukupuoli* ja *työssäkäynti* ei ole yhdysvaikutusta (eli $(\alpha\beta)_{22} = 0$), niin

- ryhmien "Työtön" ja "Työssäkäyvä" odotusarvojen ero on sama miesten ja naisten joukossa.
- ryhmien "Mies" ja "Nainen" odotusarvojen ero on sama työttömien ja työssäkäyvien joukossa.

46

Esimerkki: Luokittelumuuttujat ovat kaksiluokkaisia 5/6


Keskiarvot työttömien ja työssäkäyvien ryhmässä sukupuolen mukaan jaoteltuna.



48

Esimerkki: Luokittelumuuttujat ovat kaksiluokkaisia 6/6

Tässä on vielä esimerkki keskiarvokuviosta, kun muuttujien välillä on selkeä yhdysvaikutus. Suorat ovat selkeästi erisuuntaisia.



49

Itsenäisten vaikutusten eli päävaikutusten testaus 1/2

Jos yhdysvaikutuksen testauksen perusteella muuttujilla ei todeta tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta, niin sen jälkeen voidaan tutkia luokittelumuuttujan A itsenäistä vaikutusta.

Luokittelumuuttujan A itsenäisen vaikutuksen testaus, kun yhdysvaikutusta ei ole. Nollahypoteesina on

$$H_0 : \alpha_1 = \dots = \alpha_a = 0.$$

eli

$$H_0 : \text{Muuttujalla } A \text{ ei ole itsenäistä vaikutusta}$$

Nollahypoteesin testaukseen käytetään jälleen F -testisuuretta, joka noudattaa F -jakaumaa nollahypoteesin vallitessa.

Huom: H_0 on yksisuuntaisen varianssianalyysin nollahypoteesi.

51

Yhdysvaikutuksen testaus

Ensimmäiseksi testataan aina yhdysvaikutuksen olemassaolo. Nollahypoteesina on nyt

$$H_0 : (\alpha\beta)_{ij} = 0, \quad i = 1, \dots, a, \quad j = 1, \dots, b.$$

eli

$$H_0 : \text{Muuttujilla } A \text{ ja } B \text{ ei ole yhdysvaikutusta.}$$

Nollahypoteesin testaukseen käytetään F -testisuuretta, joka noudattaa F -jakaumaa nollahypoteesin vallitessa.

50

Itsenäisten vaikutusten eli päävaikutusten testaus 2/2

Jos yhdysvaikutuksen testauksen perusteella muuttujilla ei todeta tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta, niin sen jälkeen voidaan tutkia luokittelumuuttujan B itsenäistä vaikutusta.

Luokittelumuuttujan B itsenäisen vaikutuksen testaus, kun yhdysvaikutusta ei ole. Nollahypoteesina on

$$H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_b = 0.$$

eli

$$H_0 : \text{Muuttujalla } B \text{ ei ole itsenäistä vaikutusta}$$

Nollahypoteesin testaukseen käytetään jälleen F -testisuuretta, joka noudattaa F -jakaumaa nollahypoteesin vallitessa.

Huom: H_0 on yksisuuntaisen varianssianalyysin nollahypoteesi.

52

Testauksesta

- Tekijöiden A ja B itsenäisiä vaikutuksia eli päävaikutuksia ei voida tarkastella erillisinä, jos tekijöillä on yhdysvaikutusta.
- Jos jokaisessa solussa on yhtä paljon havaintoja, niin kyseessä on **tasapainotettu** koeasetelma.
- Kaksisuuntaisella varianssianalyysillä ei ole ei-parametrasta vastinetta.

Kaksisuuntainen varianssianalyysi luottamus-muuttujalle

Parittaiset testit, kun luokittelumuuttujana on *uskonnollisuus*.

Multiple Comparisons

Dependent Variable: luottamus
Tukey HSD

(I) uskonnollisuus	(J) uskonnollisuus	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1.00	2.00	-.12984	.36904	.004	-2.3061	-.2906
	3.00	-.16555*	.31536	.000	-2.5167	-.7943
	4.00	-.25654*	.31745	.000	-3.4322	-1.6985
	5.00	-.24547*	.42911	.000	-3.6265	-1.2829
2.00	1.00	1.2984	.36904	.004	-.2906	2.3061
	3.00	-.3571	.31493	.788	-1.2171	-.5029
	4.00	-.12670	.31702	.001	-2.1327	-.4013
	5.00	-.11563	.42879	.055	-2.3272	-.0146
3.00	1.00	1.6555	.31536	.000	-.7943	2.5167
	2.00	.3571	.31493	.788	-.5029	1.2171
	4.00	-.9099*	.25251	.003	-1.5994	-.2203
	5.00	-.7992	.38356	.228	-1.8466	.2482
4.00	1.00	2.5654	.31745	.000	1.6985	3.4322
	2.00	1.2670	.31702	.001	.4013	2.1327
	3.00	.9099*	.25251	.003	.2203	1.5994
	5.00	.1107	.38528	.999	-.9414	1.1628
5.00	1.00	2.4547	.42911	.000	1.2829	3.6265
	2.00	1.1563	.42879	.055	-.0146	2.3272
	3.00	.7992	.38356	.228	-.2482	1.8466
	4.00	-.1107	.38528	.999	-1.1628	.9414

Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 16.921.
*. The mean difference is significant at the .05 level.

Kaksisuuntainen varianssianalyysi luottamus-muuttujalle

Luokittelumuuttujina *uskonnollisuus* ja *koulutusaste*.

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: luottamus

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	1996.600 ^a	24	83.192	4.916	.000
Intercept	228671.430	1	228671.430	13513.667	.000
uskonnollisuus	1006.419	4	251.605	14.869	.000
koulutusaste	543.325	4	135.831	8.027	.000
uskonnollisuus * koulutusaste	207.309	16	12.957	.766	.726
Error	28428.109	1680	16.921		
Total	377553.190	1705			
Corrected Total	30424.709	1704			

a. R Squared = .066 (Adjusted R Squared = .052)

Kaksisuuntainen varianssianalyysi luottamus-muuttujalle

Parittaiset testit, kun luokittelumuuttujana on *koulutusaste*.

Multiple Comparisons


Dependent Variable: luottamus
Tukey HSD

(I) koulutusaste	(J) koulutusaste	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Perusaste	Keskiaste	.1189	.255	.990	-.5766	.8143
	Alin korkea-aste	-.3765	.313	.749	-1.231	.4779
	Alempi korkeakouluaste	-.9025	.340	.061	-1.830	.0248
	Ylempi korkeakouluaste	-1.6001*	.360	.000	-2.584	-.616
Keskiaste	Perusaste	-.1189	.255	.990	-.8143	.5766
	Alin korkea-aste	-.4954	.305	.483	-1.329	.3385
	Alempi korkeakouluaste	-1.0214*	.333	.018	-1.930	-.113
	Ylempi korkeakouluaste	-1.7190*	.354	.000	-2.685	-.753
Alin korkea-aste	Perusaste	.3765	.313	.749	-.4779	1.231
	Keskiaste	.4954	.305	.483	-.3385	1.329
	Alempi korkeakouluaste	-.5260	.379	.636	-1.561	.5092
	Ylempi korkeakouluaste	-1.2236*	.398	.018	-2.310	-.137
Alempi korkeakouluaste	Perusaste	.9025	.340	.061	-.0248	1.830
	Keskiaste	1.0214*	.333	.018	-.1129	1.930
	Alin korkea-aste	-.5260	.379	.636	-.5092	1.561
	Ylempi korkeakouluaste	-.6976	.419	.456	-1.842	.4469
Ylempi korkeakouluaste	Perusaste	1.6001	.360	.000	.6162	2.584
	Keskiaste	1.7190*	.354	.000	.7528	2.685
	Alin korkea-aste	1.2236*	.398	.018	.1375	2.310
	Alempi korkeakouluaste	.6976	.419	.456	-.4469	1.842

Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 16.921.
*. The mean difference is significant at the .05 level.

Kaksisuuntainen varianssianalyysi luottamus-muuttujalle

Uskonnollisuusryhmien keskiarvot koulutusasteen mukaan jaoteltuna.



57

Kaksisuuntainen varianssianalyysi luottamus-muuttujalle

Luokittelumuuttujina uskonnollisuus ja vasenoikea.

Descriptive Statistics


Dependent Variable: luottamus

vasenoikea	uskonnollisuus	Mean	Std. Deviation	N
1.00	1.00	12.6058	4.81055	57
	2.00	13.9219	4.32536	38
	3.00	13.0082	4.29891	64
	4.00	12.1453	4.67795	45
	5.00	12.2775	4.67645	13
	Total		12.8398	4.54044
2.00	1.00	12.5603	4.45268	142
	2.00	13.3930	4.58939	137
	3.00	13.9998	3.86901	301
	4.00	14.8686	4.05794	238
	5.00	14.5817	4.26525	68
	Total		13.9533	4.22767
3.00	1.00	12.5067	4.55777	49
	2.00	14.6879	3.71175	74
	3.00	15.0194	3.77193	177
	4.00	15.9494	3.50147	237
	5.00	16.0155	4.12638	65
	Total		15.2478	3.87955
Total	1.00	12.5602	4.53900	248
	2.00	13.8585	4.32696	249
	3.00	14.2157	3.93590	542
	4.00	15.1256	4.00751	520
	5.00	15.0149	4.35202	146
	Total		14.2687	4.22550

59

Kaksisuuntainen varianssianalyysi luottamus-muuttujalle

Koulutusasteryhmien keskiarvot uskonnollisuuden mukaan jaoteltuna.



58

Kaksisuuntainen varianssianalyysi luottamus-muuttujalle

Luokittelumuuttujina uskonnollisuus ja vasenoikea.

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: luottamus


Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	2284.639 ^a	14	163.188	9.801	.000
Intercept	169328.660	1	169328.660	10169.322	.000
uskonnollisuus	429.288	4	107.322	6.445	.000
vasenoikea	529.739	2	264.870	15.907	.000
uskonnollisuus * vasenoikea	345.997	8	43.250	2.597	.008
Error	28140.070	1690	16.651		
Total	377553.190	1705			
Corrected Total	30424.709	1704			

a. R Squared = .075 (Adjusted R Squared = .067)

60

Kaksisuuntainen varianssianalyysi luottamus-muuttujalle

Uskonnollisuusryhmien keskiarvot poliittisen suunnan mukaan jaoteltuna.



Kaksisuuntainen varianssianalyysi luottamus-muuttujalle

Poliittisen suunnan ryhmien keskiarvot uskonnollisuusryhmien mukaan jaoteltuna.

