

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS  
Analyysi II, 2009  
Harjoittelua 2. kurssikoetta varten

1. Suppeneeko vai hajaantuuko

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3k-2}?$$

2. Suppeneeko vai hajaantuuko

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k^2 \ln k}}?$$

Vertaa esim. epäoleelliseen integraaliin.

3. Suppeneeko vai hajaantuuko

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{7 + \sin(k!)}{\sqrt{k}}?$$

4. Suppeneeko vai hajaantuuko

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(k^k)}{k^2}?$$

Muista itseisen suppenemisen merkitys.

5. Suppeneeko vai hajaantuuko

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1+2k}{3+k^4}?$$

6. Suppeneeko vai hajaantuuko

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^5 + 6k + 1}{k^6 + 5k + 1}?$$

7. Suppeneeko vai hajaantuuko

$$\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{\ln(\sqrt{k})}?$$

8. Onko olemassa sarjaa, jonka osasummien jono on  $1, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{3^3}, \frac{1}{4^4}, \dots$ ?

9. Määritä ne  $x$ , joilla

$$\sum_{k=1}^{\infty} e^{kx^2}$$

suppenee. Vihje: Muistele geometrista sarjaa.

10. Suppeneeko vai hajaantuuko sarja?

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[k]{k!}}.$$

11. Suppeneeko vai hajaantuuko sarja?

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[k]{k!}}.$$

12. Oletetaan, että positiivitermiset sarja  $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$  suppenee. Osoita, että sarja

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{x_k}}{k}$$

suppenee.

13. Oletetaan, että  $f_n : \Delta \rightarrow \mathbb{R}$  ja  $f : \Delta \rightarrow \mathbb{R}$  ja että  $f_n \rightarrow f$  tasaisesti, kun  $n \rightarrow \infty$ . Miksi  $f_n \rightarrow f$  pisteittäin, kun  $n \rightarrow \infty$ .

14. Tarkastellaan funktioita  $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , jotka on määritelty ehdolla  $f_n(x) = \frac{1}{n}x^n$ . Suppeneeko jono  $(f_n)$  pisteittäin? Suppeneeko se tasaisesti?

15. Tarkastellaan funktioita  $f_n : [0, \infty[ \rightarrow \mathbb{R}$ , jotka on määritelty ehdolla  $f_n(x) = \frac{1}{n}\sqrt{x}$ . Suppeneeko jono  $(f_n)$  pisteittäin? Suppeneeko se tasaisesti?

16. Laske

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + \frac{1}{n} \sin^4 x + 7} dx.$$

Käytä tasaista suppenemista (tarkista se!)

17. Suppeneeko sarja  $\sum_{k=0}^{\infty} x^{2k}$  tasaisesti välillä  $] -1, 0[$ ?  
Vihje: geometrinen sarja.

18. Millaisen summakaavan saat tutkimalla geometrisen sarjan  $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$  kolmatta derivaattaa? Vihje: vertaa monisteen esimerkkiin.

19. Onko olemassa funktiota  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , jolle pätee, että  $f(0) = 2008$ ,  $f'(0) = 2007$ ,  $f''(0) = 2006$  ja jolle  $f^{(n)}(0) = 0$  kaikilla  $n \geq 3$ ?

20. Onko olemassa funktiota  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , jolle pätee, että  $f(0) = 2008$ ,  $f'(0) = 2007$ ,  $f''(0) = 2006$  ja jolle  $f^{(n)}(0) = \frac{1}{n!}$  kaikilla  $n \geq 3$ ?

21. Laske

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{nx} dx.$$

Käytä tasaista suppenemista (tarkista se!) Muista myös luvun  $e$  määritelmä.

22. Oletetaan, että  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  on tasaisesti jatkuva ja määritellään funktiot  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ehdolla  $f_n(x) = f(x + \frac{1}{n})$ . Osoita, että jono  $(f_n)$  suppenee tasaisesti.

23. Oletetaan, että  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  on tasaisesti jatkuva kaikilla  $n = 1, 2, \dots$  ja että  $f_n \rightarrow f$  tasaisesti koko  $\mathbb{R}$ :ssä. Osoita, että  $f$  on tasaisesti jatkuva.

24. Millä luvuille  $a > 0$  pätee, että sarja  $\sum_{k=0}^{\infty} 3^k x^k$

(a) suppenee välillä  $] -a, a[$ ;

(b) suppenee tasaisesti välillä  $[-a, a]$ ?

25. Millä luvuille  $a > 0$  pätee, että sarja

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{3^k}$$

(a) suppenee välillä  $] -a, a[$ ;

(b) suppenee tasaisesti välillä  $[-a, a]$ ?

26. Oletetaan, että  $a < 0$ . Suppeneeko sarja

$$\sum_{k=1}^{\infty} e^{kx}$$

tasaisesti välillä  $] -\infty, a]$ ?

27. Millä  $x$  sarja

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (x-3)^k}{k}$$

suppenee? Vihje: tutki sivun 91 esimerkkiä 1.3.

28. Millä  $x$  sarja  $\sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k$  suppenee? Vihje: sivun 94 lause 1.8; tarkastele suppenemisvälin päätepisteitä erikseen.

29. Määritä sarjan

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{k-1}{k}\right)^{k^2} x^k$$

suppenemissäde ja suppenemisväli. Vihje: sivun 94 lause 1.8.

30. Tarkastellaan potenssisarjaa  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-11)^k$ , missä kertoimet  $a_k$  määritellään seuraavasti:  $a_0 = 1$  ja

$$a_{k+1} = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k a_k$$

kaikilla  $k = 0, 1, 2, \dots$ . Määritä sarjan suppenemissäde ja suppenemisväli. (Vihje: lause 1.8 sivulla 94.)

31. Tarkastellaan edellisen tehtävän sarjan summana määriteltyä funktiota  $f(x)$  välillä  $]11 - R, 11 + R[$ . Laske arvot  $f(11)$ ,  $f'(11)$ ,  $f''(11)$  ja  $f'''(11)$ . (Vihje: lause 2.5 sivulla 97.)

32. Esitä funktio

$$f(x) = \frac{1}{1 - x^7}$$

potenssisarjana, joka suppenee välillä  $] - 1, 1[$  ja määritä tämän avulla funktion 10. derivaatta kohdassa  $x = 0$ .

33. Muodosta sivun 104 esimerkin tapaan sellainen likiarvo luvulle  $e^2$ , että virheen itseisarvo on pienempi kuin  $10^{-20}$ . Likiarvosta tulee äärellinen summa. Sitä ei täydy sieventää. Onko saatu likiarvo rationaaliluku? (Oleta pohjaksi tieto  $2 < e < 3$ .)

34. Laske sivun 110 esimerkin tapaan sellainen likiarvo integraalille

$$\int_0^1 e^{x^4} dx,$$

että virheen itseisarvo on pienempi kuin 0,01.

35. Oletetaan, että  $x \in [-1, 1]$ . Arvioi Taylorin polynomien avulla erotusta  $\sinh x - (2x - \sin x)$ . (Voidaan osoittaa, että se on pienempi kuin 0,0006. Jos sinulla on käytettävissäsi graafinen laskin tai osaat käyttää esim Maplea, niin kannattaa piirtää kuva.)

36. Muodosta funktiolle  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  Taylorin polynomi  $T_2(x; 8)$ . Etsi jokin raja-arvotekävä, jonka pystyt selvittämään sen avulla.

37. Selvitä Taylorin polynomien avulla

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x - x \cos x}{e^x - 1}.$$

38. Selvitä

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - 1}{\sin^2 x}$$

käyttämällä funktion  $\cos t$  sopivaa Taylorin polynomia, jossa  $x_0 = 0$ .