

# Matemaattinen logiikka

## Harjoitus 11

1. Näytä, että jos  $A \subseteq \mathbb{N}$  on ääretön rekursiivisesti numeroituva joukko, niin on olemassa rekursiivinen injektio  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , jolla  $A = \{f(n) \mid n \in \mathbb{N}\}$ .
2. Näytä, että jokainen ääretön rekursiivisesti numeroituva joukko sisältää äärettömän rekursiivisen joukon.
3. Oletetaan, että  $R \subseteq \mathbb{N}^3$  on rekursiivinen relaatio ja olkoon  $S \subseteq \mathbb{N}$  sellainen, että  $x \in S$  jos kaikilla  $z \leq x$  on olemassa  $y \in \mathbb{N}$  jolla  $(x, y, z) \in R$ . Näytä, että relaatio  $S$  on rekursiivisesti numeroituva.
4. Oletetaan, että joukot  $A_n \subseteq \mathbb{N}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , ovat sellaisia, että joukko

$$\{\pi(m, n) \mid m \in A_n\}$$

on rekursiivisesti numeroituva. Näytä, että näiden joukkojen diagonaalinen leikkaus  $\Delta_{n \in \mathbb{N}} A_n = \{m \in \mathbb{N} \mid m \in A_n \text{ kaikilla } n \leq m\}$  on rekursiivisesti numeroituva.

5. Olkoon  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  rekursiivinen ja  $A$  niiden  $n \in \mathbb{N}$  joukko joilla on olemassa  $> n$  monta sellaista  $m \in \mathbb{N}$ , että  $f(m) = n$ . Näytä, että  $A$  on rekursiivisesti numeroituva.
6. Olkoon  $M$  äärellinen  $L_{exp}$ -strukturi. Näytä, että

$$\{[\phi] \mid M \models \phi, \phi \text{ } L_{exp} \text{ - lause}\}$$

on rekursiivinen joukko.