


# Inversio-ongelmat:

## Analyttiset inversio-ongelmat


Matti Lassus

Inversio-ongelmissa pyritään selvittämään (fysikaalisten) mallien rakennetta epäsuorista mittauksista.


Esim. 1. Luodaan kappaleita (potilaista, masperää tai molekyyliä) aalloilla. Voiko kappaleen rakenteen saada rekonstruoidua heijastuneesta aallosta?



Esim 2      Vaino kappaleen tiheyden  
selvittää eri suunnista otetuista  
röntgenkuvista (CT)?



Esim 3      Vaino kappaleen johtavuuden  
selvittää sen pinnalla tehdyistä  
virta-jännite mittauksista?




Esim 4 Voiko solun toiminnan selvittää  
analysoimalla sen tuottamia kemiallisia aineita?

Esim 5 Voiko osahemenninaitte mallittavien  
yhtälöiden parametreja selvittää seuraamalla  
markkinoiden toimintaa?

Aloksi tarkastelemme esimerkkiä 2, eli  
röntgen tomografiaa. Tätä varten

- M.L. {
  - esittelemme matemaattisen mallin ongelmalta
  - tutuimme mallin ominaisuuksiin
- S.S. {
  - esittelemme mallin erilaisia approksimaatioita (diskretisointi, kohinan vaikutus jne.)
  - tarkastelemme numeerista ratkaisua ongelmalta

# I. Röntgen-tomografia



koheellisen Beerin lain mukaan  
 suoraa  $l$  kulkevien röntgensäteiden intensiteetti  $I(x)$   
 toteuttaa yhtälön

$$\frac{dI}{dx}(x) = -f(x)I(x),$$

missä  $x$  on (Euklidinen) etäisyys pisteestä  $x_0 \in L$   
 ja  $f(x)$  on pisteessä  $x$  ja  $f(x)$  on materiaalin  
 absorptio pisteessä  $x$ .

ylläolevassa kuvassa, jossa absorptio suoralla  
 $l$  havaitaan pisteiden  $x_0$  ja  $x_1$  välillä,

$$\log\left(\frac{I_1}{I_0}\right) = -\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx, \quad I_1 = I(x_1), I_0 = I(x_0)$$

Matemattinen malli Olhoon  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  avoin ja  
 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ,  $\text{supp}(f) \subset \bar{\Omega}$ . Käs  $x_0, v_0 \in \mathbb{R}^n$ ,  $|v_0| = 1$ , ja

$$l = l(x_0, v_0) = \{ x_0 + sv_0 \in \mathbb{R}^n \mid s \in \mathbb{R} \}$$

on suora, merkitään


$$Xf(l) = \int_l f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_0 + sv_0) ds.$$

Röntgen tomografian inversio-ongelma:

tehtävä on määrittää  $f$  kun  $Xf(l)$   
 tunnetaan kaikilla suorilla  $l$

- Radon 1917

- Cormack-Hornsfeld 1979 Nobel palkinto



Dimensiosse  $n=2$  malli liittyy Radon-  
muunnokseen

Määr 1.1 Olkoon  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ,  $n \in \mathbb{Z}_+$ .

Kun  $w \in S^{n-1} = \{v \in \mathbb{R}^n \mid |v|=1\}$   
ja  $s \in \mathbb{R}$ , merkitään

$$L(w, s) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x \cdot w = s\}.$$


Funktio  $f$  Radon-muunnos on

$$Rf(w, s) = \int_{L(w, s)} f(x) dH$$

$$= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f(s w + t_1 g_1 + \dots + t_{n-1} g_{n-1}) dt_1 dt_2 \dots dt_{n-1}$$

missä  
kanta.

$(w, g_1, g_2, \dots, g_{n-1})$  on  $\mathbb{R}^n$ :n ortonormaali



Huomaa, että

$$Rf(s, \omega) = R(-s, -\omega)$$

## Peruskysymykset

- 1) Ouko  $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$  oikea luku,  
josse tuthis ongelmaa? Olisiko  
johis muu  $R$ :n määrittelyjoukko  $\mathcal{D}(R)$   
parampi ongelmaa analysointiin
- 2) Yksikäsitteisyys: Jos  $Rf = R\tilde{f}$ , onko  
 $f = \tilde{f}$ ?
- 3) Rekonstruktioalgoritmi tai -kaava.  
Miten  $f$  saadaan laskettuna  
kun  $Rf$  on annettu?
- 4) Numerinen ratkaisualgoritmi

5)  $R$ :n kuva-alue: Mikä on  $R(\Delta(R))$ ? Tämä on tärkeä jos mittauksessa on kohina.



6) Stabiilisuus: Jos  $Rf \approx R\tilde{f}$ , pätee  $f \approx \tilde{f}$ ?

Muita huomioita:

1.  $Rf(s, \omega)$  tunnetaan vain alueen  $A \subset \mathbb{R}^4$  kanssa leikkaaville eli  $L(s, \omega) \cap A \neq \emptyset$   $L(s, \omega)$ ;

2.  $Rf(s, \omega)$  tunnetaan vain jos  $L(s, \omega) \cap A = \emptyset$

3.  $Rf(s, \omega)$  tunnetaan vain pinnalla  $(s, \omega) \in \Gamma \subset \mathbb{R} \times S^{4-1}$   
Esim. Helikoi-tonografi.





## 2. Fourier-sarjast ja Fourier-muunnos

Merhinnöjäs Olkoon  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  mitallinen,  
 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  avoin

$$1) \text{ supp}(f) = \left( \bigcup \{A \subset \Omega \mid A \text{ avoin}, f=0 \text{ melkein kaikkialla A:ssa}\} \right)^c$$

Jos  $f$  on jvs,

$$\text{supp}(f) = \text{cl}_{\Omega}(\{x \in \Omega \mid f(x) \neq 0\})$$

$$2) \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n \text{ on multi-indices}$$

$$|\alpha| = \sum_{j=1}^n \alpha_j,$$

$$x^{\alpha} = \prod_{j=1}^n x_j^{\alpha_j},$$

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

$$0^0 = 1$$

3)

$$D_j = -i \frac{\partial}{\partial x_j}, \quad \partial_j = \frac{\partial}{\partial x_j}$$

$$\partial^{\alpha} = \prod_{j=1}^n \partial_j^{\alpha_j}, \quad D^{\alpha} = \prod_{j=1}^n D_j^{\alpha_j}$$

$$4) f \in C^{\infty}(\Omega) \text{ jos } D^{\alpha} f \in C(\Omega) \text{ kaikilla } \alpha \in \mathbb{N}^n$$

$$C_0^{\infty}(\Omega) = \{f \in C^{\infty}(\Omega) \mid \text{supp}(f) \subset \Omega \text{ on kompakti}\}$$

# Fourier-sarjat

(kertaus, lts. Funktioanalyysi peruskurssi, 2008, Tashiro, luku 5  
+ ai Rudin. Real and complex analysis chapters 4) and 9)

Olkoon  $f \in L^2((-\pi, \pi))$ . Funktio  $f$   
voidaan ajatella  $\mathbb{R}$ :n  $2\pi$ -periodisena  
funktiona  $f$ :n Fourier-kertoimet ovat

$$\hat{f}(n) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

$$= \langle f, e_n \rangle_{L^2}, \text{ missä}$$

$$e_n(x) = e^{inx}, \quad \langle f, g \rangle_{L^2} = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \overline{g(x)} dx$$

Funktio  $f$  Fourier-sarja  $a$  (avaruutta, jossa suppeneminen tapahtuu, spesifioimatta)

$$\frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e_n(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x),$$

$$S_N f(x) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e_n(x)$$

Kerrataan Eulerin kaava:  $e^{a+ib} = e^a (\cos b + i \sin b)$ ,

$$e^{inx} = \cos(nx) + i \sin(nx)$$

Koska

$$\langle e_n, e_m \rangle_{L^2} = \int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} \overline{e^{imx}} dx = \begin{cases} 2\pi, & n=m \\ 0, & n \neq m \end{cases}$$

$$= 2\pi \delta_{nm}$$

orist  $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e_n(x)$  ortonormaalit  $L^2(-\pi, \pi)$ :ssä.

Lause 2.1  $\text{span} \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e_n \right\}_{n=-\infty}^{\infty}$  on tiheä  $L^2(-\pi, \pi)$ :ssä

Seuraus: koska

$$S_N f = \sum_{n=-N}^N \left\langle f, \frac{e_n}{\|e_n\|} \right\rangle_{L^2} \frac{e_n}{\|e_n\|}$$

on ortonormaaliprojektio

$$S_N : L^2(-\pi, \pi) \rightarrow \text{span} \{ e_n \mid |n| \leq N \}$$

potee

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = f(x)$$

$$L^2(-\pi, \pi) : \text{ssä}$$

Stürz  $L^2(-\pi, \pi)$ : SSA

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{inx}$$

Lissaksis

$$\|f\|_{L^2}^2 = \langle f, f \rangle = \left\langle \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \hat{f}(n) e_n, \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \hat{f}(m) e_m \right\rangle_{L^2}$$

$$= \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \sum_{n, m=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) \overline{\hat{f}(m)} 2\pi \delta_{nm} = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2$$

Jä  $\| (a_n)_{n=-\infty}^{\infty} \|_{\ell^2} = \left( \sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 \right)^{1/2}$ , on kuvaus

$$F: L^2(-\pi, \pi) \rightarrow \ell^2 = \left\{ (a_n)_{n=-\infty}^{\infty} \mid \sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 < \infty \right\}$$

$$f \mapsto (\hat{f}(n))_{n=-\infty}^{\infty}$$

Isomorfismi, jolle

$$\|Ff\|_{\ell^2} = \sqrt{2\pi} \|f\|_{L^2(-\pi, \pi)}$$

$n$ -ulotteisessa joukossa  $\Omega = (-\pi, \pi)^n \subset \mathbb{R}^n$ ,  
 (tai toruksella  $T^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ ), funktiolle  
 $f \in L^2(\Omega)$  pätee

$$f(x) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^n \sum_{\varphi \in \mathbb{Z}^n} \hat{f}(\varphi) e_{\varphi}(x), \quad L^2(\Omega) := \text{ssr}$$

$$e_{\varphi}(x) = e^{i\varphi \cdot x}, \quad \varphi \cdot x = \varphi_1 x_1 + \varphi_2 x_2 + \dots + \varphi_n x_n$$

$$\hat{f}(\varphi) = \langle f, e_{\varphi} \rangle_{L^2} = \int_{\Omega} f(x) e^{-i\varphi \cdot x} dx$$

"Harjoitustehtävä": käy läpi Funktionaaliälgebrän  
 perusteiden kurssia luku 5 ja tarkista asia.

Suora lause osoittaa funktiolle  $f \in C_0^\infty(-\pi, \pi)$

$$\widehat{Df}(n) = F\left(-i \frac{d}{dx} f\right)(n)$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} \left(-i \frac{d}{dx} f(x)\right) e^{-inx} dx$$

$$= - \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left(-i \frac{d}{dx}\right) e^{-inx} dx$$

$$= n \widehat{f}(n).$$

Yleisesti, kun  $f \in C_0^\infty(-\pi, \pi)^q$ ,  $F(D^\beta f)(\eta) = \eta^\beta \widehat{f}(\eta)$ .

Muuttamalla väli  $(-\pi, \pi)$  väliksi  $(-L, L)$ ,  $L > 0$  edelliset kaavat skaalautuvat kaavaksi

$$f \in L^2(-L, L) \Rightarrow$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[ \int_{-L}^L f(z) e^{-i\frac{\pi}{L}nz} dz \right] e^{i\frac{\pi}{L}nx} \frac{\pi}{L} \quad L^2(-L, L)\text{-ssi}$$

Kun  $f \in C_0^\infty(\mathbb{R})$  ja  $L \rightarrow \infty$  tämä lähestyy formaalisti lausehettä

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \int_{-\infty}^{\infty} f(z) e^{-i\eta z} dz \right] e^{i\eta x} d\eta.$$

Seuraavassa tätä tutkitaan tarkasti.

## Nopeasti vähehevät funktiot

Määri 2.1 Sanomme, että  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$  nopeasti vähehevä, tai  $f$  on Schwartzin lukan funktio,  $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$  jos  $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$  ja

$$\bullet \quad \|f\|_{\alpha, \beta} := \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta f(x)| < \infty$$

kahilla  $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ .

Määri 2.2 Sanomme, että

$$\lim_{j \rightarrow \infty} f_j = f \quad \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \text{:ssä,}$$

jos kaikilla  $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \|f_j - f\|_{\alpha, \beta} = 0$$

Note that

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^N |\partial_x^\beta f(x)| \leq \sum_{|\alpha| \leq 2N} 2^N \|f\|_{\alpha, \beta}$$

Määr. 2.3 Funktio  $f \in S(\mathbb{R}^n)$  Fourier-  
muunnos on

$$\begin{aligned}\hat{f}(\xi) &= \mathcal{F}_{x \rightarrow \xi} f(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} f(x) dx, \quad \xi \in \mathbb{R}^n.\end{aligned}$$

Lause 2.4 Kun  $f \in S(\mathbb{R}^n)$ , pätee

- 1)  $\mathcal{F}_{x \rightarrow \xi} (D_x^\alpha f) = \xi^\alpha \hat{f}(\xi)$
- 2)  $\mathcal{F}_{x \rightarrow \xi} (x^\alpha f) = (-1)^{|\alpha|} D_\xi^\alpha \hat{f}(\xi)$
- 3)  $\mathcal{F}(f(ax)) = a^{-n} \hat{f}\left(\frac{\xi}{a}\right)$ ,  $\mathcal{F}(e^{ib \cdot x} f(x)) = \hat{f}(\xi - b)$
- 4)  $\mathcal{F}_{x \rightarrow \xi} : S(\mathbb{R}^n) \rightarrow S(\mathbb{R}^n)$  on jatkava.

Tod 1):

$$\begin{aligned}& \int_{\mathbb{R}^n} \partial_{x_1} f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{[-R, R]^n} \partial_{x_1} f \cdot e^{-ix \cdot \xi} dx \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[ \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f(x_1, x_2, \dots, x_n) e^{-ix \cdot \xi} dx_2 \dots dx_n \right]_{x_1=-R}^R \\ & \quad + \int_{[-R, R]^n} f(x) (-\partial_{x_1} e^{-ix \cdot \xi}) dx\end{aligned}$$



$$= 0 + \int_{\mathbb{R}^n} f(x) (i\xi_1 e^{ix \cdot \xi}) dx$$

$$= i\xi_1 \hat{f}(\xi).$$

Näin saadaan  $\mathcal{F}(D_{x_1} f) = \xi_1 \hat{f}(\xi),$

Joskus 1) seuraa vastaavilla lauseilla.

2) todistetaan samaa tapaa.

3) : HT

$$4) \quad \| \mathcal{F} f \|_{\alpha, \beta} = \sup_{\xi \in \mathbb{R}^n} | \xi^\alpha D_\xi^\beta \hat{f}(\xi) |$$

$$= \sup_{\xi \in \mathbb{R}^n} | \mathcal{F}(D_x^\alpha (x^\beta f))(\xi) |.$$

Lisäksi,

$$| \hat{f}(\xi) | \leq \left| \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} f(x) dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(1+|x|^2)^n} (1+|x|^2)^n |f(x)| dx$$

$$\leq \left\| \frac{1}{(1+|x|^2)^n} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \sum_{|\alpha| \leq 2n} \| f \|_{\alpha, 0}.$$

yhdistämällä nämä estimaatit, saamme

$$\|\hat{f}\|_{\alpha, \beta} \leq C_{\alpha, \beta} \sum_{\substack{|\tilde{\alpha}| \leq |\beta| + 2n \\ |\tilde{\beta}| \leq |\alpha| + 2n}} \|f\|_{\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}}.$$

Siiispä jos  $f_k, f \in S(\mathbb{R}^n)$  ja  $\forall \tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathbb{N}^n$  pätee

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_{\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}} = 0$$

niin kaikilla  $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\hat{f}_k - \hat{f}\|_{\alpha, \beta} = 0.$$

Tämä tarkoittaa sitä, että

$$F: S(\mathbb{R}^n) \rightarrow S(\mathbb{R}^n)$$

on jatkava kun  $S(\mathbb{R}^n)$  varustetaan normien  $(\|\cdot\|_{\alpha, \beta})_{\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n}$  määrämällä topologialla.

Lause 2.5  $\mathcal{F}: S(\mathbb{R}^n) \rightarrow S(\mathbb{R}^n)$  on

bijektio ja

$$\mathcal{F}(\mathcal{F}h)(x) = (2\pi)^n Jh(x),$$

missä  $Jh(x) = h(-x)$ . Siis pä

$$\mathcal{F}^{-1} = (2\pi)^{-n} J \circ \mathcal{F}$$

Tod On tunnettua (kts. Rudin. ch 9) että funktio  $\phi(x) = \exp(-\frac{|x|^2}{2})$  Fourier-muunnos on  $\hat{\phi}(\xi) = (\sqrt{2\pi})^n \phi(\xi)$ .

Tämä nähdään seuraavasti: Funktio  $\phi(x)$  toteuttaa

$$\left(\frac{d}{dx} + x\right)\phi(x) = 0.$$

Ottamalla puolittain Fourier-muunnokset, saamme

$$\left(i\xi + i\frac{d}{d\xi}\right)\hat{\phi}(\xi) = 0$$

Siiispä väit  
schē yhtälös  $\phi(z)$  että  $\hat{\phi}(z)$  toteutta-

$$\frac{d}{dz} f(z) = -z f(z), \quad z \in \mathbb{R},$$

...

Koska tälle yhtälölle on vain yksi lineaarisesti riippumaton ratkaisu, on olemassa  $c \in \mathbb{C}$  siten, että

$$\hat{\phi}(z) = c \cdot \phi(z).$$

Todistus sille, että  $c = (\sqrt{2\pi})^n$  löytyy Rudinin kirjasta,

Olkoon 
$$\phi_\varepsilon(x) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \varepsilon^{-n} \phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \quad \varepsilon > 0$$

Tällöin

$$\hat{\phi}_\varepsilon(\xi) = \phi(\varepsilon\xi).$$

Lisäksi, kun  $f, h \in S(\mathbb{R}^n)$ , nähdään (H+), että funktio

$$h * f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} h(x-z) f(z) dz$$

toteuttaa  $h * f \in S(\mathbb{R}^n)$  jos (H+)

$$\widehat{h * f}(\xi) = \hat{h}(\xi) \cdot \hat{f}(\xi).$$

Samaik, kun  $h \in S(\mathbb{R}^n)$ , niin pätee (H+)

$$\int_{\mathbb{R}^n} \phi_\varepsilon(x) dx = 1 \text{ jos}$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} h * \phi_\varepsilon(x) =$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \varepsilon^{-n} \phi\left(\frac{x-z}{\varepsilon}\right) h(z) dz = h(x)$$

kaikille  $x \in \mathbb{R}^n$ .

Lisäksi, kun  $f, h \in S(\mathbb{R}^n)$ , niin (H+)

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(z) \hat{g}(z) dz = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(z) g(z) dz.$$

kuunnitetaan nyt  $x \in \mathbb{R}^n$  ja merkitään

$$g_{x,\varepsilon}(\xi) = \underbrace{e^{-\frac{\varepsilon^2}{2}|\xi|^2}}_{\hat{\phi}_\varepsilon(\xi)} \cdot e^{ix \cdot \xi} \quad (2\pi)^{-n/2}$$

Koska  $|\hat{g}_{x,\varepsilon}(\xi)| \leq 1$ ,  $\hat{h} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^1(\mathbb{R}^n)$ ,

Lebesguen dominoitua konvergensilauseen (LDC) nojalla

$$(2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\xi \cdot x} \hat{h}(\xi) d\xi \stackrel{\text{LDC}}{=} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} g_{x,\varepsilon}(\xi) \hat{h}(\xi) d\xi$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{g}_{x,\varepsilon}(z) h(z) dz$$

$$\stackrel{\oplus}{=} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} (2\pi)^{n/2} \varepsilon^{-n} e^{-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\varepsilon^2} |z-x|^2} h(z) dz$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \phi_\varepsilon(x-z) h(z) dz = h(x).$$

Siten  $\mathcal{J}(\mathcal{F}(\mathcal{F}(h))) = h. \quad \checkmark$

$$\oplus \quad \mathcal{F}_{\xi \rightarrow z} \left( e^{-1/2 |\varepsilon \xi|^2} \right) = (2\pi)^{n/2} \varepsilon^{-n} e^{-|z/\varepsilon|^2/2}$$

$$\mathcal{F}_{\xi \rightarrow z} \left( e^{ix \cdot \xi} p(\xi) \right) = \hat{p}(z-x)$$

Lause 2.5 (Parsevalin kaava). Kun  $f, g \in S'(\mathbb{R}^n)$ ,

$$(f, g)_{L^2} = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{g(x)} dx = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) \overline{\hat{g}(\xi)} d\xi \quad (1)$$

Tol. Fubinin lauseen nojalla,

$$(\hat{f}, h)_{L^2} = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} f(x) \overline{h(\xi)} dx d\xi$$

$$= (f, \hat{h}(-\xi))_{L^2} = (f, J\hat{h})_{L^2}$$

Sijoittamalla  $h = \hat{g}$ , jolloin  $J\hat{h} = \frac{1}{(2\pi)^n} \hat{g}$ .

Saamme kaavan (1).  $\square$

Seuraus: Kun  $f \in S(\mathbb{R}^n)$ , pätee

$$(1) \quad \|\hat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = (2\pi)^{\frac{n}{2}} \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

Koska  $C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \subset S(\mathbb{R}^n)$  ja  $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$  on tiheä avaruudessa  $L^2(\mathbb{R}^n)$ , voidaan Fourier muunnos laajentaa yksikäsitteiseksi Tavalla jatkuvaksi lineaarikuvaukseksi.

$$F: L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n).$$

Tämä tehdään seuraavasti: Jos  $h \in L^2(\mathbb{R}^n)$ , on olemassa  $f_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \subset S(\mathbb{R}^n)$  s.e.

$$\lim_{j \rightarrow \infty} f_j = h.$$

Tällöin  $(f_j)_{j=1}^\infty$  on  $L^2$ :n Cauchy-jono, eli

$$\lim_{j, k \rightarrow \infty} \|f_j - f_k\|_{L^2} = 0$$

kaavat (1) nojalla

$$\lim_{j, k \rightarrow \infty} \|\hat{f}_j - \hat{f}_k\|_{L^2} = 0,$$

eli  $(\hat{f}_j)_{j=1}^\infty$  on Cauchy-jono  $L^2(\mathbb{R}^n)$ :ssä



Tällöin on  $g \in L^2(\mathbb{R}^n)$ , jolla

$$g = \lim_{j \rightarrow \infty} \hat{f}_j.$$

Määritellään  $\hat{h} = \mathcal{F}h = g$ . Tällöin

$g$  on riippumaton funktio  $h$  vastaksi

Cauchy-jonon  $(f_j)$  valinnasta, ja

$$\begin{aligned} (1) \quad \|\hat{h}\|_{L^2} &= \lim_{j \rightarrow \infty} \|\hat{f}_j\|_{L^2} = \lim_{j \rightarrow \infty} (2\pi)^{n/2} \|f_j\|_{L^2} \\ (2) \quad &= (2\pi)^{n/2} \|h\| \end{aligned}$$

Siis olemme muodostaneet kuvauksen

$$(3) \quad \mathcal{F}: L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$$

jolla (2) pätee. Koska  $\mathcal{J}: L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$   
on jatkuvasti käänteinen, on

$$(2\pi)^{-n} \mathcal{J} \circ \mathcal{F} \circ \mathcal{F} h = h,$$

eli käänteisoperaattori  $\mathcal{F}^{-1} = (2\pi)^{-n} \mathcal{J} \circ \mathcal{F}$  pätee (3):llä.