

## Lineaariset mallit, kl 2013, Harjoitus 2, viikko 13

1. Neliömatriisin jälki on sen diagonaalialkioiden summa eli, jos  $\mathbf{A} = [a_{ij}]$  on  $n \times n$  matriisi, niin sen jälki on  $\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ . Osoita, että (i)  $\text{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}) + \text{tr}(\mathbf{B})$  (ii)  $\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{tr}(\mathbf{BA})$  ja (iii)  $\text{tr}(\mathbf{A}) = \mathbf{A}$ :n ominaisarvojen summa, kun  $\mathbf{A}$  on symmetrinen. (Vihje: Viimeisessä kohdassa voit käyttää symmetrisen matriisin pääakselihaajotelmaa; ks. monisteen Liite B.6)

2. Olkoon neliömatriisi  $\mathbf{A}$  ( $n \times n$ ) ortogonaalinen projektio eli symmetrinen ( $\mathbf{A} = \mathbf{A}'$ ) ja idempotentti ( $\mathbf{A} = \mathbf{A}^2$ ). Osoita, että  $\mathbf{A}$  on positiivisesti semidefiniitti eli  $\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x} \geq 0 \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  ja että  $\mathbf{A}$ :n aste =  $\mathbf{A}$ :n jälki eli  $r(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{A})$ . (Vihje: Pääakselihaajotelma ja HT 1.3)

3. Esitä yhden selittäjän lineaarisen regressiomallin  $Y_1, \dots, Y_n \underline{\underline{\quad}}, Y_i \sim \mathbf{N}(\beta_1 + \beta_2 x_i, \sigma^2)$  normaaliyhtälöt komponenttimuodossa (ilman matriiseja) ja osoita, että niiden ratkaisuna saatavat PNS-estimaatit voidaan lausua muodossa

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{ja} \quad \hat{\beta}_1 = \bar{y} - \hat{\beta}_2 \bar{x},$$

jossa esimerkiksi  $\bar{y} = (y_1 + \dots + y_n)/n$ . Esitä  $\hat{\beta}_2$  käyttäen havainnoista  $(y_i, x_i)$ ,  $i = 1, \dots, n$ , laskettuja keskihajontoja ja korrelaatiokerrointa. (Huom.: Havaintojen korrelaatiokerroin määritelmä löytyy monisteen s. 11 alaviitteestä ja esim.  $y$ -havaintojen keskihajonta on  $s_y = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$ .)

4. (Jatkoa tehtävälle 1.5) Johda tehtävän 1.5 varianssianalyysimallissa parametrien  $\mu_1, \dots, \mu_p$  PNS-estimaattien lausekkeet normaaliyhtälöiden ratkaisukaavaa käyttäen.

5. Kun  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  on derivoituva ja  $f_1, \dots, f_m$  sen komponenttifunktiot, määritellään

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}'} f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} f_1(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n} f_1(\mathbf{x}) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_1} f_m(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n} f_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix}.$$

(i) Olkoon  $\mathbf{A}$  kiinteä  $m \times n$  matriisi ja  $\mathbf{x}$   $n \times 1$  vektori. Perustelee huolellisesti derivointisääntö

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}'} \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}.$$

(ii) Johda monisteen sivulla 8 viitattu tulos (monisteen merkinnöillä)

$$\frac{\partial^2}{\partial \boldsymbol{\beta} \partial \boldsymbol{\beta}'} S(\boldsymbol{\beta}) = 2\mathbf{X}'\mathbf{X}.$$

(Vihje: Sovella (i)-kohdan derivointisääntöä.)