

HY Todennäköysteoria III, harjoitustehtävät 2, kevät 2014 29.01.2014

(“Pelkistetystä” suurten poikkeamien periaatteesta)

Olkoon (Ω, \mathcal{F}, P) todennäköisyys avaruus, ja satunnaismuuttuja $X(\omega)$ jolla $X^+ := \max(X, 0) \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Muistetaan että $X^+ \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, P)$ jos ja vain jos

$$x^* := P\text{-ess sup}_{\omega \in \Omega} X(\omega) := \inf\{r : P(X > r) = 0\} < \infty$$

jossa $\text{ess sup} X(\omega)$ on ollenainen supremum P -mitan suhteen.

Kun $A \in \mathcal{F}$ määritellään myös

$$\begin{aligned} P\text{-ess sup}_{\omega \in A} X(\omega) &= P\text{-ess sup}_{\omega \in \Omega} (X(\omega) + \log(\mathbf{1}_A(\omega))) = \\ &= \inf\{r : P(\{X > r\} \cap A) = 0\} \end{aligned}$$

Osoita

1. $x^* = \text{ess sup}_{\omega \in \Omega} X(\omega)$ jos ja vain jos $P(X > x^*) = 0$ ja on olemassa jono $\xi_n \uparrow x^*$ jolla $\varepsilon_n := P(X > \xi_n) > 0$.
2. Kun $x^* < \infty$,

$$C(n) := E_P(\exp(nX_t)) = \exp(\Lambda(n)) < \infty \quad \forall n \geq 0$$

jossa Λ on kumulanttien generoiva funktio.

3. Määritellään Esscher-muunnettujen todennäköisyysmittojen jono

$$\begin{aligned} P_n(d\omega) &= C(n)^{-1} \exp(nX(\omega))P(d\omega), \text{ jolla} \\ P_n(A) &= \frac{E_P(\exp(nX)\mathbf{1}_A)}{E_P(\exp(nX))} \quad \text{kun } A \in \mathcal{F} \end{aligned}$$

Osoita

$$\begin{aligned} x^* &:= \text{ess sup}_{\omega \in \Omega} X(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log(C(n)) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \left(\int_{\Omega} \exp(nX(\omega)) P(d\omega) \right) \end{aligned}$$

Vihje Huomaat että

$$\exp(nx^*) \geq \exp(nX(\omega)) \geq \exp(n\xi_n)\mathbf{1}(X(\omega) > \xi_n) \quad P \text{ m.v.}$$

4. Osoita: Todennäköisyysmittojen jonolle ($P_n : n \geq 0$) pätee suurten poikkeamien periaate vauhti funktiolla

$$I(\omega) := (x^* - X(\omega))$$

eli kaikille $\forall A \in \mathcal{F}$ jossa $P(A) > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log(P_n(A)) = P\text{-ess sup}_{\omega \in A} (X(\omega) - x^*) = -\text{ess inf}_{\omega \in A} I(\omega) \quad (0.1)$$

Huomautus (0.1) pätee myös kun $P(A) = 0$, koska

$$\text{ess sup}_{\omega \in A} X(\omega) = -\infty$$

5. Kun $X \in L^\infty(P)$ ja $X(\omega) \geq 0$ P -melkein varmasti,

$$x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} E_P(X^n)^{1/n}$$

Vihje $Y(\omega) := \log(X(\omega))$, $Y^+ \in L^\infty(P)$.

6. Kun $X(\omega) \in L^\infty(P)$,

$$\|X\|_\infty = \text{ess sup}_{\omega \in \Omega} |X(\omega)| = \lim_{n \rightarrow \infty} E_P(|X|^n)^{1/n} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|X\|_p$$