

FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKURSSI  
 KEVÄT / SPRING 2015  
 LASKUHARJOITUS / EXERCISE 10

1.–2. Tarkastellaan jatkuvien lineaaristen operaattorien  $T_n : X \rightarrow Y$  muodostamia perheitä, missä  $n \in \mathbf{N}$  sekä  $X$  ja  $Y$  Banach-avaruuksia. Banach-Steinhausin lauseen mukaan joko

1° on olemassa  $M \in [0, \infty[$  jolle

$$\|T_n\| \leq M$$

kaikilla  $n$ , tai

2° voidaan löytää lähtöavaruuden  $X$  vektori  $x$ , jolle

$$\sup_{n \in \mathbf{N}} \|T_n x\|_Y = \infty.$$

Tutki seuraavissa tapauksissa, kumpi vaihtoehto pätee. Mikäli 2° pätee, etsi lisäksi joku vektori  $x \in X$ , jolla on väitetty ominaisuus.

a)  $X := \ell^2$ ,  $Y := \ell^1$ ,  $T_n : (x_k)_{k=1}^\infty \mapsto (x_k \chi_n(k))_{k=1}^\infty$ , missä  $\chi_n(k) = 1$ , jos  $k \leq n$  ja  $\chi_n(k) = 0$ , jos  $k > n$ .

b)  $X = Y = C(0, 1)$ , ja  $T_n$  on kompositio-operaattori  $T_n f = f \circ \varphi_n$ ,  $\varphi_n(t) := t^n$ , kun  $t \in [0, 1]$ .

c)  $X = Y = L^2(\mathbf{R})$ ,  $T_n f(x) := f(x/n)$  melkein kaikilla  $x$ .

d)  $X = Y = \ell_w^2$ , joka on painotettu  $\ell^2$ -avaruus

$$\ell_w^2 := \left\{ x = (x_k)_{k=1}^\infty \mid \|x\|_w := \left( \sum_{k=1}^\infty |x_k|^2 e^k \right)^{1/2} < \infty \right\}$$

ja

$$T_n : (x_k)_{k=1}^\infty \mapsto (x_{k-n})_{k=1}^\infty,$$

missä  $x_m := 0$ , kun  $m \leq 0$ .

3(\*). a) Olkoot  $X$  ja  $Y$  normiavaruuksia ja  $R : X \rightarrow Y$  avoin lineaarikuvaus. Osoita, että  $R$  on surjektio. b) Olkoon  $H$  Hilbert-avaruus ja  $S \in \mathcal{L}(H)$  sellainen, että jollekin vakiolle  $C > 0$

$$|(Sx|x)| \geq C\|x\|^2 \quad \forall x \in H.$$

Osoita, että  $S$  on bijektio ja  $\|S^{-1}\| \leq 1/C$ .

4(\*). Olkoot  $E, F$  ja  $G$  Banach-avaruuksia. Kuvaus  $A : E \times F \rightarrow G$  on *bilineaarinen*, jos kuvaukset  $A_{1,z} : E \rightarrow G$ ,  $A_{1,z}(x) := A(x, z)$  sekä  $A_{2,w} : F \rightarrow G$ ,  $A_{2,w}(y) := A(w, y)$  molemmat ovat lineaarisia, kaikilla  $w \in E$  ja  $z \in F$ . Osoita Banach-Steinhausin lauseen avulla, että bilineaarikuvaus  $A$  on rajoitettu (eli

$$\|A\| := \sup\{\|A(x, y)\|_G \mid \|x\|_E \leq 1, \|y\|_F \leq 1\} < \infty)$$

jos ja vain jos lineaarikuvaukset  $A_{1,z} : E \rightarrow G$  ja  $A_{2,w} : F \rightarrow G$  ovat rajoitettuja kaikilla  $w \in E$  ja  $z \in F$ .

\*\*\*\*\*

1.–2. Consider families consisting of bounded linear operators  $T_n : X \rightarrow Y$ , where  $n \in \mathbf{N}$  and  $X$  and  $Y$  are Banach spaces. According to the Banach–Steinhaus theorem, either

1° there exists  $M \in [0, \infty[$  such that

$$\|T_n\| \leq M$$

for all  $n$ , or

2° there exists a vector  $x \in X$  such that

$$\sup_{n \in \mathbf{N}} \|T_n x\|_Y = \infty.$$

In the following examples, find out which of the alternatives holds true. If it is 2°, then moreover find a vector  $x \in X$  with the claimed property.

a)  $X := \ell^2$ ,  $Y := \ell^1$ ,  $T_n : (x_k)_{k=1}^\infty \mapsto (x_k \chi_n(k))_{k=1}^\infty$ , where  $\chi_n(k) = 1$ , if  $k \leq n$  and  $\chi_n(k) = 0$ , if  $k > n$ .

b)  $X = Y = C(0, 1)$ , and  $T_n$  is the composition operator  $T_n f = f \circ \varphi_n$ ,  $\varphi_n(t) := t^n$ , for  $t \in [0, 1]$ .

c)  $X = Y = L^2(\mathbf{R})$ ,  $T_n f(x) := f(x/n)$  for almost all  $x$ .

d)  $X = Y = \ell_w^2$ , the weighted  $\ell^2$  space

$$\ell_w^2 := \left\{ x = (x_k)_{k=1}^\infty \mid \|x\|_w := \left( \sum_{k=1}^\infty |x_k|^2 e^k \right)^{1/2} < \infty \right\}$$

and

$$T_n : (x_k)_{k=1}^\infty \mapsto (x_{k-n})_{k=1}^\infty,$$

where  $x_m := 0$  for  $m \leq 0$ .

3(\*). a) Let  $X$  and  $Y$  be normed spaces and  $R : X \rightarrow Y$  be an open linear mapping. Prove that  $R$  is a surjection. b) Let  $H$  be a Hilbert space and  $S \in \mathcal{L}(H)$  such that for some constant  $C > 0$

$$|(Sx|x)| \geq C\|x\|^2 \quad \forall x \in H.$$

Show that  $S$  is a bijection and that  $\|S^{-1}\| \leq 1/C$ .

4(\*). Let  $E$ ,  $F$  and  $G$  be Banach spaces. A mapping  $A : E \times F \rightarrow G$  is *bilinear*, if both maps  $A_{1,z} : E \rightarrow G$ ,  $A_{1,z}(x) := A(x, z)$  and  $A_{2,w} : F \rightarrow G$ ,  $A_{2,w}(y) := A(w, y)$  are linear, for all  $w \in E$  and  $z \in F$ . Prove using the Banach–Steinhaus theorem that the bilinear map  $A$  is bounded, in other words

$$\|A\| := \sup\{\|A(x, y)\|_G \mid \|x\|_E \leq 1, \|y\|_F \leq 1\} < \infty,$$

if and only if the linear maps  $A_{1,z} : E \rightarrow G$  and  $A_{2,w} : F \rightarrow G$  are bounded for all  $w \in E$  and  $z \in F$ .