

1.2. Rajoitettu liikkuvista stokastisista prosesseista.

Olkoon $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ kiinteä todennäköisyyskenttä ja $\{Z(t) \mid t \in [a, b]\}$ perhe satunnaismuuttujia (Ω, \mathcal{F}) :llä. Siihen $Z = \{Z(t)\}$ on stokastinen prosessi. Jatkossa Z tulee usein olemaan Markov-hyppyprosessi äärellisellä tila-avaruudella.

Olkoon $\{\mathcal{F}_t\}$ kasvava jono \mathcal{F} in sigma-algebroita. Esimerkiksi

$$\mathcal{F}_t = \sigma(Z(s); s \leq t)$$

Tätä kutsutaan prosessin Z geneeriseksi historiaksi. Selvästi $\{\mathcal{F}_t\}$ on kasvava.

Olkoon $X = \{X(t)\}$ sapiva stokastinen prosessi ts. $X(t)$ on \mathcal{F}_t -mitallinen, $\forall t$. X :ää kutsutaan martingaliksi (mg), jos

$$(1.12) \quad \mathbb{E}(|X(t)|) < \infty, \quad \forall t,$$

$$(1.13) \quad \mathbb{E}(X(u) \mid \mathcal{F}_t) = X(t), \quad \forall a \leq t < u \leq b$$

($\mathbb{E}(X(u) \mid \mathcal{F}_t)$ on sellainen \mathcal{F}_t -mitallinen satunnaismuuttuja, että

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X(u) \mid \mathcal{F}_t) \mathbb{1}(B)) = \mathbb{E}(X(u) \mathbb{1}(B)),$$

$\forall B \in \mathcal{F}_t$). Ehdullisella odotuksella on

paljon samoja ominaisuuksia kuin tavallisella odotuksella, esimerkiksi lineaarisuus ja monotonisuus. Jatkossa kiinnostavampia tuloksia ovat myös

$$1) \quad E(Y | \mathcal{F}_t) = E(E(Y | \mathcal{F}_u) | \mathcal{F}_t), \quad t \leq u,$$

$$2) \quad \text{Jos } Y_1 \text{ on } \mathcal{F}_t\text{-mitallinen, niin } E(Y_1 | \mathcal{F}_t) = Y_1 \text{ ja}$$

$$E(Y_1 Y_2 | \mathcal{F}_t) = Y_1 E(Y_2 | \mathcal{F}_t).$$

Tarkastellaan vielä erikoistapausta, jossa

$$\mathcal{F}_t = \sigma(Z(s) | s \leq t)$$

ja $\{Z\}$ on Markov-prosessi tila-avaruutena $E = \{1, \dots, N\}$,
 jos $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ on mitallinen ja $t \leq u$, niin

$$E(f(Z(u)) | \mathcal{F}_t) = E(f(Z(u)) | Z(t))$$

$$= \sum_{j \in E} P_{Z(t), j}(t, u) f(j)$$

missä

$$P_{ij}(t, u) = P(Z(u) = j | Z(t) = i).$$

Olkoon X rajoitetusti heilahteleva cadlag-prosessi.
Tällöin sanon putket

$$t \mapsto X(t, \omega)$$

ovat rajoitetusti heilahtelevia cadlag-funktioita välillä $[a, b]$ kaikilla ω . Olkoon edelleen H sellainen vasemmalta jatkuva prosessi, että integraali

$$\int_a^t H(s) dX(s), \quad t \in [a, b],$$

on määritelty omegoitteen kohdan 1.1 mukaisesti.

Lemma 1.2. Olkoon X rajoitetusti heilahteleva cadlag-martingali ja H vasemmalta jatkuva sopiva rajoitetusti heilahteleva prosessi. Olkoon

$$X = X_1 - X_2,$$

missä X_1 ja X_2 ovat kasvavia sopivia cadlag-prosesseja. Oletetaan, että $E(|X_k(t)|) < \infty, \forall t \in [a, b]$, ja

$$E\left(\int_a^b |H(s)| dX_k(s)\right) < \infty, \quad k=1,2,$$

Silloin prosessi M ,

$$M(t) = \int_a^t H(s) dX(s), \quad t \in [a, b],$$

on martingali.

Todistus. Osoitetaan ensin, että $\mathbb{E}(|M(t)|) < \infty$, $\forall t$.
Selvästi

$$\begin{aligned} M(t) &= \int_a^t H(s) d\bar{X}_1(s) - \int_a^t H(s) d\bar{X}_2(s) \\ &\leq \int_a^t |H(s)| d\bar{X}_1(s) + \int_a^t |H(s)| d\bar{X}_2(s) \end{aligned}$$

ja

$$M(t) \geq - \int_a^t |H(s)| d\bar{X}_1(s) - \int_a^t |H(s)| d\bar{X}_2(s).$$

Sis

$$|M(t)| \leq \int_a^t |H(s)| d\bar{X}_1(s) + \int_a^t |H(s)| d\bar{X}_2(s)$$

ja $\mathbb{E}(|M(t)|) < \infty$. Raja-arvon (1.5) nojalla M on sopiva.

Olkoon $a \leq t < u \leq b$. On osoitettava, että

$$(1.13.1) \quad \mathbb{E}(|M(u)| | \mathcal{F}_t) = M(t).$$

Olkoon ensin $H(s, \omega) \geq 0$, $H(s, \omega) \leq B$, $\forall s, \omega$, missä $B > 0$ on vakio. Olkoon

$$a = s_0 < s_1 < \dots < s_{n-1} < s_n = u$$

sellainen välin $[a, u]$ jako, että t on eräs jakopiste. Olkoon $t = s_m$. Tällöin

Olkoon $H(s, \omega) \geq 0$, $\forall s, \omega$. Mielivaltaiselle $B > 0$ määritään

$$H^B(s, \omega) = \min(H(s, \omega), B).$$

Tällöin myös H^B täyttää lemmän ehdot, joten edellisen nojalla

$$\mathbb{E} \left(\int_a^u H^B(s) dX(s) \mid \mathcal{F}_t \right) = \int_a^t H^B(s) dX(s).$$

Kun $t \leq u$, $H^B(s, \omega) \uparrow H(s, \omega)$, $\forall s$, kun $B \rightarrow \infty$.
Monotonisen konvergenssin lauseen nojalla

$$\int_a^u H^B(s) dX_k(s) \uparrow \int_a^u H(s) dX_k(s), \forall \omega,$$

$k=1, 2$. Monotonisen konvergenssin lause ehdolliselle osotukselle antaa

$$\mathbb{E} \left(\int_a^u H(s) dX(s) \mid \mathcal{F}_t \right)$$

$$= \mathbb{E} \left(\int_a^u H(s) dX_1(s) \mid \mathcal{F}_t \right) - \mathbb{E} \left(\int_a^u H(s) dX_2(s) \mid \mathcal{F}_t \right)$$

$$= \lim_{B \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_a^u H^B(s) dX_1(s) \mid \mathcal{F}_t \right) - \lim_{B \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_a^u H^B(s) dX_2(s) \mid \mathcal{F}_t \right)$$

$$= \lim_{B \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_a^u H^B(s) dX(s) \mid \mathcal{F}_t \right) = \lim_{B \rightarrow \infty} \int_a^t H^B(s) dX(s)$$

$$= \int_a^t H(s) dX(s),$$

Siten (1.13.1) pätee, kun $H \geq 0$.

Olkoon kopuksi H ylet nen. Kirjoitetaan $H = H^+ - H^-$, missä

$$H^+(s, \omega) = \max(H(s, \omega), 0)$$

ja

$$H^-(s, \omega) = -\min(H(s, \omega), 0).$$

Selvästi H^+ ja H^- toteuttavat lemmän ehdot, joten
jo todistetaan nopealla

$$\mathbb{E} \left(\int_a^u H(s) dX(s) \mid \mathcal{F}_t \right)$$

$$= \mathbb{E} \left(\int_a^u H^+(s) dX(s) \mid \mathcal{F}_t \right) - \mathbb{E} \left(\int_a^u H^-(s) dX(s) \mid \mathcal{F}_t \right)$$

$$= \int_a^+ H^+(s) dX(s) - \int_a^+ H^-(s) dX(s)$$

$$= \int_a^+ H(s) dX(s). \quad \square$$

Jos X toteuttaa (1.12):n ja ehdon

$$(1.15) \quad \mathbb{E}(X(u) | \mathcal{F}_t) \geq X(t), \quad \forall a \leq t < u \leq b,$$

kutsutaan X :ää alimartingaaliksi. Alimartingaaliksi X voidaan usein esittää muodossa

$$(1.16) \quad X = M + A, \quad M(0) = 0,$$

missä M on martingali ja A on kasvava, sopiva ja jatkuva prosessi. Tällaisia erityyppisiä on kaikkiaan yksi (yhteensä on ns. Doob-Meyer-hajotelma). Kutsutaan A :aa X :in kompensoattoriksi. Heuristisesti,

$$dA(t) = \mathbb{E}(dX(t) | \mathcal{F}_{t-}),$$

missä

$$\mathcal{F}_{t-} = \sigma(\mathcal{F}_s | s < t).$$

Täsmällinen perustelu on suoraviivainen, jos tarkastellaan X :ää diskreetteinä ajankohkoina $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$. Olkoon nimittäin

$$\lambda(t_j) = \mathbb{E}(X(t_j) - X(t_{j-1}) | \mathcal{F}_{t_{j-1}})$$

ja

$$A(t_j) = X(0) + \sum_{j=1}^n \lambda(t_j).$$

Oletuksen (1.15) nojalla A on kasvava. Lisäksi

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}(X(t_j) - A(t_j) | \mathcal{F}_{t_{j-1}}) \\ &= \mathbb{E}(X(t_j) | \mathcal{F}_{t_{j-1}}) - (\mathbb{E}(X(t_j) | \mathcal{F}_{t_{j-1}}) - X(t_{j-1})) - \sum_{i=1}^{j-1} \lambda(t_i) - X(0) \\ &= X(t_{j-1}) - A(t_{j-1}). \end{aligned}$$

Siksi $M = X - A$ on martingali (jos (1.12) toteutuu M :lle).

Jos X on neliöintegroituva martingaali, ts. $\mathbb{E}(|X(t)|^2) < \infty, \forall t$, niin

$$\mathbb{E}(|X(t)|^2 | \mathcal{F}_s) \geq \mathbb{E}(|X(s)|^2 | \mathcal{F}_s) + X(s)^2, \forall s < t,$$

(Jensenin epäyhtälö ehdolliselle odotusarvolle), siis

X^2 on alimartingaali. Merkitään tämän kompensattoria symbolilla $\langle X \rangle$. Kaavan (1.8)

nopealla myös $[X]$ on alimartingaali, mikäli

stokastinen integraali

$$\int_a^t X(s-) dX(s), \quad t \in [a, b],$$

on martingaali ($[X](t)$ on X 'in neliöheilahdella

välillä $[a, t]$).

Lemma 1.3 Olkoon X rajatun heilahdeleva neliöintegroituva cadlag-martingaali. Olkoon

$$X = X_1 - X_2,$$

missä X_1 ja X_2 ovat kasvavia sopivia cadlag-prosesseja.

Oletetaan, että $\mathbb{E}(|X_k(t)|) < \infty, \forall t \in [a, b]$, ja

$$\mathbb{E}\left(\int_a^b |X(s-)| dX_k(s)\right) < \infty, \quad k=1, 2.$$

Silloin $\langle X \rangle$ on myös $[X]$ 'in kompensattori.

Todistus. Lemmien 1.1 ja 1.2 nojalla

$$[X] = X^c + \text{martingaali}.$$

Koska $\langle X \rangle = X^c + \text{martingaali}$, on myös

$$[X] = \langle X \rangle + \text{martingaali}. \quad \square$$

Lemma 1.4. Oletetaan X rajoitetusti heilhtelevä
cadlag-martingali ja

$$X = X_1 - X_2,$$

missä X_1 ja X_2 ovat kasvavia, sopivia ja
nelöintegroituvia cadlag-prosesseja. Oletetaan H
vasemmalta jatkuva sopiva rajoitetusti heilhtelevä
prosessi. Oletetaan, että

$$(1.17) \quad \mathbb{E} \left[\left(\int_a^b |H(s)| dX_k(s) \right)^2 \right] < \infty, \quad k=1, 2,$$

ja

$$(1.19) \quad \mathbb{E} \left(\int_a^b H(s)^2 d\langle X(s) \rangle \right) < \infty.$$

Silloin

$$(1.20) \quad \left\langle \int_a^t H(s) dX(s) \right\rangle = \int_a^t H(s)^2 d\langle X(s) \rangle, \quad t \in [a, b].$$

Todistus, Oletusten nojalla $E(|X_k(t)|) < \infty$, $\forall t \in [a, b]$,
oletuksen (1.17) ja lemmän 1.2 nojalla:

$$t \mapsto \int_a^t H(s) dX(s)$$

määrittelee neivointegroituvan martingalin. On siis mielekästä puhua kompensattorista (1.20),

Todennetaan seuraavaksi, että on riittäväi todistaa lemma tapauksessa, jossa

$$(1.21) \quad X(a) = 0, \quad X_1(a) = 0 \quad \text{ja} \quad X_2(a) = 0, \quad \forall \omega.$$

Nämä lisäoletukset pätevät nimittään martingaleille Y ,

$$\begin{cases} Y(t) = X(t) - X(a), & t \in [a, b], \\ Y(t) = Y_1(t) - Y_2(t) \\ Y_k(t) = X_k(t) - X_k(a), & k=1,2. \end{cases}$$

Kaikki lemmän muut oletukset pätevät yo. Y :lle. Nimittään $dX_k(s) = dY_k(s)$, joten integraalit oletuksessa (1.17) eivät muutu, kun X_k korvataan Y_k illa. Lisäksi $\langle X \rangle = \langle Y \rangle$, joten myös (1.19) pätee Y :lle (perustelu harjoituksissa). Jos (1.20) pätee Y :lle, niin se pätee myös X :lle. Vordaan siis olettaa todistuksessa (1.21),

Merkitään

$$G(t) = \left(\int_a^t H(s) dX(s) \right)^2, \quad t \in [a, b].$$

Olkoon ensin $0 \leq H(s, \omega) \leq B$, $\forall s, \omega$, missä $B > 0$ on vakio.

Olkoon $a \leq t < u \leq b$. Tarkastellaan tiheäjä jakola

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = u,$$

missä t on aina eräs jakopiste. Silloin

$$\begin{aligned}
& \left| \sum_{i=0}^{n-1} H(t_i) (\bar{x}(t_{i+1}) - \bar{x}(t_i)) \right| \\
& \leq \left| \sum_{i=0}^{n-1} H(t_i) (\bar{x}_1(t_{i+1}) - \bar{x}_1(t_i)) \right| + \left| \sum_{i=0}^{n-1} H(t_i) (\bar{x}_2(t_{i+1}) - \bar{x}_2(t_i)) \right| \\
& \leq B \left| \sum_{i=0}^{n-1} (\bar{x}_1(t_{i+1}) - \bar{x}_1(t_i) + \bar{x}_2(t_{i+1}) - \bar{x}_2(t_i)) \right| \\
& = B (\bar{x}_1(u) + \bar{x}_2(u)).
\end{aligned}$$

Nähdään, että

$$\begin{aligned}
& \left(\sum_{i=0}^{n-1} H(t_i) (\bar{x}(t_{i+1}) - \bar{x}(t_i)) \right)^2 \\
& \leq B^2 (\bar{x}_1(u) + \bar{x}_2(u))^2.
\end{aligned}$$

Koska

$$G(u) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=0}^{n-1} H(t_i) (\underline{X}(t_{i+1}) - \underline{X}(t_i)) \right)^2$$

nin dominoitu konvergenssi antaa

$$\mathbb{E}(G(u) | \mathcal{F}_t) = G(t)$$

$$+ 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\sum_{t_{i+1} \leq t} H(t_i) (\underline{X}(t_{i+1}) - \underline{X}(t_i)) \sum_{t_{i+1} > t} H(t_i) (\underline{X}(t_{i+1}) - \underline{X}(t_i)) \middle| \mathcal{F}_t \right)$$

$$+ \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\left(\sum_{t_{i+1} > t} H(t_i) (\underline{X}(t_{i+1}) - \underline{X}(t_i)) \right)^2 \middle| \mathcal{F}_t \right].$$

Keskimmäinen rivi on = 0, koska \underline{X} on martingaali, kts. (1.14). Suorittamalla toiseen korotus nähdään, että viimeisessä ehdollisessa odotusarvossa nolasta eroavaa termejä ovat vain nelit

$$\mathbb{E} (H(t_i)^2 (\underline{X}(t_{i+1}) - \underline{X}(t_i))^2 | \mathcal{F}_t), \quad t_{i+1} > t.$$

Tällaiselle saadaan erityis

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} (\mathbb{E} (H(t_i)^2 (\underline{X}(t_{i+1}) - \underline{X}(t_i))^2 | \mathcal{F}_{t_i}) | \mathcal{F}_t) \\ &= \mathbb{E} (H(t_i)^2 [\underline{X}(t_i)^2 - 2 \underline{X}(t_i) \underbrace{\mathbb{E}(\underline{X}(t_{i+1}) | \mathcal{F}_{t_i})}_{= \underline{X}(t_i)} + \mathbb{E}(\underline{X}(t_{i+1})^2 | \mathcal{F}_{t_i})] | \mathcal{F}_t) \end{aligned}$$

$$= \mathbb{E} (\mathbb{E} (H(t_i)^2 (\underline{X}(t_{i+1})^2 - \underline{X}(t_i)^2) | \mathcal{F}_{t_i} | \mathcal{F}_t)$$

$$= \mathbb{E} (H(t_i)^2 (\underline{X}(t_{i+1})^2 - \underline{X}(t_i)^2) | \mathcal{F}_t).$$

Koska $X(0) = X_1(0) = X_2(0) = 0$, niin

$$\begin{aligned}
 & \left| \sum_{t_i > t} H(t_i)^2 (X(t_{i+1})^2 - X(t_i)^2) \right| \\
 & \leq \left| \sum_{t_i > t} H(t_i)^2 (X_1(t_{i+1})^2 - X_1(t_i)^2) \right| \\
 & + \left| \sum_{t_i > t} H(t_i)^2 (X_2(t_{i+1})^2 - X_2(t_i)^2) \right| \\
 & + 2 \left| \sum_{t_i > t} H(t_i)^2 (X_1(t_{i+1})X_2(t_{i+1}) - X_1(t_i)X_2(t_i)) \right|.
 \end{aligned}$$

Itseisarvojen siinäkin olevat summat ovat ei-negatiivisia, joten saadaan yläraja

$$\begin{aligned}
 & B^2 (X_1(u)^2 - X_1(t)^2 + X_2(u)^2 - X_2(t)^2 \\
 & + 2X_1(u)X_2(u) - 2X_1(t)X_2(t)).
 \end{aligned}$$

Tämä on integroituva. Dominoidun konvergenssin nojalla

$$(1.21) \quad \mathbb{E}(G(u) | \mathcal{F}_t) = G(t) + \mathbb{E}\left(\int_t^u H(s)^2 d(X(s)^2) | \mathcal{F}_t\right).$$

alkoon

$$F(t) = \int_a^t H(s)^2 d(\langle X(s) \rangle), \quad t \in [a, b].$$

Tällöin

$$F(t) = \int_a^t H(s)^2 d(\langle X(s) \rangle) + \int_a^t H(s)^2 dM(s),$$

missä M on martingali,

$$\begin{cases} M(t) = \langle X(t) \rangle - X(t)^2 = M_1(t) - M_2(t), \\ M_1(t) = \langle X(t) \rangle + 2 \int_a^t X_1(s) X_2(s) ds, \\ M_2(t) = \int_a^t X_1(s)^2 ds + \int_a^t X_2(s)^2 ds. \end{cases}$$

Nyt

$$\mathbb{E} \left(\int_a^b H(s)^2 d(\langle X_k(s) \rangle) \right) \leq B^2 \mathbb{E}(\langle X_k(b) \rangle) < \infty, \quad k=1,2,$$

ja

$$\mathbb{E} \left(\int_a^b H(s)^2 d(X_1(s) X_2(s)) \right) \leq B^2 \mathbb{E}(X_1(b) X_2(b)) < \infty,$$

Lemman 1.2 nojella

$$F(t) = \int_a^t H(s)^2 d(\langle X(s) \rangle) + \text{martingali}.$$

Nähdään, että

$$\mathbb{E}(F(t) | \mathcal{F}_t) = F(t) + \mathbb{E} \left(\int_a^t H(s)^2 d(\langle X(s) \rangle) | \mathcal{F}_t \right),$$

ja edelleen, että $G - F$ on martingali.

Olkoon nyt $H \geq 0$ ja $H^B(s, \omega) = \min(H(s, \omega), B)$, missä $B > 0$ on vakio. Myös H^B täyttää lemmän ehdot, joten jo todistukseen riittää

$$\left\langle \int_a^t H^B(s) dX(s) \right\rangle = \int_a^t H^B(s)^2 d\langle X(s) \rangle,$$

Koska $H^B(s) \uparrow H(s)$, niin

$$\mathbb{E}\left(\left(\int_a^u H^B(s) dX_k(s)\right)^2 \mid \mathcal{F}_t\right) \rightarrow \mathbb{E}\left(\left(\int_a^u H(s) dX_k(s)\right)^2 \mid \mathcal{F}_t\right),$$

$k = 1, 2$, ja

$$\mathbb{E}\left(\left(\int_a^u H^B(s) dX_1(s)\right)\left(\int_a^u H^B(s) dX_2(s)\right) \mid \mathcal{F}_t\right) \rightarrow$$

$$\mathbb{E}\left(\left(\int_a^u H(s) dX_1(s)\right)\left(\int_a^u H(s) dX_2(s)\right) \mid \mathcal{F}_t\right).$$

Täsmälliset perusteet ovat samat kuin lemmän 1.2 todistuksessa. Siispä

$$\mathbb{E}\left(\left(\int_a^u H^B(s) dX(s)\right)^2 \mid \mathcal{F}_t\right) \rightarrow \mathbb{E}\left(\left(\int_a^u H(s) dX(s)\right)^2 \mid \mathcal{F}_t\right).$$

Samoin perustein

$$\mathbb{E}\left(\int_a^u H^B(s)^2 d\langle X(s) \rangle \mid \mathcal{F}_t\right) \rightarrow \mathbb{E}\left(\int_a^u H(s)^2 d\langle X(s) \rangle \mid \mathcal{F}_t\right).$$

Lopulta

$$\mathbb{E} \left(\left(\int_a^y H(s) d\mathbb{X}(s) \right)^2 - \int_a^y H(s)^2 d(\langle \mathbb{X}(s) \rangle) \mid \mathcal{F}_t \right)$$

$$= \lim_{B \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\left(\int_a^y H^B(s) d\mathbb{X}(s) \right)^2 - \int_a^y H^B(s)^2 d(\langle \mathbb{X}(s) \rangle) \mid \mathcal{F}_t \right)$$

$$= \lim_{B \rightarrow \infty} \left[\left(\int_a^+ H^B(s) d\mathbb{X}(s) \right)^2 - \int_a^+ H^B(s)^2 d(\langle \mathbb{X}(s) \rangle) \right]$$

$$= \left(\int_a^+ H(s) d\mathbb{X}(s) \right)^2 - \int_a^+ H(s)^2 d(\langle \mathbb{X}(s) \rangle).$$

Olleoon nyt H yleinen lemmän ehdot täyttävä prosessi ja $H = H^+ - H^-$ kuten lemmän 1.2 todistuksessa. Lemman tulos pätee H^+ :lle ja H^- :lle. Siis

$$\left\langle \int_a^+ H^+(s) d\mathbb{X}(s) \right\rangle = \int_a^+ H^+(s)^2 d(\langle \mathbb{X}(s) \rangle)$$

Ja

$$\left\langle \int_a^+ H^-(s) d\mathbb{X}(s) \right\rangle = \int_a^+ H^-(s)^2 d(\langle \mathbb{X}(s) \rangle).$$

Koska $(H^+ - H^-)^2 = (H^+)^2 + (H^-)^2$, niin

$$\begin{aligned} & \int_a^+ H(s)^2 d(\langle \mathbb{X}(s) \rangle) \\ &= \int_a^+ H^+(s)^2 d(\langle \mathbb{X}(s) \rangle) + \int_a^+ H^-(s)^2 d(\langle \mathbb{X}(s) \rangle). \end{aligned}$$

Olkoot X ja Y kaksi neliöintegroituvaa martingaalua. Tällöin

$$XY = \phi + M(t), \quad M(0) = 0,$$

missä ϕ on jatkuva rajoitetusti heilautteleva satuva prosessi ja M martingaali. Myös tällaisia esityksiä on korkeintaan yksi. Perusteeksi kiinnitetään

$$\begin{aligned} XY &= \frac{1}{4} \left((X+Y)^2 - (X-Y)^2 \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(\underbrace{\langle X+Y \rangle - \langle X-Y \rangle}_{\text{jatkuva ja rajoitetusti heilautteleva}} + \text{martingaali} \right). \end{aligned}$$

Merkitään jo. prosessia symbolilla $\langle X, Y \rangle$, siis $\phi = \langle X, Y \rangle$.

Nimityksiä:

$\langle X \rangle = X$ in ennustettava varianssi prosessi,

$\langle X, Y \rangle = X$ in ja Y in ennustettava kovarianssi prosessi.

Lemma 1.5. Oletetaan X ja Y kaksi rajoitetusti heilaittelevaa cadlag-martingalia ja

$$X = X_1 - X_2, \quad Y = Y_1 - Y_2,$$

missä X_1, X_2, Y_1 ja Y_2 ovat kasvavia, sopiaivia ja neliö-integroituvia cadlag-prosesseja. Oletetaan H_1 ja H_2 kaksi vasemmalta jatkuvaa, sopiaivaa ja rajoitetusti heilaittelevaa prosessia. Oletetaan, että

$$E\left(\left|\int_a^b |H_1(s)| dX_k(s)\right|^2\right) < \infty, \quad E\left(\left|\int_a^b |H_2(s)| dY_k(s)\right|^2\right) < \infty, \quad k=1,2,$$

ja

$$E\left(\int_a^b |H_1(s)| |H_2(s)| dZ_k(s)\right) < \infty, \quad k=1,2,$$

missä $\langle X, Y \rangle = Z_1 - Z_2$, ja Z_1 ja Z_2 ovat kasvavia, sopiaivia ja integroituvia cadlag-prosesseja. Silloin

$$\left\langle \int_a^t H_1(s) dX(s), \int_a^t H_2(s) dY(s) \right\rangle \\ = \int_a^t H_1(s) H_2(s) d(\langle X, Y \rangle(s)),$$

Lemman 1.5 todistus. Todistus on lemmän 1.4 laajennus.

Oletusten ja lemmän 1.2 nojalla sekä

$$t \mapsto \int_a^t H_1(s) d\bar{X}(s)$$

että

$$t \mapsto \int_a^t H_2(s) dY(s)$$

määrittelee neljän integroituvan martingalin. Siis lemmän väitteestä on mielekästä puhua.

On riittäväi todistaa lemma tapauksessa, jossa

$$(1.22) \quad \bar{X}(a) = \bar{X}_1(a) = \bar{X}_2(a) = 0, \quad Y(a) = Y_1(a) = Y_2(a) = 0.$$

Tähän tilanteeseen nimittään päistään muunnella

$$\bar{X}(t) = \bar{X}(t) - \bar{X}(a), \quad \bar{X}_k(t) = \bar{X}_k(t) - \bar{X}_k(a), \quad k=1,2$$

$$Y(t) = Y(t) - Y(a), \quad Y_k(t) = Y_k(t) - Y_k(a), \quad k=1,2$$

$$\bar{X}(t) = \bar{X}_1(t) - \bar{X}_2(t), \quad Y(t) = Y_1(t) - Y_2(t).$$

Lemman oletukset pätevät muunnelle prosessille, erityisesti

$$\langle \bar{X}, \bar{Y} \rangle = \langle X, Y \rangle,$$

ja tulos muunnelle ja alkuperäiselle prosessille on sama. Voidaan siis olettaa (1.22),

Merkitään

$$G(t) = \int_a^t H_1(s) dX(s) + \int_a^t H_2(s) dY(s), \quad t \in [a, b],$$

Olkoon ensin $0 \leq H_k(s, \omega) \leq B$, $\forall s, \omega$, missä $B > 0$ on vakio.

Olkoon $a \leq t < u \leq b$. Tarkastellaan teheneviä jakoja

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = u,$$

missä t on aina eräs jakopiste. Silloin

$$\left| \sum_{i=1}^n H_1(t_i) (X(t_{i+1}) - X(t_i)) \right| \leq B (X_1(u) + X_2(u))$$

ja

$$\left| \sum_{i=1}^n H_2(t_i) (Y(t_{i+1}) - Y(t_i)) \right| \leq B (Y_1(u) + Y_2(u)),$$

ks. lemmän 1.4 todistus. Siis

$$\left| \left(\sum_{i=1}^n H_1(t_i) (X(t_{i+1}) - X(t_i)) \right) \left(\sum_{i=1}^n H_2(t_i) (Y(t_{i+1}) - Y(t_i)) \right) \right|$$

$$\leq B^2 (X_1(u) + X_2(u)) (Y_1(u) + Y_2(u)).$$

Tämä on integroitava, joten voidaan soveltaa dominoitujen konvergenssin lausetta seuraavassa. Saadaan

$$\mathbb{E}(G(u) | \mathcal{F}_t) = \mathbb{E} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n H_1(t_i) (Z(t_{i+n}) - Z(t_i)) + \sum_{i=1}^n H_2(t_i) (Y(t_{i+n}) - Y(t_i)) \right) \middle| \mathcal{F}_t \right)$$

$$= G(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\left(\sum_{t_{i+n} \leq t} H_1(t_i) (Z(t_{i+n}) - Z(t_i)) + \sum_{t_{i+n} > t} H_2(t_i) (Y(t_{i+n}) - Y(t_i)) \right) \middle| \mathcal{F}_t \right)$$

$$+ \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\left(\sum_{t_{i+n} > t} H_1(t_i) (Z(t_{i+n}) - Z(t_i)) + \sum_{t_{i+n} < t} H_2(t_i) (Y(t_{i+n}) - Y(t_i)) \right) \middle| \mathcal{F}_t \right)$$

$$+ \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\left(\sum_{t_{i+n} > t} H_1(t_i) (Z(t_{i+n}) - Z(t_i)) + \sum_{t_{i+n} > t} H_2(t_i) (Y(t_{i+n}) - Y(t_i)) \right) \middle| \mathcal{F}_t \right)$$

Jos $t_j > t_i$, niin esimerkiksi

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left(H_1(t_i) (Z(t_{i+n}) - Z(t_i)) H_2(t_j) (Y(t_{j+n}) - Y(t_j)) \middle| \mathcal{F}_t \right) \\ &= \mathbb{E} \left(\mathbb{E}(\cdot | \mathcal{F}_{t_j}) \right) \\ &= \mathbb{E} \left(H_1(t_i) (Z(t_{i+n}) - Z(t_i)) H_2(t_j) \underbrace{\mathbb{E}(Y(t_{j+n}) - Y(t_j) | \mathcal{F}_{t_j})}_{=0} \middle| \mathcal{F}_t \right) \\ &= 0, \end{aligned}$$

Sis

$$\mathbb{E}(G(u) | \mathcal{F}_t) = G(t)$$

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\sum_{t_i > t} H_1(t_i) (X(t_{i+1}) - X(t_i)) H_2(t_i) (Y(t_{i+1}) - Y(t_i)) | \mathcal{F}_t \right)$$

Yksittäisen termin ehdollinen odotusarvo summassa on

$$\mathbb{E} \left(H_1(t_i) H_2(t_i) \mathbb{E} \left(X(t_{i+1}) Y(t_{i+1}) - X(t_{i+1}) Y(t_i) - X(t_i) Y(t_{i+1}) + X(t_i) Y(t_i) | \mathcal{F}_{t_i} \right) | \mathcal{F}_t \right)$$

$$= \mathbb{E} \left(H_1(t_i) H_2(t_i) \left(\mathbb{E} \left(X(t_{i+1}) Y(t_{i+1}) | \mathcal{F}_{t_i} \right) - X(t_i) Y(t_i) \right) | \mathcal{F}_t \right)$$

$$= \mathbb{E} \left(H_1(t_i) H_2(t_i) \mathbb{E} \left(X(t_{i+1}) Y(t_{i+1}) - X(t_i) Y(t_i) | \mathcal{F}_{t_i} \right) | \mathcal{F}_t \right)$$

$$= \mathbb{E} \left(H_1(t_i) H_2(t_i) \left(X(t_{i+1}) Y(t_{i+1}) - X(t_i) Y(t_i) | \mathcal{F}_t \right) \right)$$

Käijoi thamalla

$$X(t_{i+1}) Y(t_{i+1}) - X(t_i) Y(t_i)$$

$$= X_1(t_{i+1}) Y_1(t_{i+1}) - X_1(t_i) Y_1(t_i)$$

$$- (X_1(t_{i+1}) Y_2(t_{i+1}) - X_1(t_i) Y_2(t_i))$$

$$- (X_2(t_{i+1}) Y_1(t_{i+1}) - X_2(t_i) Y_1(t_i))$$

$$+ X_2(t_{i+1}) Y_2(t_{i+1}) - X_2(t_i) Y_2(t_i)$$

nähdään kuitenkin lemmassa 1.4, että

$$\left| \sum_{t_{i-1} > t} H_1(t_{i-1}) (\bar{X}(t_{i-1}) - \bar{X}(t_i)) H_2(t_{i-1}) (Y(t_{i-1}) - Y(t_i)) \right|$$

$$\leq B^2 (\bar{X}_1(t) Y_1(t) + \bar{X}_1(t) Y_2(t) + \bar{X}_2(t) Y_1(t) + \bar{X}_2(t) Y_2(t))$$

Tämä on integroituva, joten

$$\mathbb{E}(G(t) | \mathcal{F}_t) = G(t) + \mathbb{E} \left(\int_t^u H_1(s) H_2(s) d(\bar{X}(s) Y(s)) | \mathcal{F}_t \right).$$

Olkoon

$$F(t) = \int_a^t H_1(s) H_2(s) d(\langle \bar{X}, Y \rangle(s)).$$

Tällöin

$$F(t) = \int_a^t H_1(s) H_2(s) d(\bar{X}(s) Y(s)) - \int_a^t H_1(s) H_2(s) dM(s),$$

missä M on martingali,

$$\left\{ \begin{array}{l} M(t) = \langle \bar{X}, Y \rangle(t) - \bar{X}(t) Y(t) = M_1(t) - M_2(t) \\ M_1(t) = Z_1(t) + \bar{X}_1(t) Y_2(t) + \bar{X}_2(t) Y_1(t) \\ M_2(t) = Z_2(t) + \bar{X}_1(t) Y_1(t) + \bar{X}_2(t) Y_2(t). \end{array} \right.$$

Lemmasta 1.2 seuraa, että

$$F(t) = \int_a^t H_1(s) H_2(s) d(\bar{X}(s) Y(s)) + \text{martingali}$$

ja edelleen, että $G-F$ on martingali.

olevat nyt $H_1 \geq 0$ ja $H_2 \geq 0$ sekä

$$H_k^B(s, \omega) = \min(H_k(s, \omega), 0), \quad k=1, 2.$$

Jo todistettiin helpolla lemmän väite on tosi, kun H_k korvataan $H_k^B : U \rightarrow \mathbb{R}$. Monotonisen konvergenssin nojalla

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left(\int_a^u H_1^B(s) dX_j(s) \int_a^u H_2^B(s) dY_k(s) \mid \mathcal{F}_+ \right) \uparrow \\ & \mathbb{E} \left(\int_a^u H_1(s) dX_j(s) \int_a^u H_2(s) dY_k(s) \mid \mathcal{F}_+ \right), \end{aligned}$$

jos $k=1, 2$. Siis pä

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left(\int_a^u H_1^B(s) dX(s) \int_a^u H_2^B(s) dY(s) \mid \mathcal{F}_+ \right) \\ & \rightarrow \mathbb{E} \left(\int_a^u H_1(s) dX(s) \int_a^u H_2(s) dY(s) \mid \mathcal{F}_+ \right). \end{aligned}$$

Samoin nähdään, että

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left(\int_a^u H_1^B(s) H_2^B(s) d(\langle X, Y \rangle(s)) \mid \mathcal{F}_+ \right) \\ & \rightarrow \mathbb{E} \left(\int_a^u H_1(s) H_2(s) d(\langle X, Y \rangle(s)) \mid \mathcal{F}_+ \right). \end{aligned}$$

Edelleen

$$\mathbb{E} \left(\int_a^u H_1(s) dX(s) \int_a^u H_2(s) dY(s) - \int_a^u H_1(s) H_2(s) d\langle X, Y \rangle(s) \mid \mathcal{F}_t \right)$$

$$= \lim_{B \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_a^u H_1^B(s) dX(s) \int_a^u H_2^B(s) dY(s) - \int_a^u H_1^B(s) H_2^B(s) d\langle X, Y \rangle(s) \mid \mathcal{F}_t \right)$$

$$= \lim_{B \rightarrow \infty} \left(\int_a^t H_1^B(s) dX(s) \int_a^t H_2^B(s) dY(s) - \int_a^t H_1^B(s) H_2^B(s) d\langle X, Y \rangle(s) \right)$$

$$\circ \quad = \int_a^t H_1(s) dX(s) \int_a^t H_2(s) dY(s) - \int_a^t H_1(s) H_2(s) d\langle X, Y \rangle(s).$$

Olkoot kopulit H_1 ja H_2 yleisiä ja

$$H_1 = H_1^+ - H_1^-, \quad H_2 = H_2^+ - H_2^-.$$

Lemman tulos pätee positiivisille ja negatiivisille H_1^+ , H_1^- , H_2^+ ja H_2^- .
Siis

$$\int_a^t H_1(s) H_2(s) d\langle X, Y \rangle(s)$$

$$= \int_a^t H_1^+(s) H_2^+(s) d\langle X, Y \rangle(s)$$

$$- \int_a^t H_1^+(s) H_2^-(s) d\langle X, Y \rangle(s)$$

$$- \int_a^t H_1^-(s) H_2^+(s) d\langle X, Y \rangle(s)$$

$$+ \int_a^t H_1^-(s) H_2^-(s) d\langle X, Y \rangle(s).$$

Toteutetaan

$$\begin{aligned}
 & \int_a^t H_1(s) dX(s) - \int_a^t H_2(s) dY(s) \\
 = & \int_a^t H_1^+(s) dX(s) - \int_a^t H_1^-(s) dX(s) - \int_a^t H_2^+(s) dY(s) + \int_a^t H_2^-(s) dY(s) \\
 = & \int_a^t H_1^+(s) dX(s) - \int_a^t H_1^-(s) dX(s) - \int_a^t H_2^+(s) dY(s) + \int_a^t H_2^-(s) dY(s).
 \end{aligned}$$

Jo todistetaan nojalla symmetrisi:

$$\begin{aligned}
 & \int_a^t H_1^+(s) dX(s) - \int_a^t H_2^+(s) dY(s) \\
 = & \int_a^t H_1^+(s) H_2^+(s) d(\langle X, Y \rangle(s)) + \text{martingalei}.
 \end{aligned}$$

Nähdään, että

$$\begin{aligned}
 & \int_a^t H_1(s) dX(s) - \int_a^t H_2(s) dY(s) \\
 = & \int_a^t H_1(s) H_2(s) d(\langle X, Y \rangle(s)) + \text{martingalei}. \quad \square
 \end{aligned}$$