

Todennäköisyysteorian luennot, syksy 2012

Dario Gasbarra¹

12. joulukuuta 2012

¹Helsingin Yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Sisältö

1	Miksi todennäköisyydet ovat additiivisia ?	5
2	Kolmogorovin aksioomat.	21
2.1	Mitan laajennus	24
2.2	Sovellus: Tulo σ -algebra ja tulo-todennäköisyys	35
3	Satunnaismuuttujat	37
4	Odotusarvo.	41
4.1	Monotoninen konvergenssilause.	47
4.2	Odotusarvon sovellus: mitan vaihto	53
4.2.1	Uskottavuusosamäärä	54
4.2.2	Lebesguen hajotelma	56
5	Riippumattomuus	59
5.0.1	Lovaszin lokaali lemma	61
5.1	Borel Cantelli lemmat	64
6	Stokastinen konvergenssi	69
6.1	Funktionaalianalyysin peruskäsitteiden pika-sanasto	72
7	Tasainen integroituvuus ja $L^1(P)$-konvergenssi	75
8	Fubinin lause ja tulo-todennäköisyys	85
8.0.1	Osittaisintegroinnin kaava	92

8.0.2	Sovellus: odotusarvon derivointi parametrin suhteen	93
9	$L^p(\Omega)$ avaruudet	99
9.0.1	Epäyhtälöt	99
9.1	Projektio $L^2(P)$ avaruudessa	107
10	Ehdollinen odotusarvo	111
10.1	Ehdollinen odotusarvo Radon-Nykodim derivaattana . . .	113
10.2	Mitä voidaan sanoa kun $E_P(X) = \infty$?	114
10.3	Ehdollisen odotusarvon ominaisuudet	115
10.4	Säännöllinen ehdollinen todennäköisyys ja ytimet	116
10.5	Ehdollisen odotusarvon laskenta P -riippumattomuuden oletuksen nojalla	117
10.6	Ehdollisen odotusarvon laskenta mitan-vaihdon avulla: Bayesin kaava	119
10.6.1	Ehdollisen odotusarvon laskenta tuloavaruudessa . .	121
10.7	Ehdollistaminen nollamittaisiin tapahtumiin: varoitus . . .	124
11	Jakaumien konvergenssi	129
11.0.1	Skorokhodin esitys	131

Luku 1

Miksi todennäköisyydet ovat additiivisia ?

My Thesis, paradoxically and a little provocatively, but nonetheless genuinely, is simply this:

PROBABILITY DOES' NOT EXISTS.

The abandonment of superstitious beliefs about the existence of Phlogiston, the Cosmic Ether, Absolute Space and Time, . . . , or Faires and Witches was an essential step along the road on scientific thinking. Probability too, if regarded as something endowed with some kind of objective existence is no less a misleading misconception, an illusory attempt to exteriorize or materialize our true probabilistic beliefs. Bruno De Finetti, Theory of Probability, a critical introductory treatment (1972).

Aloitan tällä (ja lopetan saman tien) tätä pohdiskelua: On merkillistä että, matemaattisesta sivistyksestä riippumatta, todennäköisyyskäsite on kaikille tuttu: me kaikki ymmärrämme mitä jalkapallonvalmentaja tarkoittaa kun kertoo radiossa että hänen mielestä joukkueensa voittomahdollisuudet ovat noin 60% (vaikka me voimme olla eri mieltä luvusta ja todennäköisyyden filosofiasta).

Kuten meidän kauaiset esi-isämme, joudumme jatkuvasti tekemaan isompia tai pienempia päätöksiä epävarmuuden tilassa. Luonnon valinta on muokannut meidän aivoihimme vaistomaista älykkyyttä hahmotta-

6 LUKU 1. MIKSI TODENNÄKÖISYYDET OVAT ADDITIIVISIA ?

maan ja vertailemaan eri mahdollisuuksien "uskottavuuksia", ottaamalla huomioon aikaisempaa kokemusta ja ympäristöltä tulevaa informaatiota.

Mittateoria saa uuden maun, koska sen ongelmat ja tulokset voidaan tulkita "jokamiehen" todennäköisyyskäsitteen valossa.

M. Kac sen lausui: "*Probability theory is measure theory with a soul*" eli ("*Todennäköisyysteoria on mittateoria jolla on sielua*").

Kun hypoteettiset avaruusolennot vihdoinkin saapuvat maahan ja ilmenee että he osaavat jo koko meidän matematiikkamme ja mittateoriamme, pystyisivätkö he silti ymmärtämään mitä todennäköisyys tarkoittaa meille ?

Todennäköisyys = Hinta Bruno De Finetti (1906-1985) oli matemaatikko, taloustieteilijä ja filosofi. Hänen tieteenfilosofiassa torjutaan absoluuttisen todennäköisyyden käsite. Sen sijaan todennäköisyydellä on puhtaasti operaativinen merkitys. Todennäköisyydet ovat aina suhteellisia, meidän tiedon tilasta riippuen.

Epävarmassa maailmassa, tapahtumat voidaan luokitella kahteen luokkaan, $\mathcal{V} = \{ \text{varmat tapahtumat} \}$ ja $\mathcal{E} = \{ \text{epävarmat tapahtumat} \}$.

Kun tapahtuma $E \in \mathcal{V}$ on varma ja $F \supseteq E$ eli F tapahtuu aina silloin kun E tapahtuu, seuraa että myös $F \in \mathcal{V}$ on varma. Tapahtuma E on mahdoton jos sen negaatio E^c (joka tapahtuu silloin kun E ei tapahdu) on varma.

Merkitään luokka $\mathcal{N} = \{ \text{mahdottomat tapahtumat} \}$ ja sanotaan että tapahtumat E, F ovat keskenään *ei sopivia* kun niiden yhteensattuma on mahdoton, eli $(E \cap F) \in \mathcal{N}$. Huomataan myös että jokaiselle tapahtumalle E , $(E \cup E^c) \in \mathcal{V}$. Kun E ja F ovat tapahtumia, $(E \cup F)$ merkitsee tapahtuman jossa E tai F tapahtuvat.

Eräs vedonlyöntimeklari ottaa vastaan vetoja tapahtumista E_1, \dots, E_n , jotka ovat keskenään ei-sopivia, siis $(E_i \cap E_j) \in \mathcal{N}$ (mahdoton tapahtuma) kun $i \neq j$. Tarkemmin, meklarin on pakko ottaa vastaan mitä tahansa vetoja (myös negatiivisilla panoksilla) tapahtumista $E_i, i = 1, \dots, n$, ja niiden yhdisteistä $(E_i \cup E_j), (E_i \cup E_j \cup E_k), \dots$ jne.

Meklari valitsee kuitenkin vetojen hinnat (tulkinta: **todennäköisyydet**) $Pr(E_i), Pr(E_i \cup E_j), Pr(E_i \cup E_j \cup E_k) \dots$ jne.

Merkinnät: $p_i := Pr(E_i)$, "satunnaissuure" $\mathbf{1}_{E_i}$ on tapahtuman E_i :n indikaattori joka saa arvon 1 jos "sattuma" E_i tapahtuu, muuten 0.

Pr lyhennys sopii hyvin molemmille englanninkielisille sanoille

Price = hinta ja **Probability** = todennäköisyys.

Vastapuolen voitto on satunnaissuure

$$V = (\mathbf{1}_{E_1} - p_1)y_1 + \dots + (\mathbf{1}_{E_n} - p_n)y_n$$

jossa $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ on vastapuolen vapaasti valittavissa oleva vedonlyöntistrategia.

Jos meklari on johdonmukainen, hän määrää vedonlyönnin hinnat siten, että vastapuolelle ei syntyisi *arbitraasimahdollisuuksia*, eli tilaisuuksia joissa voi tehdä riskitöntä voittoa.

Teoreema 1.0.1. (Tämä on väite eikä määritelmä !)

Arbitraasivapausoletuksesta seuraa välittömästi:

1. Vetojen hinnat ovat yksikäsitteisiä (yhden hinnan laki), vedolle $\mathbf{1}_{E_i}$ on vain yksi hinta $Pr(E_i) \in [0, 1]$.
2. Jos $E_i \in \mathcal{V}$ (varma tapahtuma), $Pr(E_i) = 1$ ja vastaavasti jos $E_i \in \mathcal{N}$ (mahdoton tapahtuma), niin $Pr(E_i) = 0$.
3. Hinnat (eli todennäköisyydet) ovat (äärellisesti)-additiivisia.

Todistus : (1),(2): Harjoitustehtävä.

8 LUKU 1. MIKSI TODENNÄKÖISYYDET OVAT ADDITIIVISIA ?

(3): Olkoon ensin $n = 2$, $(E_1 \cap E_2) \in \mathcal{N}$, sen lisäksi oletamme että $(E_1 \cup E_2) \in \mathcal{V}$ (eli on varma tapahtuma). Siitä seuraa $Pr(E_1 \cup E_2) = 1$.

Lineaarisella systeemillä

$$\begin{cases} V(E_1) = (1 - p_1)y_1 - p_2y_2 = & \text{vastapuolen voitto kun } E_1 \text{ tapahtuu} \\ V(E_2) = -p_1y_1 + (1 - p_2)y_2 = & \text{vastapuolen voitto kun } E_2 \text{ tapahtuu} \end{cases}$$

on ratkaisu mille tahansa voitto-vektorille $(V(E_1), V(E_2))$ jos ja vain jos kertoimien matriisi on kääntyvä, eli

$$\det \begin{pmatrix} (1 - p_1) & -p_2 \\ -p_1 & (1 - p_2) \end{pmatrix} = 1 - p_1 - p_2 \neq 0$$

Estääkseen vastapuolta tekemistä riskitöntä voittoa, on välttämätöntä että

$$Pr(E_1) + Pr(E_2) = 1 = Pr(E_1 \cup E_2).$$

Kun $n > 2$, $E_i \cap E_j \in \mathcal{N}$ kun $i \neq j$ ja, $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n \in \mathcal{V}$ (eli on varma), meklari on johdonmukainen jos ja vain jos

$$\det \begin{pmatrix} (1 - p_1) & -p_2 & \dots & -p_n \\ -p_1 & (1 - p_2) & \dots & -p_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -p_1 & -p_2 & \dots & (1 - p_n) \end{pmatrix} = 1 - p_1 - p_2 - \dots - p_n = 0$$

(determinantti lasketaan induktiolla tai Sylvesterin lemman kautta).

Yleisemmin, kun $(E_1 \cap E_2) \in \mathcal{N}$, koska $(E_1 \cup E_2 \cup (E_1 \cup E_2)^c) \in \mathcal{V}$, seuraa

$$1 = Pr(E_1) + Pr(E_2) + Pr((E_1 \cup E_2)^c) = Pr(E_1) + Pr(E_2) + (1 - Pr(E_1 \cup E_2))$$

siis $Pr(E_1 \cup E_2) = Pr(E_1) + Pr(E_2)$ \square

Oletetaan että meklari on hinnoitellut johdonmukaisesti keskenään ei-sopivia tapahtumia E_1, \dots, E_n ja niiden yhdisteitä hinnoilla $Pr(E_1), \dots, Pr(E_n)$, jossa P on äärellisesti additiivinen.

Käsitellään vielä monimutkaisempi vedonlyöntisopimus (“satunnaisuure”)

$$X = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{1}_{E_i} = \sum_{x \in \mathbb{R}} x \mathbf{1}_{E_x}$$

jossa

$$E_x := \bigcup_{1 \leq i \leq n: x_i = x} E_i = (\text{“}X \text{ saa arvon } x\text{”}).$$

ja $E_x = \emptyset$ jos $x \neq x_i \forall i$.

Vedonlyöntinsopimus X maksaa vastapuolelle etukäteen sovittua summaa $x_i \in \mathbb{R}$ silloin kun “sattuma” E_i tapahtuu.

Tämä sopimus on “toistettavissa” vedonlyönnin strategialla (x_1, \dots, x_n) .

Koska arbitraasivapaassa hinnoittelusysteemissä hinnat ovat yksikäsitteisiä, seuraa että X :n ainoa johdonmukainen hinta (tulkinta: satunnaisuureen **odotusarvo**, englanniksi Expectation) on

$$\mathbb{E}_{Pr}(X) := \sum_{i=1}^n x_i Pr(E_i) = \sum_{x \in \mathbb{R}} x Pr(E_x).$$

Huomautus 1.0.1. Olkoon

$$\mathcal{X} \subseteq \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{1}(E_i) : n \in \mathbb{N}, x_i \in \mathbb{R} \right\}$$

vedonlyöntinsopimusten osajoukko.

Matemaattisessa finanssiteoriassa, karakterisoidaan hintasysteemejä $c = (c(X) : X \in \mathcal{X})$ joilla ei synny arbitraasi-mahdollisuuksia, silloin kun mahdottomien tapahtumien luokka \mathcal{N} on kiinnitetty.

Oletuksella $\mathbf{1}_V \in \mathcal{X}$ ja $c(\mathbf{1}_V) = 1 \forall V \in \mathcal{V}$ (varmoilla tapahtumilla on hinta 1), seuraa että hinnoittelusysteemi $c(\cdot)$ on arbitraasi-vapaa jos ja vain jos on olemassa hinnoittelu-todennäköisyys Pr , jolla $Pr(E) = 0 \iff E \in \mathcal{N}$ ja kaikille $X \in \mathcal{X}$

$$c(X) = \mathbb{E}_{Pr}(X) = \sum_{i=1}^n x_i Pr(E_i)$$

hinnoittelu todennäköisyys ei tarvitse olla yksikäsitteinen

Arbitraasi-vapaassa tilanteessa, hinnoittelu-todennäköisyyden P :n avulla, määrittelemällä

$$c(Y) = \mathbb{E}_{Pr}(Y) = \sum_i y_i Pr(E_i)$$

laajennetaan alkuperäistä hintasysteemiä säilyttämällä arbitraasivapaus.

Kun on olemassa, hinnoittelutodennäköisyys P ei tarvitse olla yksikäsitteinen, siis jos hinta-systeemi $(c(X) : X \in \mathcal{X})$ on arbitraasi-vapaa, sillä voi olla useita arbitraasi-vapaita laajennuksia.

Huomautus 1.0.2. Tässä johdannossa emme ole vielä paljastaneet että Kolmogorovin todennäköisyyden aksiomeissa tapahtumat E_i tulevat olemaan jonkun pistetapahtumien avaruuden Ω :n osajoukkoja. Sen sijaan De Finetti kannatti minimaalista lähestymistapaa, jossa pistetapahtumien avaruutta Ω ei edes tarvita.

Todennäköisyys logiikan laajenuksena Vuonna 1949 fyysikko R.T. Cox osoitti miten De Finettin additiivisen todennäköisyyden aksiomat seuraavat kun laajennetaan perinteistä logikkaa epävarmoihin väitteisiin pitämällä kiinni minimaalisista tervejärkisistä ehdoista.

Olkoon A, B, C väitteitä (tapahtumia), I merkitsee (sinun) taustatietoa. Notaatio

$$(A|I) \geq (B|I)$$

tarkoittaa että taustatiedon I :n perusteella väite A on (sinulle) yhtä uskottava tai uskottavampi kun B väiteettä.

- Vaatimus 1): \geq relaatio on täydellinen järjestys, eli on *transitiivinen*

$$(A|I) \geq (B|I) \text{ ja } (B|I) \geq (C|I) \text{ seuraa } (A|I) \geq (C|I), \quad (1.0.1)$$

ja taustatiedolla I kaikki väitteet ovat verrattavissa, eli

$$(A|I) \geq (B|I) \text{ tai } (B|I) \geq (A|I) \quad (1.0.2)$$

Kun molemmat ovat voimassa $(B|I) = (A|I)$, eli taustatiedolla I , väitteet A ja B ovat sinulle yhtä uskottavia.

Koska väitteiden järjestys on täydellinen, taustatiedon I :n perusteella voidaan asentaa jokaiselle väitteelle A uskottavuusaste joka on reaaliluku jota merkitsemme aluksi samalla notaatiolla $(A|I)$. Väitteiden järjestys palautuu reaalilukujen järjestykseen. Tämä uskottavuusaste-funktio ei ole tietenkään yksikäsitteinen. Näytämme että on olemassa funktionaali $\pi(A|I)$ joka säilyttää \geq järjestyksen ja toteuttaa De Finettin additiivisen todennäköisyyden vaatimukset.

Jatkossa merkitään $AB = A \cap B$.

- Vaatimus 2) On olemassa kuvaus $F(x, y)$ joka on kasvava ja derivoituva ja x, y :n suhteen

$$(AB|I) = F((A|I), (B|A, I)) = F((B|I), (A|B, I))$$

Siis $(A|I)$ ja $(B|AI)$ määrävät $(AB|I)$ terveen järjen mukaisesti, ja joudutaan samaan arvoon arvioimalla ensin $(B|I)$ ja sitten $(A|B, I)$.

Erityisesti

$$(ABC|I) = F(F(x, y), z) = F(x, F(y, z)) \quad (1.0.3)$$

$$= F(u, z) = F(x, v) \quad (1.0.4)$$

jossa $x = (A|I)$, $y = (B|A, I)$, $z = (C|AB, I)$, $u = F(x, y)$, $v = F(y, z)$

Lemma 1.0.1. *Vaatimuksista seuraa että on olemassa kasvava kuvaus $w : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jolla $w(F(x, y)) = w(x) + w(y)$*

Tod. Olkoon $F_1(x, y), F_2(x, y)$ osittaisderivaatat. Derivoimalla 1.0.3 saa-

daan

$$\begin{aligned} \frac{\partial(F(F(x, y), z))}{\partial x} &= \frac{\partial(F(x, F(y, z)))}{\partial x} \\ \iff F_1(u, z)F_1(x, y) &= F_1(x, v), \\ \frac{\partial(F(F(x, y), z))}{\partial y} &= \frac{\partial(F(x, F(y, z)))}{\partial y} \\ \iff F_1(u, z)F_2(x, y) &= F_2(x, v)F_1(y, z), \\ \frac{F_2(x, y)}{F_1(x, y)} &= \frac{F_2(x, v)}{F_1(x, v)}F_1(y, z) \\ \iff G(x, y) &= G(x, v)F_1(y, z) \\ \iff G(x, v)F_2(y, z) &= G(x, y)G(y, z) \text{ jossa } G(x, y) := \frac{F_2(x, y)}{F_1(x, y)} \end{aligned}$$

Derivoimalla seuraa

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial}{\partial z} \left(G(x, v)F_1(y, z) \right) = G_2(x, v)F_2(y, z)F_1(y, z) + G(x, v)F_{12}(y, z) \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left(G(x, v)F_2(y, z) \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(G(x, y)G(y, z) \right) \end{aligned}$$

eli $G(x, y)G(y, z)$ ei riipu y :stä. Tämä pätee jos ja vain jos G on muotoa

$$G(x, y) = r \frac{H(x)}{H(y)}$$

Tästä seuraa

$$F_1(y, z) = \frac{H(v)}{H(y)} \quad F_2(y, z) = r \frac{H(v)}{H(z)}$$

Seuraa

$$\begin{aligned} dv &= dF(y, z) = F_1(y, z)dy + F_2(y, z)dz \\ \iff \frac{1}{H(v)}dv &= \frac{1}{H(y)}dy + r \frac{1}{H(z)}dz \end{aligned}$$

Olkoon

$$W(x) := \exp\left(\int_{-\infty}^x \frac{1}{H(t)} dt\right)$$

Seuraa kun $v_0 = F(y_0, z_0)$

$$\begin{aligned} \frac{W(F(y, z))}{W(F(y_0, z_0))} &= \frac{W(v)}{W(v_0)} = \exp\left(\int_{v_0}^v \frac{1}{H(t)} dt\right) = \exp\left(\int_{F(y_0, z_0)}^{F(y, z)} \frac{1}{H(t)} dt\right) = \\ &= \exp\left(\int_{y_0}^y \frac{1}{H(t)} dt + r \int_{z_0}^z \frac{1}{H(s)} ds\right) = \exp\left(\int_{y_0}^y \frac{1}{H(t)} dt\right) \exp\left(r \int_{z_0}^z \frac{1}{H(s)} ds\right) = \\ &= \frac{W(y)}{W(y_0)} \left(\frac{W(z)}{W(z_0)}\right)^r \\ \iff W(v) &= W(F(y, z)) = cW(y)W(z)^r \\ \text{jossa } c &= \frac{W(F(y_0, z_0))}{W(y_0)W(z_0)^r} \text{ on vakio} \end{aligned}$$

Yhtälöstä 1.0.3

$$W(F(x, v)) = cW(x)W(v)^r = W(F(u, z)) = cW(u)W(z)^r$$

Tästä sijoittamalla $W(v) = cW(y)W(z)^r$ saadaan

$$\begin{aligned} W(x)c^r W(y)^r W(z)^{r^2} &= W(u)W(z)^r = W(F(x, y))W(z)^r = W(x)W(y)^r W(z)^r \\ \iff cW(z)^r &= W(z) \quad \forall z \end{aligned}$$

joka pätee jos ja vain jos $r = c = 1$, eli

$$W(F(x, y)) = W(x)W(y)$$

Ottamalla $w(x) := \log(|W(x)|)$, saadaan

$$\begin{aligned} w(F(x, y)) &= \log(|W(F(x, y))|) = \log(|W(x)W(y)|) \\ &= \log(|W(x)|) + \log(|W(y)|) = w(x) + w(y) \quad \square \end{aligned}$$

Huomataan että $w(A|I)$ säilyttää uskottavuusjärjestyksen, se mittaa väitteiden uskottavuutta eri asteikolla.

- Vaatimus 3) On olemassa kuvaus $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jolla $w(\bar{A}|I) = f(w(A|I))$, jossa \bar{A} on väitteen A :n negaatio.

Tästä seuraa $f(f(x)) = x$. Oletetaan nyt että $\overline{B} \implies A$, josta seuraa $\overline{BA} = \overline{B}$.

$$\begin{aligned}
 w(AB|I) &= w(A) + w(B|AI) \\
 &= w(A) + f(w(\overline{B}|AI)) \\
 &= w(A) + f(w(\overline{BA}|I) - w(A|I)) \\
 &= w(A) + f(w(\overline{B}|I) - w(A|I)) \\
 &= w(A) + f(f(w(B|I)) - w(A|I)) \\
 &= x + f(f(y) - x) \\
 &= y + f(f(x) - y)
 \end{aligned}$$

jossa $x = w(A), y = w(B|I)$

ja viimeinen yhtälö seuraa vaihtamalla A ja B :n roolit.

Lemma 1.0.2. *On olemassa $c > 0$ jolla*

$$f(x) = \frac{1}{c} \log(1 - \exp(cx))$$

Tod. Olkoon

$$\begin{aligned}
 u &:= f(y) - x, & v &:= f(x) - y, \\
 x + f(u) &= y + f(v) \\
 \frac{\partial(x + f(u))}{\partial x} &= 1 - f'(u) = \frac{\partial(y + f(v))}{\partial x} = f'(v)f'(x) \\
 \frac{\partial(x + f(u))}{\partial y} &= f'(u)f'(y) = \frac{\partial(y + f(v))}{\partial x} = 1 - f'(v) \\
 \frac{\partial^2(x + f(u))}{\partial y \partial x} &= -f''(u)f'(y) = -f''(v)f'(x) \\
 \iff \frac{f''(u)}{f'(u)(1 - f'(u))} &= \frac{f''(v)}{f'(v)(1 - f'(v))} = c
 \end{aligned}$$

Ratkaistaan differentiaaliyhtälö

$$\frac{f''(x)}{f'(x)} = \frac{d}{dx} \log(|f'(x)|) = c(1 - f'(x))$$

integroimalla

$$\begin{aligned}
 \log(f'(x)) &= \log(f'(x_0)) + c \int_{x_0}^x (1 - f'(t)) dt = \\
 \log(f'(x_0)) + c((x - x_0) - (f(x) - f(x_0))) &= a + c(x - f(x)) \\
 f'(x) &= A \exp(c(x - f(x))) \\
 \exp(cf(x)) df(x) &= A \exp(cx) dx \\
 d \exp(cf(x)) &= \frac{A}{c} \exp(cx) dx \\
 \exp(cf(x)) &= \exp(cf(x_0)) + \frac{A}{c} \int_{x_0}^x \exp(ct) dt = \\
 &= \exp(cf(x_0)) + \frac{A}{c^2} (\exp(cx) - \exp(cx_0)) = k + B \exp(cx) \\
 \implies f(x) &= \frac{1}{c} \log(k + b \exp(cx))
 \end{aligned}$$

Koska

$$x + f(f(y) - x) = y + f(f(x) - y)$$

saadaan

$$\begin{aligned}
 x + \frac{1}{c} \log(k + b \exp(\log(k + b \exp(cy)) - cx)) &= \\
 x + \frac{1}{c} \log(k + b(k + b \exp(cy)) \exp(-cx)) &= \\
 x + \frac{1}{c} \log(k + bk \exp(-cx) + b^2 \exp(c(y - x))) &= \\
 = \frac{1}{c} \log(k \exp(cx) + bk + b^2 \exp(cy)) &= \frac{1}{c} \log(k \exp(cy) + bk + b^2 \exp(cx))
 \end{aligned}$$

josta seuraa että $b^2 = k$, siis

$$f(x) = \frac{1}{c} \log(b^2 + b \exp(cx))$$

Koska $f(f(x)) = x$,

$$\frac{1}{c} \log(b^2 + b^3 + b^2 \exp(cx)) = x \quad \forall x$$

seuraa $b^2 + b^3 = 0$ ja $b^2 = 1$, josta seuraa $b = -1$ ja

$$f(x) = \frac{1}{c} \log(1 - \exp(cx)) \quad \square$$

Otetaan uusi uskottavuus-skaala $Pr(A|I) = \exp(cw(\bar{A}|I))$. Seuraa lem-
masta että

$$Pr(A|I) = 1 - Pr(\bar{A}),$$

$$Pr(\bar{A}|I) \in [0, 1]$$

$$Pr(AB|I) = Pr(A|I)Pr(B|A, I) = Pr(B|I)Pr(A|B, I)$$

Kutsutaan $Pr(A|I)$ väitteen A :n todennäköisyydeksi taustatiedolla I .

Huomataan että uskottavuutta voidaan mitata eri skaalalla, säilyttä-
mällä järjestyksen, esimerkiksi vedonlyöntisuhteen (englanniksi odds ra-
tio) skaalalla:

$$\phi(A|I) = \frac{Pr(A|I)}{1 - Pr(A|I)} \in \mathbb{R}$$

Vedonlyöntisuhde ei sovi vedonlyönnin hinnaksi, se ei täytä De Finettin
additiivisuuden vaatimusta.

Todennäköisyyskaala on laskennallisesti helpompi, laskenta perustuu
tulon ja summan operaatioihin:

$$Pr(A + B|I) = Pr(A|I) + Pr(B|I) \quad \text{kun } B \subseteq \bar{A},$$

$$Pr(AB|I) = Pr(A|I)Pr(B|AI) = Pr(B|I)Pr(A|BI)$$

Huomautus 1.0.3. *Todennäköisyys on aina ehdollinen todennäköisyys, joka riip-
puu taustatiedoista. Uskottavuus-järjestys määrää todennäköisyyden yksikäsit-
teisesti. Mittapuuna voidaan käyttää hypoteettista arpajaispeliä, arpalipuilla $\{1, 2, \dots, N\}$
jossa X on ensimmäiseksi arvottu arpa.*

Olkoon väite $A_k = \{X = k\}$, ja oletamme että $(A_k|I) = (A_\ell|I) \forall k, \ell$ eli
(sinun mielestä taustatietojen perusteella) kaikki arpajaispelin tulokset ovat yh-
tä uskottavia. Tämä symmetriaa kutsutaan yhdentekevyyden periaatteeksi.
Todennäköisyysasteikolla, tästä symmetriasta additiivisuudesta ja seuraa välittö-
masti $Pr(A_k|I) = 1/N$.

Tämän hypoteettisen pelin todennäköisyyksiä voidaan sitten käyttää mittapuuna. Olkoon B väite, jolla ei tarvitse olla tekemisessä meidän hypoteettisen arpapelin kanssa, ja

$$M := \min \left\{ 1 \leq k \leq N : (B|I) \leq (A_1 + \cdots + A_k|I) \right\}$$

Seuraa

$$\frac{(M-1)}{N} < Pr(B|I) \leq \frac{M}{N}$$

Silloin kun N kasvaa, nähdään että väitteiden uskottavuuden järjestys määrää yksikäsitteisesti $Pr(B|I)$.

Huomataan kuitenkin että samalla taustatiedolla eri henkilöt saattavat asettaa väitteitä eri uskottavuusjärjestykseen, siksi todennäköisyys ei ole yksikäsitteinen. Objektivoisessa Bayes-teoriassa valitaan todennäköisyysmitta joka on vähiten informatiivinen (jolla on maksimaalinen entropia) olleessaan yhteensopiva taustatietojen kanssa.

Kirjallisuutta

- [1] Jaynes ET, *Probability theory, the logic of science*. Cambridge 2003.
- [2] Sivia DS, Skilling J: *Data Analysis, a Bayesian tutorial*. 2nd edition Oxford 2006
- [3] De Finetti B: *Theory of probability: a critical introductory treatment* Wiley 1972

Luku 2

Kolmogorovin aksioomat.

De Finetti osoitti, että ainoa johdonmukainen tapa hinnoitella epävarmoja tapahtumia on additiivisella todennäköisyydellä. Filosofisesti voidaan kiistaanalaistaa numeroituvan additiivisuuden aksiooman tarpeellisuus, näin teki De Finetti joka kehitti oman äärellisesti-additiivisen todennäköisyyden teorian. Vaikka tämä on matemaattisesti rikas ja kiinnostava teoria (esimerkiksi gradu-aiheeksi), voidaan sanoa että ei se kuulu nykyisen todennäköisyysteorian valtavirtaan. Todennäköisyyden σ -additiivisuus on luonteva oletus rajatapahtumien käsittelemisessä.

Määritelmä 2.0.1 (Algebrat ja σ -algebrat). *Olkoon Ω abstrakti joukko, ja $\mathcal{A} \subseteq 2^\Omega$ (Ω :n potenssijoukko).*

- *\mathcal{A} on algebra kun*
 1. $\Omega \in \mathcal{A}$
 2. $A \in \mathcal{A} \implies A^c = (\Omega \setminus A) \in \mathcal{A}$
 3. $A, B \in \mathcal{A} \implies (A \cup B) \in \mathcal{A}$

Määritelmästä seuraa että algebra on suljettu äärellisten leikkauksen ja yhdisteen operaatioiden suhteen.

- *Algebra \mathcal{A} on σ -algebra kun se on suljettu numeroituvan yhdisteen suhteen*

$$\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{A} \implies \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \in \mathcal{A}$$

Seuraa että σ -algebra on suljettu myös numeroituvan leikkauksen suhteen.

- Pari (Ω, \mathcal{A}) jossa \mathcal{A} on Ω :n σ -algebra kutsutaan *mitta-avaruudeksi* tai *todennäköisyysavaruudeksi*.
- σ -algebran jäseniä $A \in \mathcal{A}$ kutsutaan *mitallisiksi joukoiksi* tai *tapahtumiksi*.

Määritelmä 2.0.2. Olkoon (Ω, \mathcal{A}) todennäköisyysavaruus, jossa \mathcal{A} on Ω :n σ -algebra.

- Kuvaus $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ on (positiivinen) **mitta** kun $\mu(\emptyset) = 0$ ja μ on σ -additiivinen, eli kaikille jonoille $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{A}$ joilla $A_n \cap A_m = \emptyset \quad \forall m \neq n$,

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

- Mitta μ on **äärellinen** kun $\mu(\Omega) < +\infty$, ja on **σ -äärellinen** jos on olemassa numeroituva mitallinen peite $\{\Omega_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{A}$ jolla

$$\Omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Omega_n \quad \text{ja} \quad \mu(\Omega_n) < \infty \quad \forall n.$$

- Positiivinen mitta μ on **todennäköisyysmitta** kun $\mu(\Omega) = 1$.

Huomautus 2.0.1. Normalisoimalla, saadaan äärellisestä mitasta μ todennäköisyysmitta:

$$P(A) := \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$

Tehtävä 2.0.1. Äärellisesti additiivinen todennäköisyys voi olla melko erikoinen: Olkoon $\Omega = \mathbb{N}$,

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq \mathbb{N} : A \text{ tai } A^c \text{ on äärellinen}\}$$

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1], \quad \mu(A) = \begin{cases} 0 & \text{jos } A \text{ on äärellinen} \\ 1 & \text{jos } A^c \text{ on äärellinen} \end{cases}$$

Osoita että

- \mathcal{A} on algebra mutta ei ole σ -algebra.
- μ on äärellisesti additiivinen mutta ei σ -additiivinen todennäköisyys.

Huomautus 2.0.2. Potenssijoukko 2^Ω on σ -algebra. Onko mahdollista valita aina todennäköisyysavaruudeksi $(\Omega, 2^\Omega)$, ja määritellä $P(B)$ jokaiselle alijoukolle $B \subseteq \Omega$?

On olemassa esimerkkejä (kts. Banachin ja Tarskin paradoksi) todennäköisyyskolmikosta (Ω, \mathcal{A}, P) , jossa todennäköisyysmitan P :n laajennus σ -additiiviseksi mitaksi $P^* : 2^\Omega \rightarrow [0, 1]$ ei ole olemassa. Kun Ω on ääretön, potenssijoukko sattaa olla liian suuri.

Esimerkki 2.0.1 (Vitali). Olkoon $\Omega = \mathbb{T} = \{z = e^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi)\}$, $\mathcal{A} = \sigma(\mathbb{T}\text{:n avoimet välit})$ eli pienin σ -algebra joka sisältää kaikki ympyrän avoimet välit (z, w) (avoimet karteet).

Määrittellemme todennäköisyysmitan ensin avointen välien kautta

$$P((z, w)) = \frac{\text{pituus}((z, w))}{2\pi}$$

Caratheodoryn lauseen (2.1.1) avulla voidaan laajentaa P :n koko σ -algebraan \mathcal{A} . Osoitamme kuitenkin että P ei laajene σ -additiiviseksi mitaksi koko potenssijoukkoon 2^Ω .

Määritellään ekvivalenssirelaatio $z = e^{i\theta} \sim w = e^{i\psi}$ jos ja vain jos $(\theta - \psi) \bmod 2\pi \in \mathbb{Q} \cap [0, 2\pi]$.

Ylinumeroituvan valinnan aksiooman avulla voidaan valita jokaisesta ekvivalenssiluokasta yksi jäsen ja muodostetaan niiden sisältämä joukko E . Määritellään

$$E_q = \{ze^{iq} : z \in E\}, \quad q \in \mathbb{Q}.$$

Koska E koostuu ekvivalenssiluokkien edustajista, seuraa että $E_0 = E$, $(E_q \cap E_r) = \emptyset$ kun $q, r \in \mathbb{Q}$, $q \neq r \bmod 2\pi$, ja

$$\mathbb{T} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} E_q.$$

Huomataan että mitta P on rotaatio-invariantti avoimille väleille, eli $\text{pituus}(z, w) = \text{pituus}(yz, yw)$ kun $y, z, w \in \mathbb{T}$. Jos $P(E)$ olisi hyvin määritelty, seuraisi $P(E_q) = P(E)$, mikä johtaa riistiriitaan, koska σ -additiivisuudesta seuraa

$$1 = P(\mathbb{T}) = P\left(\bigcup_{q \in \mathbb{Q}} E_q\right) = \sum_{q \in \mathbb{Q}} P(E_q) = P(E) \times (+\infty) \quad \square$$

Linkki: Andrey Nikolaevich Kolmogorov 1903-1987.

2.1 Mitan laajennus

Määritelmä 2.1.1. Todennäköisyysavaruudessa (Ω, \mathcal{A}, P) , kun $A \in \mathcal{A}$ ja $P(A) = 1$ sanotaan, että A tapahtuu P -melkein varmasti (lyhennys: m.v.) ja A^c on P -nollajoukko.

Lisäksi kun $B \notin \mathcal{A}$ mutta $B \supseteq A$ (vastaavasti $B \subseteq A$) jossa $A \in \mathcal{A}$ ja $P(A) = 1$ (vastaavasti $P(A) = 0$), asetetaan $P(B) = 1$ (vastaavasti $P(B) = 0$).

Lemma 2.1.1 (mitan monotoninen suppeneminen). Olkoon $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ mitta-avaruus. Olkoon $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{A}$ tapahtumien jono jolla $A_n \subseteq A_{n+1} \quad \forall n$,

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}, \text{ ja merkitään } A_n \uparrow A.$$

Silloin $\mu(A_n) \uparrow \mu(A)$ kun $n \uparrow \infty$.

Vastaavasti kun $B_n \supseteq B_{n+1} \in \mathcal{A} \quad \forall n$ ja

$$B = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{A}, \text{ merkitään } B_n \downarrow B.$$

Silloin $\mu(B_n) \downarrow \mu(B)$.

Olkoon $C_{n+1} = A_{n+1} \setminus A_n \in \mathcal{A}$.

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n \text{ jossa } C_i \cap C_j = \emptyset \text{ kun } i \neq j.$$

P mitan σ -additiivisuudesta

$$P(A) = \sum_{k=1}^{\infty} P(C_k) = \lim_{n \uparrow \infty} \sum_{k=1}^n P(C_k) = \lim_{n \uparrow \infty} P\left(\bigcup_{k=1}^n C_k\right) = \lim_{n \uparrow \infty} P(A_n) \quad \square$$

Toinen väite seuraa ottamalla komplementtijoukkoja koska $P(B^c) = 1 - P(B)$.

Lemma 2.1.2. *P -nollajoukkojen numeroituva yhdiste on P -nollajoukko. P -melkein varma tapahtumien numeroituva leikkaus on P -melkein varma.*

Tehtävä 2.1.1. *Olkoon (Ω, \mathcal{A}) todennäköisyysavaruus, ja $P : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ additiivinen mitta. Osoita että P on σ -additiivinen jos ja vain jos*

$$\{B_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{A}, \quad B_n \downarrow \emptyset \implies P(B_n) \downarrow 0 \text{ kun } n \uparrow \infty$$

Määritelmä 2.1.2. *Olkoon (S, \mathcal{T}) Topologinen avaruus, jossa topologia \mathcal{T} koostuu kaikista S :n avoimista joukoista. **Borelin** σ -algebra $\mathcal{B}(S) := \sigma(\mathcal{T})$ on avointen joukkojen virittämä σ -algebra.*

$\mathcal{B}(S)$:n jäseniä kutsutaan Borelin joukoiksi. Koska yleinen Borelin joukko voi olla liian monimutkainen esitettäväksi, on hyödyllistä tietää yksinkertaisempi joukkoperhe joka virittää $\mathcal{B}(S)$:n numeroituvien yhdisteiden ja leikkausten kautta.

Tässä vaiheessa on hyvä palauttaa mieleen topologian aksioomat: \emptyset ja koko avaruus S ovat avoimia, avointen joukkojen mielivaltainen (myös ylinumeroituva) yhdiste on avoin, ja avointen joukkojen äärellinen leikkaus on avoin.

Esimerkki 2.1.1. *Olkoon $A = \mathbb{R}$, silloin*

$$\mathcal{A} := \sigma\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Todistus: koska

$$(-\infty, x] = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (-\infty, x + n^{-1}]$$

on Borelin joukko, seuraa että $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Kun $a < b$,

$$(a, b) = (-\infty, a]^c \cap \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (-\infty, b - n^{-1}] \right) \in \mathcal{A}$$

Olkoon $U \subseteq \mathbb{R}$ on avoin, jokaiselle $q \in U \cap \mathbb{Q}$ on olemassa $\varepsilon_q > 0$ jolla $(q - \varepsilon_q, q + \varepsilon_q) \subseteq U$. Koska \mathbb{Q} on tiheä \mathbb{R} :ssa, seuraa että

$$U = \bigcup_{q \in U \cap \mathbb{Q}} (q - \varepsilon_q, q + \varepsilon_q)$$

jossa yhdiste on numeroituva. Tästä seuraa että $U \in \mathcal{S}$ ja siksi $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{A}$.

Mitan määräys ja laajennukset Tämä materiaali pohjautuu Williamsin kirjaan *Probability with Martingales*. Charatheodoryn lausetta voit myös lukea suomeksi Elfving ja Tuomisen kirjasta.

Määritelmä 2.1.3. Joukkoperhettä $\mathcal{D} \subseteq 2^\Omega$ kutsutaan d -luokaksi kun

1. $\Omega \in \mathcal{D}$.
2. $A, B \in \mathcal{D}, A \subseteq B \implies B \setminus A \in \mathcal{D}$.
3. $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{D}, A_n \uparrow A \implies A \in \mathcal{D}$.

Määritelmä 2.1.4. Joukkoperhe $\mathcal{I} \subseteq 2^\Omega$ kutsutaan π -luokaksi jos on suljettu äärellisen leikkauksen suhteen:

$$I_1, I_2 \in \mathcal{I} \implies I_1 \cap I_2 \in \mathcal{I}$$

Tehtävä 2.1.2. Mielivaltainen π (vastaavasti d)-luokkien leikkaus on π (vastaavasti d)-luokka. Erityisesti

$$d(\mathcal{C}) = \bigcap_{d\text{-luokat } \mathcal{I} \supseteq \mathcal{C}} \mathcal{I}$$

on pienin \mathcal{C} :n sisältävä d -luokka, ja

$$\pi(\mathcal{C}) = \bigcap_{\pi\text{-luokat } \mathcal{J} \supseteq \mathcal{C}} \mathcal{J}$$

on pienin \mathcal{C} :n sisältävä π -luokka.

Lemma 2.1.3 (Dynkin). 1. Joukkoperhe \mathcal{C} on σ -algebra jos ja vain jos on sekä π -luokka että d -luokka.

2. Jos \mathcal{I} on π -luokka, pienin d -luokka joka sisältää \mathcal{I} on σ -algebra, siis $d(\mathcal{I}) = \sigma(\mathcal{I})$

1. Tod. Selvästi σ -algebra on sekä d - että π -luokka. Toisinpäin riittää osoittaa, että numeroituvan yhdisteen ominaisuus on voimassa. Olkoon $\{B_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{C}$ oletuksesta seuraa että

$$A_n := B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = (B_1^c \cap B_2^c \cap \dots \cap B_n^c)^c \in \mathcal{C}$$

$$A_n \uparrow A := \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \in \mathcal{C} \quad \square$$

2. Tod. Lemman ensimmäisestä osasta riittää osoittaa että $d(\mathcal{I})$ on π -luokka. Osoitetaan ensin että

$$\mathcal{D}_1 := \{B \in d(\mathcal{I}) : B \cap E \in d(\mathcal{I}) \forall E \in \mathcal{I}\}, \text{ jossa } \mathcal{I} \subseteq \mathcal{D}_1 \subseteq d(\mathcal{I})$$

on d -luokka:

$$\Omega \in \mathcal{D}_1, \text{ koska } \Omega \in d(\mathcal{I}), (\Omega \cap E) = E \in \mathcal{I} \forall E \in \mathcal{I}.$$

Jos $B_1 \subseteq B_2, B_i \in \mathcal{D}_1, i = 1, 2, (B_2 \setminus B_1) \in d(\mathcal{I}),$ ja $\forall E \in \mathcal{I}, (B_2 \setminus B_1) \cap E = (B_2 \cap E) \setminus (B_1 \cap E).$ Nyt $(B_i \cap E) \in d(\mathcal{I}), i = 1, 2$ (\mathcal{D}_1 määritelmä), ja koska $d(\mathcal{I})$ on d -luokka, seuraa että $(B_2 \setminus B_1) \cap E \in d(\mathcal{I}) \forall E \in \mathcal{I},$ siis $(B_2 \setminus B_1) \in \mathcal{D}_1.$

Samoin, kun $\{B_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{D}_1, B_n \uparrow B = \bigcup_n B_n$ ja $E \in \mathcal{I},$

$$B \cap E = \bigcup_n (B_n \cap E)$$

jossa $(B_n \cap E) \uparrow (B \cap E).$ Nyt $(B_n \cap E) \in d(\mathcal{I})$ (\mathcal{D}_1 -määritelmä) ja koska $d(\mathcal{I})$ on d -luokka seuraa että $(B \cap E) \in \mathcal{D}_1 \forall E \in \mathcal{I}.$ Siis on osoitettu että \mathcal{D}_1 on d -luokka. Koska $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{D}_1 \subseteq d(\mathcal{I}),$ seuraa että $\mathcal{D}_1 = d(\mathcal{I}).$

Olkoon nyt

$$\mathcal{D}_2 := \{B \in d(\mathcal{I}) : B \cap A \in d(\mathcal{I}) \forall A \in d(\mathcal{I})\} \subseteq d(\mathcal{I})$$

Seuraa myös että $\mathcal{D}_2 \supseteq \mathcal{I},$ koska olemme osoittaneet että jos $E \in \mathcal{I}, B \in \mathcal{D}_1 = d(\mathcal{I})$ silloin $(E \cap B) \in d(\mathcal{I}).$

Kuten edellisissä askeleissa voidaan osoittaa että \mathcal{D}_2 on d -luokka, ja siksi $\mathcal{D}_2 = d(\mathcal{I}).$ Tästä seuraa että d -luokka $d(\mathcal{I})$ on π -luokka, ja lemmän ensimmäisestä osasta seuraa että $d(\mathcal{I})$ on σ -algebra. Yleisesti $d(\mathcal{I}) \subseteq \sigma(\mathcal{I}),$ koska $d(\mathcal{I})$ on σ -algebra joka sisältää $\mathcal{I},$ seuraa että $d(\mathcal{I}) \supseteq \sigma(\mathcal{I}),$ siis $d(\mathcal{I}) = \sigma(\mathcal{I}) \square$

Lause 2.1.1 (Laajennuksen yksikäsitteisyys). *Olkoon \mathcal{I} π -luokka, $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{I}),$ P ja Q todennäköisyys mittoja todennäköisyysavaruudessa $(\Omega, \mathcal{A}),$ jolla $P(\Omega) = Q(\Omega) = 1$ ja $P(I) = Q(I) \forall I \in \mathcal{I}.$ Silloin $P(A) = Q(A) \forall A \in \mathcal{A}.$*

Tod. Olkoon

$$\mathcal{D} := \{A \in \mathcal{A} : Q(A) = P(A)\} \subseteq \mathcal{A}$$

\mathcal{D} on d -luokka: $\Omega \in \mathcal{D}$ (oletus) jos $A, B \in \mathcal{D}$, $A \subseteq B$,

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A) = Q(B) - Q(A) = Q(B \setminus A)$$

koska P, Q ovat todennäköisyyssmittoja (Ω, \mathcal{A}) -avaruudessa.

Jos $A_n \uparrow A$, $A_n \in \mathcal{D}$, $A \in \mathcal{A}$, lemmasta (2.1.1) seuraa

$$P(A) = \lim_n P(A_n) = \lim_n Q(A_n) = Q(A)$$

josta seuraa että $A \in \mathcal{D}$. Koska \mathcal{D} on d -luokka, ja oletuksesta $\mathcal{D} \supseteq \mathcal{I}$ joka on π -luokka, Dynkin lemmasta 2.1.3 seuraa että $\mathcal{D} \supseteq \sigma(\mathcal{I}) = \mathcal{A}$, eli $\mathcal{D} = \mathcal{A}$.
□.

Esimerkki 2.1.2. Kun $\Omega = \mathbb{R}$, joukkoperhe

$$\mathcal{I} := \{(-\infty, t], t \in \mathbb{R}\}$$

on π -luokka, ja $\sigma(\mathcal{I}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ (Borelin σ -algebra). Kun $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, todennäköisyysavaruudessa $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ on olemassa korkeintaan yksi todennäköisyysmitta P jolla $F(t) := P((-\infty, t]) \forall t \in \mathbb{R}$.

Riittävät ja välttämättömät ehdot todennäköisyyssmitan P :n olemassaololle ovat:

kuvaus $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ on ei-vähenevä, oikealta jatkuva ja $\lim_{t \uparrow +\infty} F(t) = 1$,
 $\lim_{t \uparrow +\infty} F(-t) = 0$.

Teoreema 2.1.1 (Caratheodoryn laajennuslause). Olkoon \mathcal{A}_0 Ω :n tapahtumien algebra, ja olkoon $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{A}_0)$.

Jos kuvaus $\mu_0 : \mathcal{A}_0 \rightarrow [0, \infty]$ on σ -additiivinen, on olemassa yksikäsitteinen σ -additiivinen mittalaajennus $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ jolla $\mu(A) = \mu_0(A) \quad \forall A \in \mathcal{A}_0$.

Tod. Laajennuksen yksikäsitteisyys on osoitettu lemmassa (2.1.1). Olemassaolon todistus on jaettu eri vaiheisiin:

Lemma 2.1.4. *Olkoon $\mathcal{A}_0 \subseteq 2^\Omega$ algebra, ja mielivaltainen kuvaus $\lambda : \mathcal{A}_0 \rightarrow [0, +\infty]$ jolla $\lambda(\emptyset) = 0$.*

Sanotaan että $L \in \mathcal{A}_0$ on λ -joukko jos se jakaa siististi \mathcal{A}_0 :n seuraavalla tavalla:

$$\lambda(A) = \lambda(A \cap L) + \lambda(A \cap L^c), \quad \forall A \in \mathcal{A}_0$$

- λ -joukkojen kokoelma \mathcal{L}_0 on algebra ja $\lambda : \mathcal{L}_0 \rightarrow [0, +\infty]$ on äärellisesti additiivinen.
- Jos $L_1, L_2, \dots, L_n \in \mathcal{L}_0, L_i \cap L_j = \emptyset$ kun $i \neq j, A \in \mathcal{A}_0$,

$$\lambda\left(\bigcup_{k=1}^n (L_k \cap A)\right) = \sum_{k=1}^n \lambda(L_k \cap A)$$

Tod. Selvästi Ω on λ -joukko ja λ -joukon komplementti on λ -joukko.

Olkoon L_1, L_2 λ -joukot. Osoitamme että $L = (L_1 \cap L_2) \in \mathcal{L}_0$

$L^c \cap L_2 = L^c \cap L_1, L^c \cap L_2^c = L_2^c$. Kun $A \in \mathcal{A}_0$, koska L_2 on λ -joukko

$$\lambda(A) = \lambda(L_2 \cap A) + \lambda(L_2^c \cap A)$$

$$\lambda(L^c \cap A) = \lambda(L_2 \cap (L^c \cap A)) + \lambda(L_2^c \cap (L^c \cap A)) = \lambda(L_2 \cap L_1^c \cap A) + \lambda(L_2^c \cap A)$$

$$\lambda(L_2 \cap A) = \lambda(L_1 \cap L_2 \cap A) + \lambda(L_1^c \cap L_2 \cap A) \text{ (koska } L_1 \text{ on } \lambda\text{-joukko)}$$

Tästä seuraa

$$\begin{aligned} \lambda(A) &= \lambda(L_1 \cap L_2 \cap A) + \lambda(L_1^c \cap L_2 \cap A) + \lambda(L_2^c \cap A) \\ &= \lambda(L \cap A) + \lambda(L^c \cap A) - \lambda(L_2^c \cap A) + \lambda(L_2^c \cap A), \end{aligned}$$

siis $L = (L_1 \cap L_2)$ on λ -joukko. Komplementin avulla näemme että myös $(L_1 \cup L_2)$ on λ -joukko, siis \mathcal{L}_0 on algebra.

Kun $L_1, L_2 \in \mathcal{L}_0, L_1 \cap L_2 = \emptyset, G \in \mathcal{A}$, koska $L_1^c \supseteq L_2$,

$$\lambda(G \cap (L_1 \cup L_2)) = \lambda(G \cap (L_1 \cup L_2) \cap L_1) + \lambda(G \cap (L_1 \cup L_2) \cap L_1^c) = \lambda(G \cap L_1) + \lambda(G \cap L_2)$$

Äärellinen additiivisuus seuraa kun $G = \Omega \square$.

Määritelmä 2.1.5. *Olkoon (Ω, \mathcal{A}) todennäköisyysavaruus.*

Kuvaus $\lambda : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ on ulkomitta (engl. outer measure) jos

1. $\lambda(\emptyset) = 0$,
2. $A_1 \subseteq A_2$, $A_i \in \mathcal{A}$, $i = 1, 2$, $\implies \lambda(A_1) \leq \lambda(A_2)$
3. λ on ali- σ -additiivinen: kun $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{A}$,

$$\lambda\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \lambda(A_n)$$

Lemma 2.1.5 (Caratheodory). Olkoon λ -ulkomitta todennäköisyysavaruudessa (Ω, \mathcal{A}) . Joukkoperhe

$$\mathcal{L} = \{L \in \mathcal{A} : L \text{ on } \lambda\text{-joukko}\}$$

on σ -algebra ja kuvaus $\lambda : \mathcal{L} \rightarrow [0, +\infty]$ on σ -additiivinen mitta.

Tod. Lemman (2.1.4) nojalla jää osoitettavaksi että kun $\{L_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{L}$, $L_i \cap L_j = \emptyset$ kun $i \neq j$, seuraa

$$L = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} L_n\right) \in \mathcal{L} \text{ ja } \lambda(L) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(L_n).$$

Koska λ on sub- σ -additiivinen, kun $A \in \mathcal{A}$

$$\lambda(A) \leq \lambda(A \cap L) + \lambda(A \cap L^c)$$

Olkoon $M_n := \bigcup_{k \leq n} L_k$. Lemmasta (2.1.4) seuraa että $M_n \in \mathcal{L}$ (koska \mathcal{L} on algebra), eli kaikille $A \in \mathcal{A}$

$$\begin{aligned} \lambda(A) &= \lambda(A \cap M_n^c) + \lambda(A \cap M_n) \geq \lambda(A \cap L^c) + \lambda(A \cap M_n) \\ &= \lambda(A \cap L^c) + \sum_{k=1}^n \lambda(A \cap L_k) \end{aligned}$$

koska λ on ali- σ -additiivinen \mathcal{A} :ssa ja äärellisesti additiivinen \mathcal{L} :ssa. Tämä pätee jokaiselle $n \in \mathbb{N}$ eli

$$\lambda(A) \geq \lambda(A \cap L^c) + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(A \cap L_k) \geq \lambda(A \cap L^c) + \lambda(A \cap L)$$

Ali-additiivisuudesta seuraa $\lambda(A) = \lambda(A \cap L) + \lambda(A \cap L^c)$, eli $L \in \mathcal{L}$. Kun sijoitetaan $A=L$, σ -additiivisuus seuraa

$$\lambda(L) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(L_k). \quad \square$$

Caratheodoryn laajennuslauseen (2.1.1) todistus:

Olkoon $\mathcal{G} = 2^\Omega$, ja määritellään

$$\lambda(G) := \inf_{\{F_n\}} \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_0(F_n) \quad \forall G \subseteq \Omega$$

jossa infimum otetaan yli tapahtumien jonot $\{F_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{A}_0$ jolla $\bigcup_n F_n \supseteq G$.

a) Kuvaus $\lambda : 2^\Omega \rightarrow [0, +\infty]$ on ulkomitta.

Tod. Selvästi $\lambda(\emptyset) = 0$ ja λ on kasvava. Olkoon jono $\{G_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq 2^\Omega$, ja $\varepsilon > 0$. Jokaiselle n :lle on olemassa jono $\{F_{n,k} : k \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{A}_0$ jolla

$$G_n \subseteq \bigcup_k F_{n,k} \quad \text{ja} \quad \lambda(G_n) \leq \sum_k \mu_0(F_{n,k}) \leq \lambda(G_n) + \varepsilon 2^{-n}.$$

Olkoon $G = \bigcup_n G_n \subseteq \bigcup_n \bigcup_k F_{n,k}$. Koska joukot $\{F_{n,k} : n, k \in \mathbb{N}\}$ peittävät G :n

$$\lambda(G) \leq \sum_n \sum_k \mu_0(F_{n,k}) \leq \sum_n \lambda(G_n) + \varepsilon$$

Koska $\varepsilon > 0$ oli mielivaltainen, sub- σ -additiivisuus seuraa.

Lemmasta (2.1.5) seuraa että λ on σ -additiivinen mitta todennäköisyys-savaruudessa (Ω, \mathcal{L}) , jossa λ -joukkojen σ -algebra on

$$\mathcal{L} = \{L \subseteq \Omega : \lambda(G) = \lambda(G \cap L) + \lambda(G \cap L^c) \forall G \subseteq \Omega\}$$

Osoitan seuraavaksi että **b)** $\mathcal{A}_0 \subseteq \mathcal{L}$ ja **c)** $\lambda(A) = \mu_0(A)$ kun $A \in \mathcal{A}_0$. Tästä seuraa että λ on μ_0 :n laajennusmitta todennäköisyys-savaruuteen (Ω, \mathcal{L}) , jossa σ -algebra $\mathcal{L} \supseteq \sigma(\mathcal{A}_0) = \mathcal{A}$.

b) Kun $A \in \mathcal{A}_0$, $\lambda(A) \leq \mu_0(A)$. Olkoon $A \subseteq \bigcup_n A_n$ jossa $A_n \in \mathcal{A}_0$. Koska \mathcal{A}_0 on algebra, voidaan olettaa että joukot $\{A_n\}$ ovat erillisiä,

muuten otetaan $A'_1 = A_1$, ja rekursiivisesti $A'_n = (A_n \setminus A'_{n-1})$. Silloin $\left(\bigcup_n A'_n\right) = \left(\bigcup_n A_n\right) \supseteq A$ ja koska \mathcal{A}_0 on algebra, $A'_n \in \mathcal{A}_0$.

$$\mu_0(A) = \mu_0\left(\bigcup_n (A \cap A_n)\right) = \sum_n \mu_0(A \cap A_n) \leq \sum_n \mu_0(A_n)$$

(tässä tulee käyttöön laajennuslauseen oletus, $\mu_0 : \mathcal{A}_0 \rightarrow [0, +\infty]$ on σ -additiivinen algebralla \mathcal{A}_0). Ottamalla infimumin oikealta puolelta seuraa että $\mu_0(A) \leq \lambda(A)$.

c) Olkoon $A \in \mathcal{A}_0$ ja $G \subseteq \Omega$.

On olemassa jono $\{A_n\} \subseteq \mathcal{A}_0$ jolla $G \subseteq \bigcup_n A_n$ ja

$$\lambda(G) + \varepsilon \geq \sum_n \mu_0(A_n).$$

Koska $A \in \mathcal{A}_0$ λ :n-määritelmästä

$$\sum_n \mu_0(A_n) = \sum_n \mu_0(A_n \cap A) + \sum_n \mu_0(A_n \cap A^c) \geq \lambda(G \cap A) + \lambda(G \cap A^c)$$

koska joukot $\{(A_n \cap A)\}_{n \in \mathbb{N}}$ peittävät $(G \cap A)$:n ja joukot $\{(A_n \cap A^c)\}_{n \in \mathbb{N}}$ peittävät $(G \cap A^c)$. Koska $\varepsilon > 0$ oli mielivaltainen,

$$\lambda(G) \geq \lambda(G \cap A) + \lambda(G \cap A^c)$$

Koska $\lambda : 2^\Omega \rightarrow [0, +\infty]$ on ulkomitta ja siksi ali-additiivinen, yhtäsuuruus seuraa, eli $A \in \mathcal{L}$ \square

Esimerkki: Yleinen todennäköisyysmitta reaaliakselilla (Kuten esimerkissä 2.1.2) olkoon $\Omega = \mathbb{R}$ ja $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Olkoon $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ kuvaus joka on

1. ei-vähenevä funktio
2. oikealta jatkuva eli $F(t+) := \lim_{u \downarrow t} F(u) = F(t) \forall t \in \mathbb{R}$.
3. $\lim_{t \uparrow +\infty} F(t) = 1, \lim_{t \downarrow -\infty} F(t) = 0$.

Seuraa että on olemassa yksikäsitteinen todennäköisyysmitta $P : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, 1]$ jolla $P((a, b]) = (F(b) - F(a))$, $a < b \in \mathbb{R}$.

Tod. Yksikäsitteisyys seuraa lemmasta (2.1.2) koska $\{(a, b] : a < b \in \mathbb{R}\}$ on π -luokka. Olkoon \mathcal{A}_0 on kokoelma joukoista joilla on esitys

$$A = \bigcup_{k=1}^m (a_k, b_k]$$

jossa $m \in \mathbb{N}$, $a_k \leq b_k \in \mathbb{R}$.

\mathcal{A}_0 on algebra joka virittää Borelin σ -algebran $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Määritellään kuvaus $P^{(0)} : \mathcal{A}_0 \rightarrow [0, 1]$

$$P^{(0)}(A) = \sum_{k=1}^m (F(b_k) - F(a_k))$$

silloin kun esityksen joukot ovat erillisiä, $(a_k, b_k] \cap (a_h, b_h] = \emptyset$ $h \neq k$.

$P^{(0)}(A)$ ei riipu A :n esityksestä, ja on additiivinen \mathcal{A}_0 algebrassa.

Kun osoitamme että $P^{(0)}$ on σ -additiivinen algebrassa \mathcal{A}_0 , Caratheodoryn laajennuslauseesta seuraa että on olemassa laajennus P koko Borelin σ -algebralle.

Tod. Vastaoletus: on olemassa ei-kasvava jono $A_n \in \mathcal{A}_0$, $A_n \supseteq A_{n+1}$, ja ϵ jolla $P^{(0)}(A_n) \geq 4\epsilon > 0 \forall n$. σ -additiivisuus on todistettu kun osoitamme

$$\bigcap_n A_n \neq \emptyset$$

Olkoon

$$A_n = \bigcup_{k=1}^{m_n} (a_k^n, b_k^n]$$

jossa $-\infty < a_k^n \leq b_k^n \leq a_{k+1}^n \leq b_{k+1}^n < +\infty$.

Olkoon $\epsilon > 0$. Oletuksesta (3) seuraa että on olemassa $z \in \mathbb{R}$ jolla $\epsilon < F(z)$ ja $(1 - F(z)) < \epsilon$.

Koska F on oikealta jatkuva, on olemassa $x_k^n \in (a_k^n, b_k^n]$ jolla

$$F(x_k^n) \leq F(a_k^n) + \epsilon 2^{-(k+n)}$$

Olkoon

$$B'_n = \left(\bigcup_{k=1}^{m_n} (x_k^n, b_k^n] \cap [-z, z] \right) \subseteq A_n, \quad B_n = \left(\bigcap_{l \leq n} B'_l \right) \subseteq A_n$$

jossa $B_n \in \mathcal{A}_0$. Seuraa

$$A_n \setminus B_n = \bigcup_{l \leq n} (A_n \setminus B'_l) \subseteq \bigcup_{l \leq n} (A_l \setminus B'_l)$$

Koska P_0 on äärellisesti additiivinen \mathcal{A}_0 :ssa,

$$\begin{aligned} P^{(0)}(A_n \setminus B_n) &\leq P^{(0)}((-z, z]^c) + \sum_{l=1}^n P^{(0)}((A_l \setminus B'_l) \cap (-z, z]) \\ &\leq P^{(0)}((-z, z]^c) + \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^{m_l} P^{(0)}((a_k^l, x_k^l]) \\ &= F(-z) + (1 - F(z)) + \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^{m_l} \{F(x_k^l) - F(a_k^l)\} \leq 2\varepsilon + \varepsilon \sum_{l=1}^n 2^{-l} \sum_{k=1}^{m_l} 2^{-k} \leq 3\varepsilon, \end{aligned}$$

jossa $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$. Tästä seuraa

$$P^{(0)}(B_n) = P^{(0)}(A_n) - P^{(0)}(A_n \setminus B_n) \geq (4 - 3)\varepsilon \quad \forall n$$

josta seuraa $B_n \neq \emptyset$. Olkoon \bar{B}_n joukon B_n sulkeuma. Koska $[x_k^n, b_k^n] \subseteq (a_k^n, b_k^n]$,

$$\forall n \quad A_n \cap [-z, z] \supseteq \bar{B}_n \supseteq B_n \neq \emptyset.$$

Huomataan myös että koska $B_n \supseteq B_{n+1}$, myös $\bar{B}_n \supseteq \bar{B}_{n+1}$. Tästä seuraa

$$\bigcap_n A_n \supseteq \bigcap_n \bar{B}_n \neq \emptyset$$

muuten kokoelma $\{(\bar{B}_n)^c = \mathbb{R} \setminus \bar{B}_n : n \in \mathbb{N}\}$ olisi kompaktin joukon $[-z, z]$ avoin peite ilman äärellistä alipeitettä:

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (\mathbb{R} \setminus \bar{B}_n) \supseteq [-z, z]$$

jossa joukot \bar{B}_n ovat sisäkkäisiä,

$$\text{ja } (\mathbb{R} \setminus \bar{B}_n) \not\supseteq [-z, z], \text{ koska } [-z, z] \supseteq \bar{B}_n \neq \emptyset \quad \square$$

Esimerkki 2.1.3. *Kun*

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , -\infty < x \leq 0 \\ x & , 0 < x \leq 1 \\ 1 & , 1 < x < \infty \end{cases}$$

P on tasainen jakauma välissä $[0, 1]$, jolla

$$P((a, b]) = F(b) - F(a) = \min(b, 1) - \max(a, 0), \quad a < b.$$

Voidaan myös määritellä Lebesguen mitan koko reaali-akselille:

$$\lambda(A) := \sum_{z \in \mathbb{Z}} P(A + z), \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

jolla $\lambda((a, b]) = (b - a)$, $a < b$. Lebesguen mitta on σ -äärellinen ja siirto-invariantti $\lambda(A + x) = \lambda(A)$, $x \in \mathbb{R}$, $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

2.2 Sovellus: Tulo σ -algebra ja tulo-todennäköisyys

Olkoon $(\Omega', \mathcal{F}', P')$ ja $(\Omega'', \mathcal{F}'', P'')$ todennäköisyyskolmikot, ja olkoon $\Omega = \Omega' \times \Omega''$.

Tuloavaruus Ω varustetaan tulo- σ -algebralla

$$\tilde{\mathcal{F}} = \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 := \sigma(A \times B : A \in \mathcal{F}', B \in \mathcal{F}'',)$$

eli mitallisten joukkojen tulojen virittämä σ -algebra.

Olkoon

$$\mathcal{A} = \left\{ C \subseteq \tilde{\Omega} : C = \bigcup_{k=1}^m (A_k \times B_k) \text{ jossa } A_k \in \mathcal{F}', B_k \in \mathcal{F}'' \right\}$$

Selvästi \mathcal{A} on algebra ja $\sigma(\mathcal{A}) = \tilde{\mathcal{F}}$.

Määritellään ensin additiivinen kuvaus $P^{(0)} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$: kun

$$C = \bigcup_{k=1}^m (A_k \times B_k)$$

jossa $(A_k \times B_k) \cap (A_l \times B_l) = \emptyset$ kun $l \neq k$,

$$P^{(0)}(C) = \sum_{k=1}^m P'(A_k)P''(B_k),$$

joka ei riipu C :n esityksestä (harjoitustehtävä). Kun osoitamme että kuvaus $P^{(0)} : \tilde{\mathcal{A}} \rightarrow [0, 1]$ on myös σ -additiivinen, Caratheodoryn laajennuslauseesta seuraa että on olemassa yksikäsitteinen todennäköisyysmitan $\tilde{P}^{(0)}$ laajennus $\tilde{P} = (P_1 \otimes P_2) : \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \rightarrow [0, 1]$ jolla $\tilde{P}^{(0)}(\tilde{A}) = \tilde{P}(\tilde{A})$ kun $\tilde{A} \in \tilde{\mathcal{A}}$. $(P_1 \otimes P_2)$ kutsutaan tulo-todennäköisyydeksi. Tämä konstruktio yleistyy suoraan äärelliseen tuloavaruuteen $\Omega_1 \times \Omega_2 \times \cdots \times \Omega_n$. Palataan asiaan Fubinin lauseen yhteydessä.

Luku 3

Satunnaismuuttujat

Olkoon $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$ kuvaus todennäköisyysavaruuksien välillä. X on mitallinen kuvaus, todennäköisyyskielellä *satunnaismuuttuja*, kun

$\forall B \in \mathcal{E}$, mitallisen joukon alkukuva on mitallinen, eli $X^{-1}(B) := \{\omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$

Tyypillisesti $(E, \mathcal{E}) = (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ jossa $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ on avointen joukkojen viritämä σ -algebra. Silloin merkitään $X \in \mathcal{F}$.

Huomautus 3.0.1. Huomataan samankaltaisuus jatkuvan funktion määrittelyn kanssa: olkoon (S_i, \mathcal{S}_i) , $i = 1, 2$ topologiset avaruudet, jossa S_i ovat avointen joukkojen kokoelmat. Sanotaan että $f : (S_1, \mathcal{S}_1) \rightarrow (S_2, \mathcal{S}_2)$ on jatkuva jos ja vain jos kaikille avoimille $U \in \mathcal{S}_2$ pätee

$$f^{-1}(U) = \{x \in S_1 : f(x) \in U\} \in \mathcal{S}_1$$

Lemma 3.0.1. Jos $X : \Omega \mapsto E$ on kuvaus, (ei välttämättä mitallinen)

$$X^{-1}\left(\bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} X^{-1}(A_i), \quad X^{-1}(A^c) = \left(X^{-1}(A)\right)^c$$

jossa $A, A_i \subseteq E$ ja \mathcal{I} on mielivaltainen indeksi joukko (ei välttämättä numeroituva).

Lemma 3.0.2. Olkoon $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$ ja $Y : (E, \mathcal{E}) \rightarrow (G, \mathcal{G})$ mitalliset kuvaukset. Silloin kuvaus $(Y \circ X)(\omega) := Y(X(\omega))$ on mitallinen (Ω, \mathcal{F}) ja (G, \mathcal{G}) välissä.

Tod. Kun $B \in \mathcal{G}$,

$$(Y \circ X)^{-1}(G) = \{\omega : Y(X(\omega)) \in G\} = \{\omega : X(\omega) \in Y^{-1}(G)\} \in \mathcal{F}$$

koska $Y^{-1}(G) \in \mathcal{E}$ ja X on $(\mathcal{F}, \mathcal{E})$ -mitallinen.

Lemma 3.0.3. *Olkoon $f : E \rightarrow H$ jatkuva funktio topologisten avaruuksien välissä, ja olkoon $\mathcal{B}(E)$ ja $\mathcal{B}(H)$ vastaavat avointen joukkojen virittämiä Borelin σ -algebrat. Silloin*

- kuvaus $f : (E, \mathcal{B}(E)) \rightarrow (H, \mathcal{B}(H))$ on mitallinen.
- $f^{-1}(\mathcal{B}(H)) = \sigma\{f^{-1}(U) : U \subseteq H \text{ avoin}\}$, joka on pienin E :n σ -algebra jonka suhteen f on Borel-mitallinen.

Tod. Kun $U \subseteq H$ avoin, seuraa että $f^{-1}(U) \subseteq E$ on avoin E :ssä. Tästä seuraa

$$\sigma\{f^{-1}(U) : U \subseteq H \text{ avoin}\} \subseteq \mathcal{B}(E)$$

Joukko perheet

$$\{U \subseteq H \text{ avoin}\} \text{ ja } \{f^{-1}(U) : U \subseteq H \text{ avoin}\}$$

ovat π -luokkia koska avointen joukkojen äärellinen leikkaus on avoin.

Kun \mathcal{D} on d -luokka H :ssa,

$$f^{-1}(\mathcal{D}) = \{f^{-1}(D) : D \in \mathcal{D}\}$$

on d -luokka E :ssa:

$$E = f^{-1}(H) \in f^{-1}(\mathcal{D}) \text{ koska } H \in \mathcal{D}.$$

Jos $A_1 = f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2)$ jossa $B_i \in \mathcal{D}$, seuraa $B_1 \subseteq B_2$ ja $B_2 \setminus B_1 \in \mathcal{D}$ josta seuraa $f^{-1}(B_2) \setminus f^{-1}(B_1) = f^{-1}(B_2 \setminus B_1) \in f^{-1}(\mathcal{D})$.

$$\text{Jos } A_n = f^{-1}(B_n) \in f^{-1}(\mathcal{D}) \text{ ja } A_n \uparrow A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n,$$

$$\text{seuraa } A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(B_n) = f^{-1}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \in f^{-1}(\mathcal{D}).$$

Koska $\mathcal{B}(H)$ on pienin d -luokka joka sisältää π -luokan $\{U \subseteq H \text{ avoin}\}$,

$f^{-1}(\mathcal{B}(H))$ on pienin d -luokka joka sisältää π -luokan

$\{f^{-1}(U) : U \subseteq H \text{ avoin}\}$, ja lemmasta 2.1.3 seuraa

$$f^{-1}(\mathcal{B}(H)) = \sigma\{f^{-1}(U) : U \subseteq H \text{ avoin}\} \square$$

Seuraus 3.0.1. Olkoon $X_i : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, $i = 1, \dots, d$ \mathbb{R} -arvoisia satunnaismuuttujia. Silloin vektori-arvoinen kuvaus $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ jolla $X(\omega) = (X_1(\omega), \dots, X_d(\omega))$ on \mathbb{R}^d -arvoinen satunnaismuuttuja.

Tod. Kun $B_i \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $i = 1, \dots, d$,

$$\{\omega : X(\omega) \in B_1 \times \dots \times B_d\} = \left(\bigcap_{i=1}^d \{\omega : X_i(\omega) \in B_i\} \right) \in \mathcal{F}$$

ja väite seuraa koska $\sigma(B_1 \times \dots \times B_d : B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ \square

Seuraus 3.0.2. Olkoon $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ satunnaisvektori ja $f : X(\Omega) \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ jatkuva kuvaus.

Seuraa että kuvaus $\omega \mapsto (f \circ X)(\omega) = f(X(\omega))$ on satunnaismuuttaja.

Erityisesti jos (X, Y) ovat s.m. $\rightarrow (X + Y)$, (XY) ovat s.m.

Jos $Y(\omega) \neq 0 \quad \forall \omega$, seuraa että (X/Y) on satunnaismuuttuja.

Lemma 3.0.4. Jos $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ on s.m. jono todennäköisyysavaruudessa (Ω, \mathcal{F}) ,

$$X^*(\omega) := \sup_{n \in \mathbb{N}} X_n(\omega)$$

on satunnaismuuttuja.

Tod. $\mathcal{D} = \{B \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}) : (X^*)^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}$ on σ -algebra. Koska jokaiselle $t \in \mathbb{R}$

$$(X^*)^{-1}((-\infty, t]) := \{\omega : X^*(\omega) \leq t\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{\omega : X_n(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F},$$

seuraa että $(-\infty, t] \in \mathcal{D}$. Koska nämät muodostuvat π -luokan, seuraa että \mathcal{D} on niiden virittämä σ -algebra, joka on $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Seuraus 3.0.3. Myös $\liminf_n X_n(\omega)$ ja $\limsup_n X_n(\omega)$ ovat satunnaismuuttujia (harjoitustehtävä).

Luku 4

Odotusarvo.

Määritelmä 4.0.1. *Satunnaismuuttuja $X(\omega) : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ on yksinkertainen jos*

$$X(\omega) = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{1}_{A_k}(\omega), \quad n \in \mathbb{N}, x_k \in \mathbb{R}, A_k \in \mathcal{F}$$

Merkittään $X \in \mathcal{YF}$. Jos $X(\omega) \geq 0 \forall \omega$, merkitään $X \in \mathcal{YF}^+$. Tällöin määritellään satunnaismuuttujan odotusarvo todennäköisyyssmitan P :n suhteen

$$E_P(X) = \sum_{k=1}^n x_k P(A_k)$$

De Finettin mukaan, odotusarvo $E_P(X)$ tulkitaan vedonlyönnin sopimuksen X :n johdonmukaiseski hinnaksi, hinta-systeemissa jossa indikaattorit $\mathbf{1}_{A_k}$ saavat hintoja $P(A_k)$, $k = 1, \dots, n$.

Harjoitustehtäväkasi tarkistetaan että yksinkertaisen satunnaismuuttujan odotusarvo ei riipu sattunnaismuuttujan esityksestä ja

$$E_P(X) = \sum_{x \in \mathbb{R}} x P(\{\omega : X(\omega) = x\})$$

Lemma 4.0.1. *Olkoon $X, Y \in \mathcal{YF}$, $\lambda \in \mathbb{R}$ (deterministinen).*

- *Kun $X(\omega) \geq 0, \forall \omega$, seuraa että $E_P(X) \geq 0$ (positiivisuus).*
- *$E_P(X + Y) = E_P(X) + E_P(Y)$ ja $E_P(\lambda X) = \lambda E_P(X)$.*

Odotusarvon määritelmä yleistetään seuraavalla tavalla:

Määritelmä 4.0.2. *Olkoon $X(\omega) \geq 0 \forall \omega$. Silloin*

$$E_P(X) := \sup\{E_P(Y) : Y \in \mathcal{YF}^+, 0 \leq Y(\omega) \leq X(\omega) \quad \forall \omega\}$$

Yleisemmin käytämme hajotelman

$$X(\omega) = X^+(\omega) - X^-(\omega), \text{ jossa } X^+(\omega) := \max(X(\omega), 0), X^-(\omega) := \max(-X(\omega), 0)$$

ovat ei-negatiivisia satunnaismuuttujat ja määritellään

$$\int_{\Omega} X(\omega)P(d\omega) := E_P(X) := E_P(X^+) - E_P(X^-)$$

kun $E_P(|X|) = E_P(X^+) + E_P(X^-) < +\infty$, sanomme että X on integroitava satunnaismuuttuja ja merkitsemme $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Kun $E_P(X^+) = \infty$ ja $E_P(X^-) < +\infty$, määritellään $E_P(X) = +\infty$, vastaavasti jos $E_P(X^+) < \infty$ ja $E_P(X^-) = \infty$, $E_P(X) := -\infty$. Kun $E_P(X^+) = E_P(X^-) = \infty$ odotusarvo $E_P(X)$ ei ole määriteltävissä.

Lemma 4.0.2. *Olkoon $X(\omega) \geq 0, \forall \omega$.*

Jos $E_P(X) = 0$, seuraa $P(\{\omega : X(\omega) > 0\}) = 0$.

Tod. Olkoon $Y_n(\omega) = n^{-1}\mathbf{1}(X(\omega) > n^{-1})$. $Y_n \in \mathcal{YF}^+$ ja $Y_n(\omega) \leq X(\omega) \forall \omega$. Odotusarvon määritelmästä seuraa

$$0 = E_P(X) \geq E_P(Y_n) = n^{-1}P(X(\omega) > n^{-1}) \geq 0$$

Seuraa että

$$P(X(\omega) > 0) = P\left(\bigcup_n \{\omega : X(\omega) > n^{-1}\}\right) \leq \sum_n P(X(\omega) > n^{-1}) = 0 \quad \square$$

Lemma 4.0.3. *Kun $X(\omega)$ ja $B \in \mathcal{F}$ jolla $P(B) = 1$, seuraa että $E_P(X\mathbf{1}_B) = E_P(X)$.*

Tod. Väite on tosi kun $X(\omega) = \mathbf{1}_A(\omega)$,

$$E_P(\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B) = E_P(\mathbf{1}_{A \cap B}) = P(A \cap B) = P(A) - P(A \cap B^c) = P(A),$$

koska $P(A \cap B^c) \leq P(B^c) = 1 - P(B) = 0$, ja lineaarisuudesta seuraa myös kaikille $X \in \mathcal{YF}$.

Olkoon $X(\omega) \geq 0$, ja $\{X_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{YF}^+$ jolla $0 \leq X_n(\omega) \leq X(\omega)$ ja $E_P(X_n) \uparrow E_P(X)$. Silloin koska $\mathbf{1}_B(\omega)X_n(\omega) \leq \mathbf{1}_B(\omega)X(\omega)$ ja odotusarvo on positiivinen,

$$E_P(\mathbf{1}_B X) \geq E_P(\mathbf{1}_B X_n) = E_P(X_n) \uparrow E_P(X) \geq E_P(\mathbf{1}_B X) \quad \square$$

Seuraus 4.0.1. Jos $P(\{\omega : X(\omega) = Y(\omega)\}) = 1$ eli $X(\omega) = Y(\omega)$ P -melkein varmasti, seuraa $E_P(X) = E_P(Y)$.

Riemann-Stieltjesin ja Lebesgue-Stieltjesin integraalit Olkoon $a < b \in \mathbb{R}$, $\Omega = (a, b]$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}((a, b])$,

$P = P_G$ jossa $G : (a, b] \rightarrow [0, 1]$ on ei-vähenevä oikealta jatkuva funktio jolla $G(a) = 0$, $G(b) = 1$.

Caratheodoryn lauseen mukaan on olemassa yksikäsitteinen todennäköisyysmitta $P_G : \mathcal{B}((a, b]) \rightarrow [0, 1]$ jolle $P_G((a, x]) = G(x) - G(a)$.

Olkoon $H : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ ei-negatiivinen mitallinen funktio. Osoitamme että

$$E_{P_G}(H) = \int_a^b H(x)G(dx) \text{ (Lebesgue-Stieltjesin integraali)}$$

jossa oikean puolen integraali on Riemann-Stieltjesin integraalin yleistys.

Määritelmä 4.0.3. Olkoon Π välin $(a, b]$ ositus äärellisellä välipistemäärällä:

$$\Pi = (a = x_0 \leq \xi_0 \leq x_1 \leq \xi_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_{N-1} \leq \xi_{N-1} \leq x_N = b), \quad n \in \mathbb{N}$$

Merkitään $\Delta(\Pi) = \max_{0 < i \leq n} (x_i - x_{i-1})$. Määritellään Riemannin Stieltjesin integraali

$$\begin{aligned} \text{(Riemann-Stieltjes)-} \int_a^b H(x)G(dx) &:= \lim_{\Delta(\Pi) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^{N(\Pi)} H(\xi_k)(G(x_{k+1}) - G(x_k)) \\ &= \lim_{\Delta(\Pi) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^{N(\Pi)} H(\xi_k)P_G((x_k, x_{k+1}]) = \lim_{\Delta(\Pi) \rightarrow 0} E_P(H^{(\Pi)}) \quad \text{jossa} \\ H^{(\Pi)}(u) &:= \sum_{k=1}^{N(\Pi)} H(\xi_k)\mathbf{1}_{(x_k, x_{k+1}]}(u) \end{aligned}$$

silloin kun raja-arvo on olemassa ja on yksikäsitteinen riippumatta ositusten jonon ja välipisteiden $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$ välinnästä.

Lause 4.0.1. Kun $H(x)$ (palottain) jatkuva, ja $G(x)$ on ei-vähenevä, Riemann-Stieltjesin integraali $\int_a^b H(x)G(dx)$ on olemassa.

Todistus Olkoon $H : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ jatkuva funktio, ja $H^{(\Pi)}$ sen yksinkertainen approksimaatio osituksen Π :n mukaan. Määritelmään mukaan

$$\int_a^b H(y)G(dy) = \lim_{\Delta(\Pi) \rightarrow 0} \int_a^b H^{(\Pi)}(y)G(dy)$$

kun raja-arvo on olemassa eikä riippuu ositusten jonosta.

Olkoon $(\Pi_n : n \in \mathbb{N})$ $[a, b]$ välin ositusten jono joilla $\Delta(\Pi_n) \rightarrow 0$. Osituksille Π_n, Π_m pätee

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^b H^{(\Pi_n)}(y)G(dy) - \int_a^b H^{(\Pi_m)}(y)G(dy) \right| \leq \int_a^b |H^{(\Pi_n)}(y) - H^{(\Pi_m)}(y)|G(dy) \\ & = \sum_{i=0}^{N-1} |H(\xi_i) - H(\eta_i)|(G(x_{i+1}) - G(x_i)) \end{aligned}$$

joillekin $x_0 < x_1 < \dots < x_N$ ja $|\xi_i - \eta_i| \leq (\Delta(\Pi_n) + \Delta(\Pi_m))$. Koska H on jatkuva kompaktissa $[a, b]$ se on siinä tasaisesti jatkuva, eli $\forall \varepsilon > 0$ on olemassa δ joilla kun $|\xi - \eta| \leq \delta \implies |H(\xi) - H(\eta)| < \varepsilon$.

Tästä seuraa että kun n, m ovat tarpeeksi suuria

$$\left| \int_a^b H^{(\Pi_n)}(y)G(dy) - \int_a^b H^{(\Pi_m)}(y)G(dy) \right| \leq \varepsilon \sum_{i=0}^{N-1} (G(x_{i+1}) - G(x_i)) = \varepsilon(G(b) - G(a))$$

Tästä seuraa että $\left(\int_a^b H^{\Pi_n}(y)G(dy) : n \in \mathbb{N} \right)$ on Cauchy jono joka suppenee.

Seuraa myös että jos (Π'_n) on toinen ositusten jono jolla $\Delta(\Pi'_n) \rightarrow 0$, kun määritellään jono (Π''_n) jolla $\Pi''_{2n} = \Pi_n$ ja $\Pi''_{2n+1} = \Pi'_n$, seuraa että myös $\int_a^b H^{(\Pi''_n)}(y)G(dy)$ suppenee kun $n \rightarrow \infty$, ja siksi raja-arvo ei riipu ositusten jonosta \square

Tehtävä 4.0.1. Osoita että Riemann-Stieltjesin integraali on olemassa kun funktio $H(y)$ on ei-vähenevä. Vihje: Osoita ensin että epäjatkuvuus pisteiden joukko

$$D := \left\{ y : H(y-) := \lim_{x \uparrow y} H(x) < H(y+) = \lim_{x \downarrow y} H(x) \right\}$$

on korkeintaan numeroituva. Käytä sitten hajotelma

$$H(x) = \left(H^c(x) - \sum_{y \leq x} \Delta H(y) \right) \quad \text{jossa} \quad \Delta H(y) := H(y+) - H(y-)$$

jossa näytät että $H_c(x)$ on ei-vähenevä ja jatkuva. Tämä yleistyy suoraan tapaukseen jossa $H(y) = (H^\oplus(y) - H^\ominus(y))$, $G(y) = (G^\oplus(y) - G^\ominus(y))$, jossa $H^\oplus, H^\ominus, G^\oplus, G^\ominus$, ovat ei-väheneviä.

Tehtävä 4.0.2. Osoite että jos $H(x)$ on (palottain) jatkuva ja $G(x)$ on derivoituva jatkuvalla derivaatalla $G'(x)$, Riemannin Stieltjes integraaleille pätee

$$\int_a^b H(x)G(dx) = \int_a^b H(x)G'(x)dx$$

Kun $H(x)$ on pelkästään Borel- mitallinen mutta ei palottain-jatkuva, on olemassa ositusten jonot ja välipisteiden valinnat joilla approksimaation raja ei ole olemassa, siinä tapauksessa Riemann-Stieltjes integrointitapa ei toimi.

Vuonna 1902 ranskalainen Henri Lebesgue keksi omassa väitöskirjassa uuden integrointitavan jossa funktio $y = H(x)$ integraalin approksimoidaan osittamaalla y -akselin x -akselin sijaan. Olkoon ensin H Borel-mitallinen funktio jolla $H(x) \geq 0 \forall x$. Määritellään kuvaus $\alpha^{(N)} : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ jossa

$$\alpha^{(N)}(y) = \begin{cases} 0 & \text{kun } 0 \leq y \leq N^{-1} \\ \left(\frac{k}{N}\right) & \text{kun } kN^{-1} < y \leq (k+1)N^{-1}, \quad k = 1, \dots, (N^2 - 1) \\ N & \text{kun } y \geq N \end{cases} \quad (4.0.1)$$

$$\text{siis } \alpha^{(N)}(y) = \sum_{k=1}^{(N^2-1)} \left(\frac{k}{N}\right) \mathbf{1}_{\left(\frac{k}{N}, \frac{k+1}{N}\right]}(y) + N \mathbf{1}_{[N, +\infty)}(y)$$

Huomataan että kuvaus $\alpha^{(N)}$ on vasemmalta jatkuva kuten indikaattori-
kuvaukset $\mathbf{1}_{(a,b]}(y)$.

Approksimoidaan alhaalta satunnaismuuttuja $H(\omega) \geq 0$ yksinkertai-
sella satunnaismuuttujalla $H^{(N)}(x) := \alpha^{(N)}(H(x))$. Koska

$$0 \leq H(x) - H^{(N)}(x) \leq 1/N \quad \text{kun } 0 \leq H(x) \leq N,$$

ja $H^{(N)}(x) \leq H^{(N+1)}(x)$, seuraa että $H^{(N)}(x) \uparrow H(x)$ kun $N \uparrow \infty$.

Koska $H^{(N)}(x)$ on yksinkertainen satunnaismuuttuja, sen P_G -odotusarvo
on summa

$$\begin{aligned} E_P(H^{(N)}) &= \sum_{y \in \mathbb{R}} y P_G(H^{(N)} = y) = \\ &= \sum_{k=0}^{(N^2-1)} \frac{k}{N} P_G\left(\left\{x : H(x) \in \left(\frac{k}{N}, \frac{k+1}{N}\right]\right\}\right) = \int_a^b H^{(N)}(x) G(dx) \end{aligned}$$

jossa viimeinen integraali on yksinkertaisen funktion Lebesgue-Stieltjes in-
tegraali eikä Riemannin integraali, koska yksinkertainen funktio $H^{(N)}(x)$
ei ole välttämättä palottain jatkuva.

Huomataan myös että kun funktio H on jatkuva välissä $(a, b]$, käänteis-
kuva

$$H^{-1}\left(\left(\frac{k}{N}, \frac{k+1}{N}\right]\right) := \left\{t : H(t) \in \left(\frac{k}{N}, \frac{k+1}{N}\right]\right\}$$

on äärellinen yhdiste väli-joukoista. Silloin y -akselin osituksen vastaa x -
akselin ositus ja sen takia siinä tapauksessa Lebesgue ja Riemann integraa-
lit yhtyvät.

Osoitamme että kun $H(x) \geq 0$ on mitallinen, raja-arvo $\lim_{N \rightarrow \infty} E_{P_G}(H^{(N)})$
on olemassa kaikille yksinkertaisten satunnaismuuttujien jonoille joilla $H^{(N)}(x) \uparrow$
 $H(x)$, ja sen arvo on

$$E_{P_G}(H) = \int_0^\infty y P_G(x : H(x) \in dy) := (\text{Lebesgue-Stieltjes})\text{-} \int_a^b H(x) G(dx),$$

approksimoivasta jonosta riippumatta.

4.1 Monotoninen konvergenssilause.

Odotusarvon määritelmän mukaan, kun $X \in \mathcal{F}$ on olemassa jono $(X_n : n \in \mathbb{N}) \subseteq \mathcal{YF}^+$ jolla $0 \leq X_n(\omega) \leq X(\omega)$ ja $E(X_n) \rightarrow E(X)$.

Osoitamme että $E(X_n) \uparrow E(X)$ kaikille satunnaismuuttujien jonoille jolla $0 \leq X_n \uparrow X$.

Lemma 4.1.1. *Olko jono $\{a_n^k : k, n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$ joka on ei-vähenevä molempien indeksien (k, n) suhteen,*

$$a_{n-1}^k \leq a_n^k \leq a_{k+1}^n \quad \forall k, n \in \mathbb{N}$$

Silloin jonon raja-arvo on olemassa riippumatta rajankäynnin järjestyksestä

$$\exists a := \lim_n (\lim_k a_n^k) = \lim_k (\lim_n a_n^k)$$

Myös jokaiselle indeksijonolle $\{n(l), k(l)\}_{l \in \mathbb{N}}$ jossa $n(l), k(l) \rightarrow \infty$

$$\lim_{l \rightarrow \infty} a_{n(l)}^{k(l)} = a$$

Tod. monotonisuudesta seuraa että $\forall k$ kun $n \uparrow \infty$

$$\begin{array}{ccc} a_n^k & \uparrow & a_\infty^k \\ |\wedge & & |\wedge \\ a_n^{k+1} & \uparrow & a_\infty^{k+1} \end{array}$$

Tästä seuraa että a_∞^k on monotoninen jono ja on olemassa $a' = \lim_{k \rightarrow \infty} a_\infty^k$.

Samoin $\forall n$ kun $k \uparrow \infty$ $a_n^k \uparrow a_n^\infty$ ja $a_n^\infty \leq a_{n+1}^\infty$, ja seuraa että on olemassa monotoninen raja $a'' = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^\infty$.

Kun $a' = a'' = +\infty$ väite on tosi.

Jos olisi $a' < a'' = +\infty$, seuraisi ristiriitä, koska silloin jokaiselle $N, \varepsilon > 0$ olisi olemassa n, k tarpeeksi suurilla joilla

$$N \leq a_n^\infty \leq a_n^k + \varepsilon \leq a_\infty^k + \varepsilon \leq a' + \varepsilon$$

Kun molemmat $a', a'' < \infty$, seuraa että $\forall \varepsilon > 0$ on olemassa \bar{n}, \bar{k} jolla

$$a'' < a_{\bar{n}}^\infty + \varepsilon, \quad a_\infty^{\bar{k}} < a_{\bar{n}}^{\bar{k}} + \varepsilon$$

Tästä seuraa

$$a' \geq a_{\infty}^{\bar{k}} \geq a_{\bar{n}}^{\bar{k}} \geq a_{\bar{n}}^{\infty} - \varepsilon \geq a'' - 2\varepsilon$$

Koska ε on mielivaltainen seuraa että $a' \geq a''$. Samoin seuraa $a'' \geq a'$.

Kun $n(l), k(l) \uparrow (+\infty)$ ovat kasvavia indeksijonoja,

$$\begin{aligned} a' &= \lim_{l \rightarrow \infty} a_{\infty}^{k(l)} \geq \lim_{l \rightarrow \infty} a_{n(l)}^{k(l)} \geq \lim_{l \rightarrow \infty} a_n^{k(l)} \quad \forall n, \\ a' &\geq \lim_{l \rightarrow \infty} a_{n(l)}^{k(l)} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} a_n^k = a'' = a' \quad \square \end{aligned}$$

Huomautus 4.1.1. Yleisesti, ilman samasuuntaisen monotonisuuden oletusta tämä ei päde. Esimerkiksi, kun $g : \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R}$ aina

$$\sup_x \inf_y g(x, y) \leq \inf_y \sup_x g(x, y),$$

mutta päinvastainen epäyhtälö ei päde ilman lisäoletuksia.

Lemma 4.1.2. Monotoninen konvergenssi lause yksinkertaisille satunnaismuuttujille

Olkoon $X, X_n \in \mathcal{Y}F^+$ jossa $0 \leq X_n(\omega) \uparrow X(\omega)$.

Silloin $E_P(X_n) \uparrow E_P(X)$.

Olkoon ensin $X(\omega) = \mathbf{1}_A(\omega)$, $A \in \mathcal{F}$. Kun $0 < \varepsilon < 1$, olkoon

$$A_n^\varepsilon = \{\omega : X_n(\omega) \geq (1 - \varepsilon)\} \subseteq A_{n+1}^\varepsilon \subseteq A$$

Seuraa $A_n^\varepsilon \uparrow A$, koska $\forall \omega \exists \bar{n}(\omega)$ jolla $\forall n > \bar{n}(\omega)$

$$X_n(\omega) > (\mathbf{1}_A(\omega) - \varepsilon), \text{ eli } (1 - \varepsilon), \text{ kun } \omega \in A.$$

σ -additiivisuudesta seuraa $P(A_n^\varepsilon) \uparrow P(A)$ ja koska $X_n(\omega) \geq (1 - \varepsilon)\mathbf{1}_{A_n^\varepsilon}(\omega)$ seuraa

$$P(A) \geq E_P(X_n) \geq (1 - \varepsilon)P(A_n^\varepsilon) \uparrow (1 - \varepsilon)P(A)$$

Koska ε oli mielivaltainen $E_P(X_n) \uparrow P(A) = E_P(X)$. Odotusarvon lineaarisuuden nojalla väite seuraa myös kun $X \in \mathcal{Y}F$.

Lemma 4.1.3. *Olkoon $X(\omega) \in \mathcal{F}^+$. Jos $\{X_n\}, \{Y_n\} \subseteq \mathcal{YF}^+$, $X_n(\omega) \uparrow X(\omega)$ ja $Y_n(\omega) \uparrow X(\omega) \forall \omega$, seuraa*

$$\lim_n E_P(X_n) = \lim_n E_P(Y_n)$$

Tod. Jono $Z_m^n(\omega) = \min\{X_n(\omega), Y_m(\omega)\}$ on ei-vähenevä molempien indeksien n, m suhteen.

Koska $Y_n(\omega) \uparrow X(\omega) \geq X_n(\omega) \uparrow X(\omega) \geq Y_n(\omega)$ seuraa että

$$Z_m^n(\omega) \uparrow X_n(\omega) \text{ kun } m \uparrow \infty, \text{ ja } Z_m^n(\omega) \uparrow Y_m(\omega) \text{ kun } n \uparrow \infty$$

Kun otamme odotusarvoa, koska Z_m^n, X_n ja Y_m ovat yksinkertaisia seuraa lemmasta (4.1.2)

$$E_P(Z_m^n) \uparrow E_P(X_n) \text{ kun } m \uparrow \infty, \text{ ja } E_P(Z_m^n) \uparrow E_P(Y_m) \text{ kun } n \uparrow \infty,$$

lemmasta (4.1.1) seuraa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_P(X_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} E_P(Z_m^n) = \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} E_P(Z_m^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} E_P(Y_n) \quad \square$$

Seuraus 4.1.1. *Kun $X_n(\omega) \uparrow X(\omega)$ jossa $\{X_n\} \subseteq \mathcal{YF}^+$ ja $X \in \mathcal{F}^+$, seuraa $E_P(X_n) \uparrow E_P(X)$.*

Tod. $E_P(Y)$:n määritelmästä seuraa että on olemassa $\{Y_n\} \subseteq \mathcal{YF}^+$ jolla $0 \leq Y_n(\omega) \leq X(\omega)$ ja $\lim_{n \rightarrow \infty} E_P(Y_n) = E_P(Y)$. Tässä väihteessä $Y_n(\omega)$ ei välttämättä kasvaa monotonisesti kaikille ω :lle.

Olkoon $X^{(n)}(\omega) := \alpha^{(n)}(X(\omega)) \uparrow X(\omega)$ (kts. 4.0.1), ja määritellään ei-vähenevä satunnaismuuttujien jono

$$Z_n(\omega) = \max\{X^{(n)}(\omega), Y_1(\omega), \dots, Y_n(\omega)\} \in \mathcal{YF}^+.$$

Koska $Z_n(\omega) \geq X^{(n)}(\omega) \uparrow X(\omega)$ seuraa että myös $Z_n(\omega) \uparrow X(\omega)$.

Koska $Y_n(\omega) \leq Z_n(\omega) \leq X(\omega)$ ja odotusarvo $E_P : \mathcal{YF}^+ \rightarrow [0, +\infty]$ on positiivinen ja lineaarinen operaattori

$$0 \leq E_P(Y_n) \leq E_P(Z_n(\omega)) \leq E_P(X(\omega)),$$

ja koska $\lim_n E_P(Y_n) = E_P(X(\omega))$ seuraa että $E_P(Z_n(\omega)) \uparrow E_P(X(\omega))$.

Lemmasta (4.1.3) seuraa nyt että

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_P(X_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} E_P(Z_n) = E_P(X) \quad \square$$

Teoreema 4.1.1. *Monotoninen konvergenssilause.*

Olkoon $X, X_n \in \mathcal{F}^+$ jossa $0 \leq X_n(\omega) \uparrow X(\omega)$ P -melkein varmasti, Silloin $E_P(X_n) \uparrow E_P(X)$.

Oletetaan ensin että jokaiselle ω : $0 \leq X_n(\omega) \uparrow X(\omega)$. Jokaiselle n :lle määritellään yksinkertaisten satunnaismuuttujien jonot $X_n^{(k)}(\omega) = \alpha^{(k)}(X_n(\omega)) \in \mathcal{YF}^+$ jolla $0 \leq X_n^{(k)}(\omega) \uparrow X(\omega)$ kun $k \uparrow \infty$. Seuraa lemmasta (4.1.2) että $E_P(X_n^{(k)}) \uparrow E_P(X_n)$ kun $k \uparrow \infty$.

Huomataan myös että kun $n \rightarrow \infty$, koska funktio $\alpha^{(k)}(x)$ on vasemmalta jatkuva ja $X_n(\omega) \uparrow X(\omega)$ seuraa että

$$X_n^{(k)}(\omega) \uparrow X^{(k)}(\omega) := \alpha^{(k)}(X(\omega)) \in \mathcal{YF}^+ .$$

Koska funktiot $\alpha^{(k)}(x)$ ovat ei-väheneviä, seuraa myös että $X_n^{(k)}(\omega) \leq X_n^{(k+1)}(\omega)$.

Koska odotusarvo $E_P : \mathcal{YF}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup [0, +\infty]$ on positiivinen operattori, jono $\{E_P(X_n^{(k)}) : n, k \in \mathbb{N}\}$ on ei-vähenevä molempien indeksien suhteen ja lemmasta (4.1.1) seuraa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_P(X_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} E_P(X_n^{(k)}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} E_P(X_n^{(k)}) = \lim_{k \rightarrow \infty} E_P(X^{(k)}) = E_P(X)$$

jossa vasemmanpuolen yhtälö seuraa väitteestä (4.1.1).

Kun $0 \leq X_n(\omega) \uparrow X(\omega)$ P -melkein varmasti, on olemassa joukko $B \in \mathcal{F}$ jolla $P(B) = 1$ ja $0 \leq X_n(\omega)\mathbf{1}_B(\omega) \uparrow X(\omega)\mathbf{1}_B(\omega) \forall \omega$. Seuraa lauseista (4.0.3), (4.1.1) että

$$E_P(X_n) = E_P(X_n\mathbf{1}_B) \uparrow E_P(X\mathbf{1}_B) = E_P(X) \quad \square$$

Seuraus 4.1.2. *Odotusarvo $E_P : L^1(\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow \mathbb{R}$ on positiivinen ja lineaarinen operattori.*

Tod. Harjoitustehtävä, approksimoivien yksinkertaisten satunnaismuuttujien avulla.

Lemma 4.1.4. *(Fatou lemma) Kun $X_n(\omega) \geq 0$ P -melkein varmasti $\forall n \in \mathbb{N}$,*

$$0 \leq E_P(\liminf_n X_n) \leq \liminf_n E_P(X_n)$$

Tämä seuraa myös kun $X_n(\omega) \geq Z(\omega) \forall n \in \mathbb{N}$ P -melkein varmasti, jossa $E_P(Z^-) < +\infty$.

Tod. Olkoon $Y_n(\omega) := \inf_{k \geq n} X_k(\omega)$, joka on ei-vähenevä $\forall \omega$, jolla $X_n(\omega) \geq Y_n(\omega) \uparrow \liminf_n X_n(\omega)$. Koska oletuksesta $Y_n(\omega) \geq 0$ P -m.v. monotonisesta konvergenssista seuraa

$$\liminf_n E_P(X_n) \geq \liminf_n E_P(Y_n) = \lim_n E_P(Y_n) = E_P(\liminf_n X_n)$$

Kun $X_n(\omega) \geq Z(\omega) \geq -(Z^-(\omega))$, jolla $E_P(Z^-) < +\infty$.

Koska $(X_n(\omega) + Z^-(\omega)) \geq 0$, ja odotusarvon lineaarisuudesta,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \liminf_n E(X_n) + E_P(Z^-) = \liminf_n E_P(X_n + Z^-) \leq E_P(\liminf_n (X_n + Z^-)) \\ &= E_P(\liminf_n X_n) + E_P(Z^-) \end{aligned}$$

ja väite seuraa kun $E_P(Z^-) < \infty$.

Lemma 4.1.5. (käänteis-Fatou lemma) Jos $X_n(\omega) \leq Z(\omega) \leq Z^+(\omega) \forall n \in \mathbb{N}$ P -melkein varmasti jossa $E_P(Z^+) < \infty$, seuraa että

$$\limsup_n E_P(X_n) \leq E_P(\limsup_n X_n) \leq E(Z)$$

Tod. Sovelletaan Fatou lemmaa jonolle $X'_n(\omega) := -X_n(\omega) \geq -Z^+(\omega)$, ja väite seuraa koska $(\limsup_n a_n) = -(\liminf_n (-a_n)) \quad \square$

Lause 4.1.1. Lebesgue'n dominoidun konvergenssi. Jos P -melkein varmasti (eli $\forall \omega \in N^c$) jossa $P(N) = 0$,

- $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)$
- $\sup_{n \in \mathbb{N}} |X_n(\omega)| \leq Z(\omega)$ jossa $E_P(Z) < \infty$,

seuraa $\lim_{n \rightarrow \infty} E_P(X_n) = E_P(X)$

Proof. Koska $|X_n| \leq Z$ ja $E_P(Z) < \infty$, Fatoun ja käänteis-Fatoun lemmat astuvat voimaan

$$E_P(X) = E_P(\liminf_n X_n) \leq \liminf_n E_P(X_n) \leq \limsup_n E_P(X_n) \leq E_P(\limsup_n X_n) = E_P(X) \quad \square$$

Esimerkki 4.1.1. Olkoon $\Omega = [0, 1]$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1])$, ja P on tasainen jakauma jolla $P((a, b]) = (b - a)$ kun $0 \leq a \leq b \leq 1$.

Olkoon $X_n(\omega) = n\mathbf{1}(\omega \leq 1/n)$.

Huomataan että kun $\omega \neq 0$, $X_n(\omega) \rightarrow 0$ kun $n \rightarrow \infty$, koska $X_n(\omega) = 0$ kun $n > 1/\omega$. Koska $P((0, 1]) = 1$, $X_n(\omega) \rightarrow 0$ P -melkein varmasti.

Toisaalta $E_P(X_n) = nn^{-1} = 1 > 0 = E_P(\lim_n X_n)$.

Lebesguen dominoidun konvergenssi lauseen hypoteesi ei päde.

$$X^*(\omega) = \sup_n X_n(\omega) = n \text{ kun } \omega \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right] \iff \omega^{-1} \in [n, n+1)$$

$$\text{eli } X^*(\omega) = \lfloor \omega^{-1} \rfloor \text{ ja } (\omega^{-1} - 1) < X^*(\omega) < \omega^{-1}$$

Tästä seuraa

$$E_P(X^*) > \left(\int_0^1 x^{-1} dx\right) - 1 = \int_0^1 d \log(x) - 1 = \log(1) - \log(0) - 1 = +\infty$$

eli X^* ei ole integroitava ja dominoidun konvergenssin lause ei pysty soveltamaan.

Satunnaismuuttujan jakauma ja odotusarvo Olkoon $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$, ja P todennäköisyysmitta abstrakti avaruudessa (Ω, \mathcal{F}) .

Määritelmä 4.1.1. Satunnaismuuttujan jakauma on todennäköisyysmitta $P_X : \mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \rightarrow [0, 1]$ jossa

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)) = P(\{\omega : X(\omega) \in B\}) \text{ kun } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$$

Lemma 4.1.6. Olkoon s.m. $X(\omega) \in \mathbb{R}^d$ kuten ennen, ja $g : (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ mitallinen kuvaus. Silloin $Y(\omega) := g(X(\omega))$ on satunnaismuuttuja ja

$$\int_{\mathbb{R}^d} g(x) P_X(dx) = E_P(g(X)) = \int_{\Omega} g(X(\omega)) P(d\omega) = E_P(Y) = \int_{\mathbb{R}} y P_Y(dy)$$

jossa $P_Y(D) = P(Y^{-1}(D)) = P_X(g^{-1}(D))$ kun $D \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Tod. kun $g(x) = \mathbf{1}_B(x)$ jossa $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ väite seuraa suoraan P_X ja P_Y mittojen määritelmästä, ja siksi väite on totta myös kun kuvaus $g(x)$ saa äärellistä monta arvoa.

Voidaan olettaa että $g(x) \geq 0$, muuten hajotetaan ensin $g(x) = g^+(x) - g^-(x)$. Silloin on olemassa yksinkertaisten kuvausten jono $g^{(N)}(x) \uparrow g(x) \forall x \in \mathbb{R}^d$ (kts. 4.0.1), jolla myös $g^{(N)}(X(\omega)) \uparrow g(X(\omega))$. Monotonisen konvergenssilauseesta seuraa että

$$\int_{\Omega} g^{(N)}(X(\omega))P(d\omega) \uparrow \int_{\Omega} g(X(\omega))P(d\omega) \text{ ja } \int_{\mathbb{R}^d} g^{(N)}(x)P_X(dx) \uparrow \int_{\mathbb{R}^d} g(x)P_X(dx),$$

$$\text{jossa } \int_{\Omega} g^{(N)}(X(\omega))P(d\omega) = \int_{\mathbb{R}^d} g^{(N)}(x)P_X(dx) \quad \square$$

Esimerkki 4.1.2. Jos satunnaismuuttujan X jakauman kertymäfunktio $F_X(x) = P(X \leq x)$ on derivoituva derivaatalla $f_X(x)$ (joka kutsutaan jakauman tiheysfunktioiksi), ja $g(x) \geq 0$ on Borel mitallinen funktio,

$$E_P(g(X)) = \int_{\Omega} g(X(\omega))P(d\omega) = \int_{\mathbb{R}} g(x)F(dx) = \int_{\mathbb{R}} g(x)f_X(x)dx$$

Erityisesti olkoon $X(\omega) \geq 0$ λ -eksponentiaalinen satunnaismuuttuja, jossa $\lambda > 0$ on parametri, ja kertymäfunktio $P(X \leq x) = F_X(x) = 1 - \exp(-\lambda x^+)$ jossa $\lambda > 0$, $x^+ = x \vee 0$. Lasketaan

$$E_P(X) = \int_0^{\infty} xF_X(dx) = \int_0^{\infty} x \frac{d}{dx} F_X(x) dx = \int_0^{\infty} x \lambda \exp(-\lambda x) dx =$$

$$\lambda \left[x \exp(-\lambda x) \right]_0^{+\infty} + \int_0^{\infty} \exp(-\lambda x) dx = 0 - 0 - \frac{1}{\lambda} \left[\exp(-\lambda x) \right]_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

4.2 Odotusarvon sovellus: mitan vaihto

Todennäköisyys avaruudessa (Ω, \mathcal{F}, P) , olkoon satunnaismuuttuja $Z(\omega) \geq 0$ P -melkein varmasti jolla $0 < E_P(Z) < \infty$,

(siis $P(\{\omega : Z(\omega) > 0\}) > 0$).

Määritellään uusi todennäköisyysmitta $Q : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$

$$Q(A) := \frac{E_P(Z \mathbf{1}_A)}{E_P(Z)} \quad \forall A \in \mathcal{F}$$

Q on todennäköisyysmitta: Selvästi on additiivinen ja $Q(\Omega) = 1$. Osoitamme että on myös σ -additiivinen: kun $A_n \uparrow \Omega$, myös $Z(\omega) \mathbf{1}_{A_n}(\omega) \uparrow Z(\omega)$ P -melkein varmasti. Monotonisen konvergenssin lauseesta (4.1.1) seuraa

$$Q(A_n)E_P(Z) = E_P(Z \mathbf{1}_{A_n}) \uparrow E_P(Z) = Q(\Omega)E_P(Z) \implies Q(A_n) \uparrow 1$$

Voidaan myös käyttää normalisoitua muuttujaa

$$\tilde{Z}(\omega) := \frac{Z(\omega)}{E_P(Z)}$$

jolla $E_P(Z) = 1$, ja kirjoittaa $Q(A) = E_P(\tilde{Z}\mathbf{1}_A)$.

Teoreema 4.2.1. $\forall A \in \mathcal{F} \ P(A) = 0 \implies Q(A) = 0$. Sanotaan että Q on absoluuttisesti jatkuva P :n suhteen, ja merkitään $Q \ll P$.

Tod. kun $P(A) = 0$, $Z(\omega)\mathbf{1}_A(\omega) = 0$ P -melkein varmasti.

Teoreema 4.2.2. Kun $X \in \mathcal{F}^+$,

$$E_Q(X) = \frac{E_P(XZ)}{E_P(Z)},$$

ja $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, Q)$ jos ja vain jos $(XZ) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Tod. Kun $X(\omega) \in \mathcal{Y}F^+$, väite seuraa suoraan määritelmästä ja odotusarvon lineaarisuudesta. Kun $X \in \mathcal{F}^+$ on olemassa jono $\{X_n\} \subseteq \mathcal{Y}F^+$ jolle $0 \leq X_n(\omega) \leq X(\omega) \ \forall \omega$. Soveltamalla Monotonisen konvergenssin lauseen kaksi kertaa Q mitan alla ja P mitan alla, seuraa että $E_Q(X_n) \uparrow E_Q(X)$ ja

$$E_Q(X_n) = \frac{E_P(X_n Z)}{E_P(Z)} \uparrow \frac{E_P(XZ)}{E_P(Z)} \quad \square$$

4.2.1 Uskottavuusosamäärä

Olemme rakentaneet mitan $Q \ll P$ satunnaismuuttujan $Z \in L^1(P)$ avulla. Tämä tulos kääntyy toisinpäin, kun $Q \ll P$ on olemassa $0 \leq Z(\omega) \in L^1(P)$ jolle mitanvaihto kaava $Q(A) = E_P(Z\mathbf{1}_A)$ on voimassa.

Teoreema 4.2.3. (Radon-Nikodym lause) Todennäköisyysavaruudessa (Ω, \mathcal{F}) olkoon P, Q todennäköisyysmittoja (yleisemmin P voisi olla σ -äärellinen mitta), joilla $Q(A) = 0$ aina kun $A \in \mathcal{F}$ ja $P(A) = 0$ (merkintä: $Q \stackrel{\mathcal{F}}{\ll} P$). Silloin on olemassa satunnaismuuttuja $0 \leq Z(\omega) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ jolle $E_P(Z) = 1$ ja

$$Q(A) = E_P(Z\mathbf{1}_A) \quad \forall A \in \mathcal{F}$$

$Z(\omega)$ on yksikäsitteinen vailla P -nolla joukkoja. Merkitään

$$Z(\omega) = \frac{dQ}{dP}(\omega),$$

joka kutsutaan uskottavuus-osamääräksi (engl. likelihood ratio) tai Radon-Nikodym derivaataksi.

R-N lause todistetaan kurssin loppupuolella martingaalien avulla.

Mitanvaihto-kaava saa muotoa

$$E_Q(X) = \int_{\Omega} X(\omega)Q(d\omega) = \int_{\Omega} X(\omega) \frac{dQ}{dP}(\omega) P(d\omega)$$

Määritelmä 4.2.1. Todennäköisyysavaruudessa (Ω, \mathcal{F}) todennäköisyysmitat P ja P' ovat singulaarisia (merkintä: $P \perp P'$), kun on olemassa $A \in \mathcal{F}$ jolla $P(A) = 0$ ja $P'(A) = 1$.

Esimerkki 4.2.1. Todennäköisyysavaruudessa (Ω, \mathcal{F}, P) olkoon $\mathcal{F} = \sigma(X)$ jossa $X(\omega)$ on standardi-gaussinen satunnaismuuttuja jolla $E(X) = 0, E(X^2) = 1$, eli

$$P(X \in dx) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx$$

Olkoon P' toinen todennäköisyysmitta jolla

$$P'(X_i \in dx) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2}\right) dx$$

Laskemme uskottavuusosamäärät

$$Z'(\omega) = \frac{dP'}{dP}(\omega) \quad \text{ja} \quad Z(\omega) = \frac{dP}{dP'}(\omega) = \frac{1}{Z'(\omega)}$$

R-N lauseesta seuraa että $Z'(\omega)$ on $\sigma(X)$ mitallinen, siksi on olemassa Borel mitallinen kuvaus $z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ jolla $Z'(\omega) = z'(X(\omega))$ (harjoitustehtävä).

Silloin, kaikille Borel mitallisille funktioille $f(x) \geq 0$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2}\right) dx &= E_{P'}(f(X)) = E_P(f(X)Z') \\ &= E_P(f(X)z'(X)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x)z'(x) \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx \end{aligned}$$

josta seuraa

$$z'(x) = \exp\left(\mu x - \frac{1}{2}\mu^2\right),$$

$$Z'(\omega) = \exp\left(\mu X(\omega) - \frac{1}{2}\mu^2\right)$$

Koska $E_P(Z') = 1$, seuraa

$$E_P(\exp(\mu X)) = \exp\left(\frac{1}{2}\mu^2\right)$$

4.2.2 Lebesguen hajotelma

Olkoon P, P' todennäköisyyssmittoja todennäköisyyssavaruudessa (Ω, \mathcal{F}) , joilla ei välttämättä $P \ll P'$ tai $P' \ll P$.

$Q := \frac{1}{2}(P + P')$ on todennäköisyyssmitta jolla selvästi $P \ll Q$ ja $P' \ll Q$ σ -algebrassa \mathcal{F} .

R-N lauseesta (4.2.3) seuraa että uskottavuusosamäärät

$$\zeta(\omega) := \frac{dP}{dQ}(\omega) \text{ ja } \zeta'(\omega) := \frac{dP'}{dQ}(\omega),$$

ovat olemassa, ei-negatiivisiä ja \mathcal{F} -mitallisia.

Huomataan että koska $\forall \omega$

$$\zeta(\omega) + \zeta'(\omega) = \frac{2dP}{d(P + P')}(\omega) + \frac{2dP'}{d(P + P')}(\omega) = 2 \frac{d(P + P')}{d(P + P')}(\omega) = 2$$

ja $\zeta(\omega) \geq 0, \zeta'(\omega) \geq 0$ seuraa

$$\zeta(\omega) \leq 2, \zeta'(\omega) \leq 2 \quad Q \text{ m.v.,} \quad \text{ja} \quad Q(\{\omega : \zeta(\omega) = 0\} \cap \{\omega : \zeta'(\omega) = 0\}) = 0.$$

Määritellään $\forall \omega \in \Omega$

$$Z(\omega) = \frac{dP}{dP'}(\omega) := \frac{\zeta(\omega)}{\zeta'(\omega)} \quad \text{ja} \quad Z'(\omega) = \frac{dP'}{dP}(\omega) := \frac{\zeta'(\omega)}{\zeta(\omega)} = \frac{1}{Z(\omega)}$$

jossa $0/0$ saa mielivaltaisen arvo, esimerkiksi 0.

Mitan-vaihto kaavan yleistys on

$$E_{P'}(X) = E_P(XZ') + E_{P'}(X\mathbf{1}(\zeta = 0))$$

kun $X \in \mathcal{F}^+$.

Todistus

$$\begin{aligned} E_{P'}(X) &= E_{P'}(X\{\mathbf{1}(\zeta > 0) + \mathbf{1}(\zeta = 0)\}) = E_Q(X\zeta'\mathbf{1}(\zeta > 0)) + E_{P'}(X\mathbf{1}(\zeta = 0)) \\ &= E_Q\left(X\frac{\zeta'}{\zeta}\mathbf{1}(\zeta > 0)\right) + E_{P'}(X\mathbf{1}(\zeta = 0)) = E_Q(XZ'\zeta) + E_{P'}(X\mathbf{1}(\zeta = 0)) \\ &= E_P(XZ') + E_{P'}(X\mathbf{1}(\zeta = 0)) = E_P(XZ') + E_{P^\perp}(X) \end{aligned}$$

jossa

$$P^\perp(d\omega) := \mathbf{1}(\zeta(\omega) = 0)P'(d\omega),$$

Siis

$$P'(d\omega) = Z'(\omega)P(d\omega) + \mathbf{1}(\zeta(\omega) = 0)P'(d\omega) = Z'(\omega)P(d\omega) + P^\perp(d\omega)$$

P ja P^\perp ovat singulaarisia, koska joukolle $A := \{\omega : \zeta(\omega) = 0\}$ pätee

$$P(A) = 0 \text{ ja } P^\perp(A) = P^\perp(\Omega)$$

Koska $P^\perp(\Omega) + E_P(Z') = P'(\zeta = 0) + E_P(Z') = 1$, P^\perp on todennäköisyysmitta jos ja vain jos $P \perp P'$, (siltoin $P^\perp = P'$). Myös $E_P(Z') \leq 1$ ja $E_P(Z') = 1$ jos ja vain jos $P' \ll P$, siltoin $P^\perp = 0$.

Esimerkki: Ehdollinen todennäköisyys Olkoon $B \in \mathcal{F}$ jolla $P(B) > 0$, ja suoritamme mitan vaihdon satunnaismuuttujalla $Z(\omega) = \mathbf{1}_B(\omega)$, saadaan

$$P(A|B) := \frac{E_P(\mathbf{1}_A \mathbf{1}_B)}{E_P(\mathbf{1}_B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad A \in \mathcal{F}$$

Kuvaus $P(\cdot | B) : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ on todennäköisyysmitta, joka kutsutaan ehdolliseksi todennäköisyydeksi ehdolla B tapahtuman.

De Finettin vedonlyöntimeklararin näkökulmasta $P(A|B)$ on A tapahtuman hinta johdonmukaisessa hinnoittelussa systeemissä P , siltoin kun tiedetään että B tapahtuu. Hajotelmasta

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B) = P(A)P(B|A)$$

on paljon hyötyä monimutkaisten tapahtumien todennäköisyyksien laskeemisessa.

Lemma 4.2.1. • Kun $(A_i : i \in \mathbb{N}) \subseteq \mathcal{F}$ on tapahtumien jono jolla $P(A_i \cap A_k) = 0, i \neq j, P(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = 1$, seuraa $P(B) = \sum_{i \in \mathbb{N}} P(B|A_i)P(A_i)$

• Kun $P(B \cap C) > 0, P(A|B \cap C) = \frac{P(A \cap B|C)}{P(B|C)}$

•

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_n | A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Tod.: harjoitustehtävä.

Satunnaismuuttujan $X \in L^1(P)$ ehdollinen odotusarvo ehdolla B tapahtuman on

$$E_P(X|B) := \frac{E_P(X\mathbf{1}_B)}{P(B)}$$

Huomaamme että tässä vaiheessa ehto $P(B) > 0$ on välttämätön. Miten ehdollisen odotusarvon käsite yleistyy P -nolla mittaisille tapahtumille B ? Vastaus esitetään kurssin loppupuolella.

Luku 5

Riippumattomuus

Määritelmä 5.0.1. • Olkoon $A, B \in \mathcal{F}$. Sanomme että A ja B ovat riippumattomia P -mitan suhteen (merkintä: $A \stackrel{P}{\perp\!\!\!\perp} B$) kun

$$P(A)P(B) = 0 \quad \text{tai} \quad P(A|B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$$

eli ehdollistaminen ei muuttaa todennäköisyyttä. Kun $P(A|B) = P(A)$ myös $P(B|A) = P(B)$ ja $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

- Yleisemmin tapahtumat A_1, A_2, \dots, A_n ovat riippumattomia P -mitan suhteen kun jokaiselle indeksien alijoukolle $I \subseteq \{1, \dots, n\}$,

$$P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i)$$

merkintä: $(A_1, A_2, \dots, A_n) \stackrel{P}{\perp\!\!\!\perp}$.

- Satunnaismuuttujat $X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)$ jossa $X_i : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}^{d_i}, \mathcal{B}(\mathbb{R}^{d_i}))$ $i = 1, \dots, n$ ovat riippumattomia P -mitan suhteen kun $\forall B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{d_i})$ $i = 1, \dots, n$

$$P(X_1 \in B_1, X_2 \in B_2, \dots, X_n \in B_n) = P(X_1 \in B_1)P(X_2 \in B_2) \dots P(X_n \in B_n)$$

merkintä: $(X_1, X_2, \dots, X_n) \stackrel{P}{\perp\!\!\!\perp}$.

- σ -algebrat $\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_n \subseteq \mathcal{F}$ ovat riippumattomia P -mitan suhteen kun $\forall A_i \in \mathcal{G}_i, i = 1, \dots, n$,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n)$$

merkintä: $(\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \dots, \mathcal{G}_n) \stackrel{P}{\perp\!\!\!\perp}$.

Huomautus 5.0.1. • Olkoon $A, B \in \mathcal{F}$, kun $A \stackrel{P}{\perp\!\!\!\perp} B$, myös $(A^c) \stackrel{P}{\perp\!\!\!\perp} B$.

- Olkoon $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ on Borel mitallinen kuvaus. Satunnaismuuttujille joilla $(X_1, \dots, X_n) \stackrel{P}{\perp\!\!\!\perp} Y$ seuraa $g(X_1, X_2, \dots, X_n) \stackrel{P}{\perp\!\!\!\perp} Y$.
- Kun $A \in \mathcal{F}$ ja $A \stackrel{P}{\perp\!\!\!\perp} A$, seuraa että $P(A) = 0$, tai $P(A) = 1$.
- Huomataan että parittaisesta riippumattomuudesta $A_i \stackrel{P}{\perp\!\!\!\perp} A_j \forall 1 \leq i \neq j \leq n$, yleisesti ei seuraa $(A_1, A_2, \dots, A_n) \stackrel{P}{\perp\!\!\!\perp}$.

Esimerkki 5.0.1. Olkoon $A, B \in \mathcal{F}$ jolla $A \stackrel{P}{\perp\!\!\!\perp} B$ ja $P(A) = P(B) = 1/2$.

Olkoon $C = (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$. Silloin $C \stackrel{P}{\perp\!\!\!\perp} A$ ja $C \stackrel{P}{\perp\!\!\!\perp} B$. Vaikka kaikki tapahtumat ovat parittain riippumattomia P :n suhteen, kolmikkona tapahtumat A, B, C eivät ole P -riippumattomia.

Todistukset: harjoitustehtävät.

Määritelmä 5.0.2. Olkoon (Ω, \mathcal{F}, P) todennäköisyysavaruus ja $\mathcal{F}_i \subset \mathcal{F}$, $i = 1, \dots, n$, $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$, ali σ -algebrat.

Sanotaan että σ -algebrat $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n$ ovat ehdollisesti P -riippumattomia ehdolla \mathcal{G} σ -algebran, jos $\forall G \in \mathcal{G}$ jolla $P(G) > 0$, $A_i \in \mathcal{F}_i : i = 1, \dots, n$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n | G) = \prod_{i=1}^n P(A_i | G)$$

Lemma 5.0.1. Satunnaismuuttujat X_1, \dots, X_n ovat P -riippumattomia jos ja vain jos kaikille ei-negatiivisille Borel mitalliselle funktioille $g_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, pätee

$$E_P(g(X_1) \dots g(X_n)) = E_P(g_1(X_1)) \dots E_P(g_n(X_n)) \quad (5.0.1)$$

Tod. Kun valitsemme $g_k(x) = \mathbf{1}_{B_k}(x)$ jossa $B_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, \Leftarrow implikaatio seuraa.

Toisinpäin, jos X_1, \dots, X_n ovat P -riippumattomia, () pätee Borelin joukkojen indikaattoreille.

Silloin kun $g_k(x) = \sum_{i=1}^{m_k} y_{i,k} \mathbf{1}_{B_{i,k}}(x)$,

$$\begin{aligned} E_P(g_1(X_1) \dots g_n(X_n)) &= E_P\left(\prod_{k=1}^n \left\{ \sum_{i=1}^{m_k} y_{i,k} \mathbf{1}_{B_{i,k}}(X_k) \right\}\right) \\ &= \sum_{i_1=1}^{m_1} \dots \sum_{i_n=1}^{m_n} y_{i_1,1} \dots y_{i_n,n} P(X_1 \in B_{i_1,1}, \dots, X_n \in B_{i_n,n}) \\ &= \sum_{i_1=1}^{m_1} \dots \sum_{i_n=1}^{m_n} y_{i_1,1} \dots y_{i_n,n} P(X_1 \in B_{i_1,1}) \dots P(X_n \in B_{i_n,n}) \\ &= \prod_{k=1}^n E_P\left(\left\{ \sum_{i=1}^{m_k} y_{i,k} \mathbf{1}_{B_{i,k}}(X_k) \right\}\right) = E_P(g_1(X_1)) \dots E_P(g_n(X_n)) \end{aligned}$$

Jos $g_k^{(N)}(x)$ ovat yksinkertaisia Borelin funktioita $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ jolla

$$0 \leq g_k^{(N)}(x) \uparrow g_k(x), \text{ kun } N \uparrow \infty, \forall k = 1, \dots, n$$

myös niiden tulot ovat Borelin funktioita $\mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^+$ jotka kasvavat monotonisesti

$$(g_1^{(N)}(x_1) \dots g_n^{(N)}(x_n)) \uparrow (g_1(x_1) \dots g_n(x_n)),$$

ja väite seuraa monotonisen konvergenssin lauseesta.

5.0.1 Lovaszin lokaali lemma

Tässä luvussa näytämme miten paljon saa aikaiseksi pelaamalla pelkäättään induktiolla ja ehdollisen todennäköisyyden määritelmällä.

Kun tapahtumat A_1, \dots, A_n ovat P -riippumattomia, myös komplementit ovat P -riippumattomia, ja

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i^c\right) = \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$$

Lovasz lokaali lemma antaa samankaltaisen alarajan silloin kun "tapahtumien riippuvuus on tarpeeksi harva".

Lemma 5.0.2. (Paul Erdős ja Lazlo Lovasz 1975) Olkoon $\{A_1, \dots, A_n\} \subseteq \mathcal{F}$ tapahtumat todennäköisyysavaruudesta (Ω, \mathcal{F}, P) , ja (V, E) graafi solmujen joukolla $V = \{1, 2, \dots, n\}$ ja särmöjen joukolla $E \subseteq V \times V$.

Oletetaan että (V, E) on suunnaton, eli $\forall i, j \in V (i, j) \in E \iff (j, i) \in E$ ja silloin merkitään $i \sim j$, ja $(i, i) \notin E$ (merkintä: $i \not\sim i$), ja on olemassa vektori $(x_1, \dots, x_n) \in [0, 1]^n$ jolla

$$P\left(A_i \mid \bigcap_{j \in S} A_j^c\right) \leq x_i \prod_{j \sim i} (1 - x_j)$$

pätee $\forall i \in V, S \subseteq V$ joilla $\{i\} \cup \{j : j \sim i\} \subseteq S^c$ ja $P\left(\bigcap_{j \in S} A_j^c\right) > 0$.

Silloin $\forall S, S' \subseteq V$ jolla $S \cap S' = \emptyset$,

$$P\left(\bigcap_{i \in S} A_i^c \mid \bigcap_{j \in S'} A_j^c\right) \geq \prod_{i \in S} (1 - x_i) > 0$$

Erityisesti kun $S' = \emptyset$, $P\left(\bigcap_{i \in S} A_i^c\right) \geq \prod_{i \in S} (1 - x_i) > 0$, josta seuraa $\bigcap_{i \in S} A_i^c \neq \emptyset$.

Todistus Käytämme induktiota kokonaiskardinaaliteetin $n = |S| + |S'|$ suhteen. Väite on triviaali kun $n = 1$, joka tarkoittaa $|S| = 1, S' = \emptyset$.

Osoitetaan ensin että väite on tosi kun $|S| = 1, S = \{i\}$ ja $i \notin S'$.

Olkoon $S' = S'' \cup S'''$ jossa $S'' = S' \cap \{j \sim i\}$, $S''' = S' \cap \{j : j \not\sim i\}$.

Silloin

$$P\left(A_i \mid \bigcap_{j \in S'} A_j^c\right) = \frac{P\left(A_i, \bigcap_{j \in S''} A_j^c \mid \bigcap_{j \in S'''} A_j^c\right)}{P\left(\bigcap_{j \in S''} A_j^c \mid \bigcap_{j \in S'''} A_j^c\right)}$$

jossa

$$P\left(A_i, \bigcap_{j \in S''} A_j^c \mid \bigcap_{j \in S'''} A_j^c\right) \leq P\left(A_i \mid \bigcap_{j \in S'''} A_j^c\right) \leq x_i \prod_{j \sim i} (1 - x_j)$$

ja koska $|S''| + |S'''| = |S'| < 1 + |S'| = n$ induktion oletuksesta seuraa

$$P\left(\bigcap_{j \in S''} A_j^c \mid \bigcap_{j \in S'''} A_j^c\right) \geq \prod_{j \in S''} (1 - x_j) \geq \prod_{j \sim i} (1 - x_j)$$

josta seuraa $P\left(A_i^c \mid \bigcap_{j \in S'} A_j^c\right) \geq (1 - x_i)$.

Kun $\{i\} \subsetneq S$ ja $S' \cap S = \emptyset$, hajotetaan $S = \{i\} \cup (S \setminus \{i\})$,

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{k \in S} A_k^c \mid \bigcap_{j \in S'} A_j^c\right) &= P\left(A_i^c \mid \bigcap_{j \in S' \cup S \setminus \{i\}} A_j^c\right) P\left(\bigcap_{k \in S \setminus \{i\}} A_k^c \mid \bigcap_{j \in S'} A_j^c\right) \\ &\geq (1 - x_i) \prod_{k \in S \setminus \{i\}} (1 - x_k) = \prod_{i \in S} (1 - x_i) > 0 \quad \square \end{aligned}$$

jossa induktio-oletus astuu voimaan koska $|S \setminus \{i\}| + |S'| = |S| + |S'| - 1$.

□

Seuraus 5.0.1. Oletetaan että (V, E) on riippuvuuden graafi, jossa

$\forall i \in V, S \subseteq V$ jolla $S^c \subseteq \{i\} \cup \{j : j \sim i\}$,

tapahtuma A_i on P -riippumaton tapahtumasta $\left(\bigcap_{j \in S} A_j\right)$.

Toisin sanoen A_i on P -riippumaton σ -algebrasta $\sigma(A_j : j \neq i \text{ ja } j \not\sim i)$.

1. Kun on olemassa lukuja $x_i \in [0, 1), i = 1, \dots, n$ jolla

$$P(A_i) \leq x_i \prod_{j \sim i} (1 - x_j),$$

seuraa $P\left(\bigcap_{i \in S} A_i^c\right) \geq \prod_{i \in S} (1 - x_i), \quad \forall S \subseteq V, \text{ erityisesti } \left(\bigcap_{i \in S} A_i^c\right) \neq \emptyset$.

2. Erityisesti, kun $\#\{j : j \sim i\} \leq d$, ja $P(A_i) \leq \exp(-1)/(d+1), \forall i \in V$, seuraa

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i^c\right) \geq \left(1 - \frac{1}{d+1}\right)^n > 0$$

Todistus

1. Yleisen Lovaszin lemmän oletus seuraa riippumattomuuden nojalla.

2. Tarvitaan x jolla $p \leq x(1-x)^d$. Kun $x = (1+d)^{-1}$, ensimmäisen osan oletus seuraa koska

$$P(A_i) \leq \frac{\exp(-1)}{d+1} \leq \frac{1}{d+1} \left(1 - \frac{1}{d+1}\right)^d = x(1-x)^d \quad \square$$

jossa $\exp(-1) \leq \left(1 - (d+1)^{-1}\right)^d \quad \square$

Esimerkki 5.0.2. *Dataverkossa on n solmuparia, ja jokaiselle solmuparin p välissä on joukko J_p mahdollisia reittejä.*

Oletetaan että $|J_p| = m$ jokaiselle parille p , ja kun $p \neq p'$ jokaiselle reitille $r \in J_p$ pätee

$$|\{r' \in J_{p'} \text{ jolla reitit } r \text{ ja } r' \text{ leikkaavat toisiinsa}\}| \leq k$$

Kun k ei ole liian suuri, on mahdollista yhdistää jokaista solmujen paria, reitityksellä jossa kaikki reitit eivät leikkaa toisiinsa.

Tod. *Jokaiselle solmujen parille p valitaan riippumattomasti tasaisesta jakaumasta satunnaisreitti R_p joukosta J_p . Määritellään jokaiselle solmujen parien parille $p \neq p'$ tapahtuma*

$$A_{p,p'} = \{ \text{satunnaisreitit } R_p \text{ ja } R_{p'} \text{ leikkaavat toisiinsa} \}.$$

Selvästi $P(A_{p,p'}) \leq k/m$. Huomataan myös että

$$A_{p,p'} \perp\!\!\!\perp \sigma(A_{q,q'} : q \neq p, p', \text{ ja } q' \neq p, p')$$

Seuraa että on $d = 2(n-1)$ tapahtumaa, $A_{p,r}$ jolla $r \neq p$ ja $A_{r',p'}$ jolla $r' \neq p'$, jotka ovat P -riippuvaisia tapahtumasta $A_{p,p'}$. Siis tapahtuman $A_{p,p'}$ aste (naapureiden määrä) tapahtumien riippuvuusgrafissa on $d = 2(n-1)$.

Silloin kun

$$P(A_{p,p'}) \leq k/m \leq \frac{\exp(-1)}{d+1} \leq (d+1)^{-1} \left(1 - (d+1)^{-1}\right)^d$$

eli $k \leq m \exp(-1)/(2n-1)$, Lovaszin lemma astuu voimaan ja

$$P\left(\bigcap_{p,p'} A_{p,p'}^c\right) > \left(1 - (d+1)^{-1}\right)^{n(n-1)/2} > 0,$$

josta seuraa $\left(\bigcap_{p,p'} A_{p,p'}^c\right) \neq \emptyset$ \square

5.1 Borel Cantelli lemmat

Lemma 5.1.1. *(Borel-Cantelli I).*

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty \implies P(\limsup_n A_n) = P(\{\omega : \omega \in A_n \text{ äärettömään monille } n\text{:lle}\}) = 0$$

Tod.

$$\limsup_n A_n = \bigcap_n \bigcup_{k>n} A_k \subseteq \bigcup_{k>m} A_k \quad \forall m$$

Sarjan suppenemisesta seuraa

$$P(\limsup_n A_n) \leq \sum_{k \geq m} P(A_k) \rightarrow 0 \text{ kun } m \rightarrow \infty \quad \square$$

Lemma 5.1.2. *Yleistetty Borel-Cantelli I (Barndorff-Nielsen, 1961)*

Kun $\liminf_n P(A_n) = 0$ ja $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n \cap A_{n+1}^c) < \infty$, seuraa $P(\limsup_n A_n) = 0$.

Tod. Huomataan että

$$\limsup_n (A_n \cap A_{n+1}^c) = (\limsup_n A_n) \cap (\limsup_n A_n^c)$$

koska jos $(A_n \cap A_{n+1}^c)$ tapahtuu äärettömästi usein, myös A_n ja A_n^c tapahtuvat äärettömästi usein. Toisaalta, jos molemmat A_n ja A_n^c tapahtuvat äärettömään usein, myös $(A_n \cap A_{n+1}^c)$ tapahtuu äärettömästi usein muuten jompikumpi $(\liminf_n A_n) = (\limsup_n A_n^c)^c$ tai $(\liminf_n A_n^c) = (\limsup_n A_n)^c$ tapahtuisi.

$$P(\limsup_n A_n) = P(\limsup_n (A_n \cap A_{n+1}^c)) + P((\limsup_n A_n) \cap (\limsup_n A_n^c)^c) = 0$$

koska oletuksesta ja ensimmäisen Borel Cantelli lemmasta seuraa

$$P(\limsup_n (A_n \cap A_{n+1}^c)) = 0,$$

ja $P((\limsup_n A_n^c)^c) = P(\liminf_n A_n) \leq \liminf_n P(A_n) = 0 \quad \square$.

Lause 5.1.1. (Kolmogorovin 0-1 laki) Todennäköisyysavaruudessa (Ω, \mathcal{F}, P) olkoon $\{\mathcal{F}_k : k \in \mathbb{N}\}$ σ -algebroiden jono jossa $\mathcal{F}_k \subseteq \mathcal{F}$. Olkoon

$$\mathcal{F}^\infty = \bigvee_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_k, \quad \mathcal{T}_n = \bigvee_{k \geq n} \mathcal{F}_k, \quad \mathcal{T} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{T}_n$$

\mathcal{T} kutsutaan häntä (tail) σ -algebraksi.

Silloin kun σ -algebrat $\{\mathcal{F}_k : k \in \mathbb{N}\}$ ovat P -riippumattomia, eli

$$P(A_{k_1} \cap A_{k_2} \cap \cdots \cap A_{k_n}) = \prod_{i=1}^n P(A_{k_i}) \quad \forall n, k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N}, A_{k_i} \in \mathcal{F}_i .$$

seuraa että \mathcal{T} on P -triviaali, eli $P(A) \in \{0, 1\}$ kun $A \in \mathcal{T}$.

Tod. Olkoon $A \in \mathcal{T}$. Silloin $A \in \mathcal{T}_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$, ja tästä seuraa σ -algebroiden riippumattomuus

$$A \perp\!\!\!\perp^P \left(\bigvee_{k=1}^n \mathcal{F}_k \right) \quad \forall n \implies A \perp\!\!\!\perp^P \left(\bigvee_{k=1}^{\infty} \mathcal{F}_k \right) = \mathcal{F}_{\infty}$$

joka tarkoittaa $\mathcal{T} \perp\!\!\!\perp^P \mathcal{F}_{\infty} \supseteq \mathcal{T}$. Koska $A \in \mathcal{T}$ on P -riippumaton itsestään,

$$P(A) = P(A \cap A) = P(A)P(A).$$

Ainoat ratkaisut ovat $P(A) = 0, 1 \quad \square$

Lemma 5.1.3. (Borel-Cantelli II)

Olkoon $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{F}$ P -riippumattomien tapahtumien jono, eli

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_n}) = \prod_{k=1}^n P(A_{i_k}) \quad \forall n, i_1, \dots, i_n \in \mathbb{N} .$$

Silloin

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty \iff P(\limsup_n A_n) = P(\{\omega : \omega \in A_n \text{ äärettömään usein} \}) = 1$$

Tod. Olkoon $\mathcal{F}_n = \sigma(A_n) = \{A_n, A_n^c, \Omega, \emptyset\}$, $n \in \mathbb{N}$. Koska σ -algebrat $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ovat P -riippumattomia, ja tapahtuma $(\limsup_n A_n) \in \mathcal{T}$, se on P -triviaali, eli $P(\limsup_n A_n) \in \{0, 1\}$.

Kun $P(\limsup_n A_n) = 1$, ensimmäisen Borel Cantelli lemmasta seuraa $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$.

Kun $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$,

$$P((\limsup_n A_n)^c) = P(\liminf_n A_n^c) = P\left(\bigcup_n \bigcap_{k \geq n} A_k^c\right),$$

σ -additiivisuudesta ja epäyhtälöstä $(1 - x) \leq \exp(-x)$ seuraa

$$P\left(\bigcap_{k \geq n} A_k^c\right) = \lim_{N \uparrow \infty} P\left(\bigcap_{N \geq k \geq n} A_k^c\right) = \lim_{N \uparrow \infty} \prod_{N \geq k \geq n} (1 - P(A_k)) =$$

$$\lim_{N \uparrow \infty} \exp\left(-\sum_{k=n}^N P(A_k)\right) = \exp\left(-\sum_{k=n}^{\infty} P(A_k)\right) = \exp(-\infty) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

josta seuraa $P((\limsup_n A_n)^c) = 0 \quad \square$

Huomautus 5.1.1. Toinen Borel Cantelli lemma ei päde suoraan ilman riippumattomuuden ehtoa. Esimerkiksi kun $A \in \mathcal{F}$ jolla $0 < P(A) < 1$ ja asetamme $A_n = A \quad \forall n \in \mathbb{N}$, $\sum_n P(A_n) = \infty$ mutta $P(\limsup_n A_n) = P(A) \notin \{0, 1\}$. Riippumattomuuden ehtoa voidaan kuitenkin heikentää.

Lemma 5.1.4. (Yleistetty Borel-Cantelli II)

Kun $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$ ja

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n P(A_i \cap A_j)}{\left(\sum_{i=1}^n P(A_i)\right)^2} = c < \infty$$

seuraa $P(\limsup A_n) \geq 1/c$.

Tod. Todistetaan myöhemmin Cauchy-Schwartzin epäyhtälön avulla.

Luku 6

Stokastinen konvergenssi

Määritelmä 6.0.1. Olkoon $X(\omega), X_n(\omega), n \in \mathbb{N}$ satunnaismuuttujat. Sanoetaan että jono (X_n) suppenee stokastisesti (tai todennäköisyyden mielessä) kohti X :aan, (merkintä: $X_n \xrightarrow{P} X$) kun jokaiselle $\varepsilon > 0$

$$P(\{\omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| \geq \varepsilon\}) \rightarrow 0, \quad \text{kun } n \rightarrow \infty.$$

Stokastinen konvergenssi on heikompi kuin melkein varma konvergenssi:

Lause 6.0.1. 1. Kun $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)$ P -melkein varmasti, myös $X_n \xrightarrow{P} X$.

2. Jos $X_n \xrightarrow{P} X$ (stokastisesti), on olemassa deterministinen alijono $\{n(k) : k \in \mathbb{N}\}$ jolla

$$\lim_{k \rightarrow \infty} X_{n(k)}(\omega) = X(\omega) \text{ } P\text{-melkein varmasti,}$$

3. $X_n \xrightarrow{P} X$ jos ja vain jos kaikille alijonoille $\{n(k)\}$ on olemassa alijonon (deterministinen) alijono $\{n(k_l)\}$ jolla $X_{n(k_l)}(\omega) \rightarrow X(\omega)$ P -melkein varmasti kun $l \rightarrow \infty$.

Tod. Voidaan olettaa että $X(\omega) = 0$, muuten otetaan $X_n(\omega) = X_n(\omega) - X(\omega)$.

1. $X_n(\omega) \rightarrow 0$ P -m.v. jos ja vain jos

$$P\left(\bigcap_n \bigcup_m \bigcap_{k \geq m} \{\omega : |X_k(\omega)| < n^{-1}\}\right) = 1$$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, \quad P\left(\liminf_k \{\omega : |X_k(\omega)| < n^{-1}\}\right) = 1$$

Fatou lemmasta $\forall n$

$$1 = P\left(\liminf_k \{\omega : |X_k(\omega)| < n^{-1}\}\right) \leq \liminf_k P\left(\{\omega : |X_k(\omega)| < n^{-1}\}\right) = 1$$

$$\iff 0 = \limsup_k P\left(\{\omega : |X_k(\omega)| > n^{-1}\}\right) = \lim_k P\left(\{\omega : |X_k(\omega)| > n^{-1}\}\right)$$

2. Stokastisesta konvergenssista seuraa että on olemassa jono k_n jolla

$$P\left(\{\omega : |X_l(\omega)| > n^{-1}\}\right) < 2^{-n}, \quad \forall l \geq k_n$$

Koska

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\left(\{\omega : |X_{k_n}(\omega)| > n^{-1}\}\right) < \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1 < \infty$$

Borel-Cantelli lemmasta (5.1.1) seuraa

$$0 = P\left(\limsup_n \{\omega : |X_{k_n}(\omega)| > n^{-1}\}\right)$$

$$\geq P\left(\limsup_n \{\omega : |X_{k_n}(\omega)| > N^{-1}\}\right) = 0 \quad \forall N \in \mathbb{N},$$

josta seuraa

$$1 = P\left(\bigcap_N \liminf_n \{\omega : |X_{k_n}(\omega)| \leq N^{-1}\}\right)$$

$$\iff X_{k_n}(\omega) \rightarrow 0 \quad P\text{-melkein varmasti.}$$

3. Olkoon $X(\omega) = 0$ ja tehdään vastaoletus että X_n ei suppenisi stokastisesti kohti nollaan: on olemassa $\varepsilon > 0$ ja jono $n(k) \uparrow \infty$ kun $k \uparrow \infty$ jolla

$$P(|X_{n(k)}| > \varepsilon) \geq \varepsilon > 0 \quad \forall k$$

Tästä tulee ristiriita koska oletetusti olisi olemassa alijono $n(k_l)$ jolla $X_{n(k_l)}(\omega) \rightarrow 0$ P -melkein varmasti ja siksi myös stokastisesti, siksi saadaan ristiriita

$$0 < \varepsilon \leq P(|X_{n(k_l)}| > \varepsilon) \rightarrow 0 \quad \text{kun } l \rightarrow \infty \quad \square$$

Huomautus: Kun X_n suppenee stokastisesti, jokaiselle alijonolle (n_k) löytyy alijonon alijono (n_{k_l}) ja joukko $N \subseteq \Omega$ jolla $P(N) = 0$, jolla $X_{n_{k_l}}(\omega) \rightarrow 0 \forall \omega \in N^c$. Yleisesti nolla-mittainen joukko N riippuu alijonosta (n_k) . Koska alijonojen joukko ei ole numeroituva, se ei tarkoita että olisi olemassa N jolla $P(N) = 0$, ja kaikille alijonolle (n_k) löytyisi alijonon alijono (n_{k_l}) jolla $X_{n_{k_l}}(\omega) \rightarrow 0 \forall \omega \in N^c$. Silloin $X_n(\omega)$ suppenisi P -melkein varmasti.

Esimerkki 6.0.1. Näytämme että stokastinen konvergenssi on aidosti heikompi kuin melkein varmaa konvergenssia: Olkoon $\Omega = (0, 1]$ varustettu Borel σ -algebralla $\mathcal{F} = \mathcal{B}((0, 1])$ tasaisella todennäköisyydellä, siis $P((0, t]) = t$, kun $t \in (0, 1]$.

Määritellään satunnaismuuttujien jono

$$X_{n,k}(\omega) = \mathbf{1}_{(k2^{-n}, (k+1)2^{-n})}(\omega) \quad k = 0, 1, \dots, (2^n - 1)$$

jossa indeksit voidaan järjestää seuraavaksi: $(n, k) \geq (m, h)$ jos ja vain jos $n > m$ tai $n = m$ ja $k \geq h$.

Seuraa että $\forall \omega \in (0, 1]$ kun $(n, k) \rightarrow \infty$ järjestyksen mukaisesti,

$$\liminf_{n,k \rightarrow \infty} X_{n,k}(\omega) = 0 \neq \limsup_{n,k \rightarrow \infty} X_{n,k}(\omega) = 1, \text{ ja}$$

$$P(\{\omega : X_{n,k} > 1/2\}) = P((k2^{-n}, (k+1)2^{-n}]) = 2^{-n} \rightarrow 0 \text{ kun } n \rightarrow \infty.$$

Tehtävä 6.0.1. Etsi jonolle $(X_{n,k}(\omega), n \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq 2^n)$ alijono $(X_{n(l),k(l)} : l \in \mathbb{N})$ jolla $X_{n(l),k(l)}(\omega) \rightarrow 0$ P -m.v. kun $l \rightarrow \infty$.

Teoreema 6.0.1. Stokastisen konvergenssin topologia on metrinen.

$$\begin{aligned} X_n \xrightarrow{P} X &\iff d(X, X_n) \rightarrow 0, \text{ jossa} \\ d(X, Y) &= d(X - Y, 0) = E_P \left(\frac{|X - Y|}{1 + |X - Y|} \right) \text{ tai} \\ d(X, Y) &= d(X - Y, 0) = E_P(1 \wedge |X - Y|) \end{aligned}$$

Olkoon $X_n \xrightarrow{P} X = 0$. $\forall \varepsilon > 0$,

$$\frac{|X_n|}{(1 + |X_n|)} \leq \frac{|X_n|}{(1 + |X_n|)} \mathbf{1}(|X_n| > \varepsilon) + \varepsilon \mathbf{1}(|X_n| \leq \varepsilon) \leq \mathbf{1}(|X_n| > \varepsilon) + \varepsilon,$$

$$d(X_n, 0) \leq P(|X_n| > \varepsilon) + \varepsilon < 2\varepsilon$$

kun n on tarpeeksi suuri.

Toisinpäin, koska kuvaus $f(x) = x/(1+x)$ on aidosti kasvava ($f'(x) = (1+x)^{-2}$), $\forall \varepsilon > 0$,

$$\frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \mathbf{1}(|X_n| > \varepsilon) \leq \frac{|X_n|}{1 + |X_n|} \mathbf{1}(|X_n| > \varepsilon) \leq \frac{|X_n|}{1 + |X_n|}$$

$$\frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} P(|X_n| > \varepsilon) \leq d(|X_n|, 0) \rightarrow 0 \text{ kun } n \rightarrow \infty$$

Näytämme että $d(X, Y)$ on etäisyys, se täyttää kolmion epäyhtälön:

$$\frac{|X - Y|}{1 + |X - Y|} \leq \frac{|X - Z| + |Z - Y|}{1 + |X - Z| + |Z - Y|} \leq \frac{|X - Z|}{1 + |X - Z|} + \frac{|Z - Y|}{1 + |Z - Y|}$$

kun otetaan odotusarvo seuraa $d(X, Y) \leq d(X, Z) + d(Z, Y)$ \square

6.1 Funktionaalianalyysin peruskäsitteiden pika-sanasto

1. Topologinen avaruus: (E, \mathcal{T}) jossa topologia $\mathcal{T} \subseteq 2^E$ on kaikkien avointen joukkojen kokoelma. Topologia on suljettu äärellisten leikkausten suhteen ja mielivaltaisten yhdistelmien suhteen. Avoimen joukon komplementti sanotaan suljetuksi.

Olkoon $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq E$. Sanotaan että $x_n \rightarrow x$ topologiassa \mathcal{T} jos $\forall U \in \mathcal{T}$ jolle $x \in U$, $\exists n_U$ jolle $x_n \in U \forall n \geq n_U$.

2. $d : E \times E \rightarrow [0, +\infty]$ on metriikka jos

- $d(e, e') = 0$ jos ja vain jos $e = e'$
- $d(e, e') = d(e', e)$ (symmetrisyys)
- $d(e, e'') \leq d(e, e') + d(e', e'')$ (kolmion epäyhtälö)

6.1. FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKÄSITTEIDEN PIKA-SANASTO 73

3. Topologinen avaruus (E, \mathcal{T}) on metrinen jos on olemassa metriikka (etäisyys) $d : E \times E \rightarrow [0, +\infty]$, jonka suhteen avoimet pallot generoivat topologian \mathcal{T} :n, eli:

$$B(e, r) = \{e' : d(e, e') < r\} \in \mathcal{T} \quad \forall e \in E, r > 0$$

ja kaikille $x \in U, x \in E, U \in \mathcal{T}$ on olemassa $r > 0$ jolle $x \in B(e, r) \subseteq U$.

Metrisessä avaruudessa, $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq E$ on *Cauchy jono* kun $\forall \varepsilon > 0$ on olemassa n_ε jolle $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ kun $n, m \geq n_\varepsilon$.

Sanotaan että metrinen avaruus (E, d) on *täydellinen* jos kaikille Cauchy jonoille $\{x_n\}$ on olemassa rajaarvo $x \in E$.

4. Olkoon E reaali-vektoriavaruus, eli kun $\lambda \in \mathbb{R}, x, y \in E$, myös $\lambda x \in E, (x + y) \in E$.

Kuvaus $\|\cdot\| : E \rightarrow [0, +\infty)$ on *normi* kun

$$\text{i) } \|x\| = 0 \in \mathbb{R} \iff x = \mathbf{0} \in E \quad \text{ii) } \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$$

$$\text{iii) } \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Kaikki normatut vektoriavaruudet ovat metriset, metriikalla $d(x, y) := \|x - y\|$, joka generoi normi-konvergenssin topologian. Samalla avaruudella voi olla useita käyttökelpoisia topologioita.

5. esi-Hilbertin avaruus on normi-avaruus jossa normi on peräisin skalaaritulosta $\langle \cdot, \cdot \rangle$ jossa $\|x\|^2 := \langle x, x \rangle$. Reaaliarvoinen skalaaritulo on symmetrinen $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$,

bilineaarinen $\langle \lambda x + \lambda' x', y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \lambda' \langle x', y \rangle$, ja positiivinen $\langle x, x \rangle \geq 0$, jolla $\langle x, x \rangle = 0 \iff 0$.

6. Täydellinen normiavaruus on Banachin avaruus ja täydellinen esi-Hilbertin avaruus on Hilbertin avaruus.

Luku 7

Tasainen integroituvuus ja $L^1(P)$ -konvergenssi

Määritelmä 7.0.1. Merkitään

$$L^0(\Omega, \mathcal{F}, P) = \{ \mathbb{R}\text{-arvoiset satunnaismuuttujat todennäköisyysavaruudessa } (\Omega, \mathcal{F}, P) \}$$

jossa tarvittaessa identifioidaan X ja Y kun $X(\omega) = Y(\omega)$ P -melkein varmasti.

Kun $0 < p < \infty$, määritellään

$$L^p = L^p(\Omega, \mathcal{F}, P) = \{ X \in L^0(\Omega, \mathcal{F}, P) \text{ jolla } \|X\|_p < \infty \} \quad \text{jossa} \quad \|X\|_p = \{E_P(|X|^p)\}^{1/p}$$

Sanomme että $X_n \xrightarrow{L^p} X$ suppenee L^p -normissa kun $E_P(|X_n - X|^p) \rightarrow 0$ kun $n \rightarrow \infty$. Määritellään myös olennainen (essential) supremum

$$\|X\|_\infty = P\text{-esssup } \{|X(\omega)|\} := \inf \{y \in \mathbb{R} : |X(\omega)| \leq y \text{ } P\text{-melkein varmasti}\}$$

$$L^\infty = L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, P) = \{X \in L^0(\Omega, \mathcal{F}, P) \text{ jolla } \|X\|_\infty < \infty\}$$

eli satunnaismuuttuja $X(\omega) \in L^\infty(P)$ jos ja vain jos on olemassa deterministinen $K < \infty$ jolla $|X(\omega)| \leq K$ P -melkein varmasti, ja s.m. on olennaisesti rajoitettu P -todennäköisyyden suhteen.

Osoitamme (myöhemmin) että $L^p(\Omega, \mathcal{F}, P)$ on Banachin avaruus (eli vektori avaruus jolla on täydellinen normi) kaikille $0 < p \leq +\infty$,

ja $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ on Hilbertin avaruus skalaaritulolla $\langle X, Y \rangle := E_P(XY)$.

76LUKU 7. TASAINEN INTEGROITUVUUS JA $L^1(P)$ -KONVERGENSSI

Teoreema 7.0.1. *Olkoon $0 < p \leq \infty$, ja $\lim_{n \rightarrow \infty} \|X_n\|_p = 0$. Seuraa että $X_n \xrightarrow{P} 0$.*

Tod. Kun $0 < p < +\infty$, väite seuraa **Chebychevin epäytälöstä** : kun $\varepsilon > 0$,

$$\varepsilon^p P(|X_n| > \varepsilon) \leq E_P(|X_n|^p) \rightarrow 0 \text{ kun } n \rightarrow \infty .$$

Kun $p = +\infty$, $\forall K \in \mathbb{N} \exists \bar{n}$ jolla

$$P(\{\omega : |X_n(\omega)| \leq K^{-1}\}) = 1 \quad \text{kun } n \geq \bar{n}$$

josta seuraa että

$$P\left(\bigcap_K \bigcup_m \bigcap_{n>m} \{\omega : |X_n(\omega)| \leq K^{-1}\}\right) = P(\{\omega : X_n(\omega) \rightarrow 0\}) = 1$$

siis $X_n \rightarrow 0$ P -melkein varmasti ja myös stokastisesti \square

Huomautus: Koska

$$\begin{aligned} |E_P(X) - E_P(Y)| &= |E_P(X - Y)| = |E_P((X - Y)^+) - E_P((X - Y)^-)| \\ &\leq E_P((X - Y)^+) + E_P((X - Y)^-) = E_P(|X - Y|) \end{aligned}$$

kun $X_n \xrightarrow{L^1(P)} X$ seuraa $E_P(X_n) \rightarrow E_P(X)$.

Käsitlemme ensin L^1 -konvergenssia. Olemme huomanneet (4.1.1) että ehdoista $X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)$ P -melkein varmasti ja $X, X_n \in L^1(P)$ ei seuraa että $E(X_n) \rightarrow E(X)$, eikä myöskään $X_n \xrightarrow{L^1} X$.

Siihen tarvitaan sen lisäksi seuraava kompaktisuuden kaltainen ehto:

Määritelmä 7.0.2. *Satunnaismuuttujen kokoelma $\mathcal{C} \subset L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ on **tasaisesti integroitava** P :n suhteen, kun*

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \sup_{X \in \mathcal{C}} E_P(|X| \mathbf{1}(|X| > K)) = \lim_{K \rightarrow \infty} \sup_{X \in \mathcal{C}} \int_{\{\omega : |X(\omega)| > K\}} |X(\omega)| P(d\omega) = 0$$

Lemma 7.0.1.

1. Olkoon \mathcal{C} satunnaismuuttujien perhe. Jos perheelle on olemassa integroitava yläraja, eli

$$\sup_{X \in \mathcal{C}} |X(\omega)| \leq Y(\omega) \in L^1(P)$$

perhe on tasaisesti integroitava.

2. Äärellinen satunnaismuuttujien joukko $\mathcal{C} = \{X_1, X_2, \dots, X_M\} \subseteq L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $M \in \mathbb{N}$ on tasaisesti integroitava, eli $\forall \varepsilon > 0$ on olemassa K jolla

$$\sup_{1 \leq m \leq M} E_P(|X_m| \mathbf{1}(|X_m| > K)) < \varepsilon$$

Tod. Kun

$$\sup_{X \in \mathcal{C}} |X(\omega)| \leq Y(\omega) \in L^1(P)$$

seuraa $\forall X \in \mathcal{C}$

$$|X(\omega)| \mathbf{1}(|X(\omega)| > K) \leq |Y(\omega)| \mathbf{1}(|Y(\omega)| > K)$$

josta seuraa

$$\sup_{X \in \mathcal{C}} E_P(|X(\omega)| \mathbf{1}(|X(\omega)| > K)) \leq E_P(|Y(\omega)| \mathbf{1}(|Y(\omega)| > K)) \downarrow 0 \text{ kun } K \uparrow \infty$$

Erityisesti kun $\mathcal{C} = \{X_1, \dots, X_n\} \subset L^1(P)$ on äärellinen joukko, se on tasaisesti integroitava koska löytyy integroitava yläraja:

$$|X_i(\omega)| \leq Y(\omega) := |X_1(\omega)| + \dots + |X_n(\omega)| \in L^1 \quad \square$$

Lause 7.0.1. (Tasaisen integroitavuuden karakterisaatio) $\mathcal{C} \subseteq L^1(P)$ on tasaisesti integroitava jos ja vain jos

$$\sup_{X \in \mathcal{C}} E_P(|X|) < \infty \quad \text{ja} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta : P(A) < \delta \implies \sup_{X \in \mathcal{C}} E_P(|X| \mathbf{1}_A) < \varepsilon$$

78LUKU 7. TASAINEN INTEGROITUVUUS JA $L^1(P)$ -KONVERGENSSI

Tod. Olkoon $\mathcal{C} \subseteq L^1(P)$ on tasaisesti integroituva.

$$\sup_{X \in \mathcal{C}} E(|X|) \leq M + \sup_{X \in \mathcal{C}} E_P(|X| \mathbf{1}(|X| > M)) < \infty$$

Tehdään vastaoletus: on olemassa tapahtumien jono $(A_k : k \in \mathbb{N})$ ja $\varepsilon > 0$ jolla $P(A_k) \leq 1/k$ ja

$$\sup_{X \in \mathcal{C}} E_P(|X| \mathbf{1}_{A_k}) \geq \varepsilon > 0$$

Koska kun $M \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} |X(\omega)| \mathbf{1}_{A_k} &\leq M \mathbf{1}_{A_k}(\omega) + |X(\omega)| \mathbf{1}(|X(\omega)| > M) , \\ 0 < \varepsilon &\leq \sup_{X \in \mathcal{C}} E(|X| \mathbf{1}_{A_k}) \leq MP(A_k) + \sup_{X \in \mathcal{C}} E_P(|X| \mathbf{1}(|X| > M)) \\ &\leq MP(A_k) + \varepsilon/3 \leq \varepsilon 2/3 \end{aligned}$$

kun valitaan M on tarpeeksi suureksi, ja $k \geq 3M/\varepsilon$.

Toisinpäin, jos

$$\sup_{X \in \mathcal{C}} E_P(|X|) = M < \infty,$$

Chebychevin epäyhtälön avulla seuraa $\forall X \in \mathcal{C}, k \in \mathbb{N}$

$$P(|X| > k) \leq M/k$$

Oletuksen mukaan $\forall \varepsilon > 0$ on olemassa δ jolla

$$E_P(|X| \mathbf{1}_A) < \varepsilon, \quad \forall X \in \mathcal{C}, \quad \forall A \text{ jolla } P(A) < \delta .$$

Kun $k \geq M/\delta$, seuraa $P(|X| > k) < \delta \quad \forall X \in \mathcal{C}$, ja

$$E_P(|\tilde{X}| \mathbf{1}(|X| > k)) < \varepsilon, \quad \forall \tilde{X}, X \in \mathcal{C}$$

erityisesti

$$E_P(|X| \mathbf{1}(|X| > k)) < \varepsilon, \quad \forall X \in \mathcal{C}$$

ja väite on todistettu \square

Seuraus 7.0.1. $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, jos ja vain jos $\forall \varepsilon > 0$ on olemassa δ , jolla kun $A \in \mathcal{F}$,

$$P(A) < \delta \implies E_P(|X| \mathbf{1}_A) < \varepsilon$$

Teoreema 7.0.2. ($L^1(P)$ -konvergenssin karakterisaatio) Olkoon satunnaismuuttujat $\{X_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $n \in \mathbb{N}$ ja $X \in L^0(\Omega, \mathcal{F})$. Silloin

1. $X_n \xrightarrow{P} X$ ja satunnaismuuttujien jono $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ on tasaisesti integroitava,

jos ja vain jos

2. $X_n \xrightarrow{L^1} X \in L^1(P)$, eli

Tod. Kun $X_n \xrightarrow{P} X$ lauseesta (6.0.1) seuraa että on olemassa deterministinen indeksien alijono $n(k)$ jolle $X_{n(k)}(\omega) \rightarrow X(\omega)$ P -melkein varmasti.

Soveltamalla Fatoun lemmaa (4.1.4)

$$E_P(|X|) = E_P(\liminf_k |X_{n(k)}|) \leq \liminf_k E_P(|X_{n(k)}|) < \infty$$

jossa tasaisen integroitavuuden oletuksesta

$$\sup_{k \in \mathbb{N}} E_P(|X_{n(k)}|) \leq M + \sup_{k \in \mathbb{N}} E_P\left(|X_{n(k)}| \mathbf{1}(|X_{n(k)}| > M)\right) < \infty$$

Siis on osoitettu että $X \in L^1(P)$.

Olkoon $K \in \mathbb{N}$ ja määritellään kuvaus

$$g^{(K)}(x) = \begin{cases} K & \text{kun } x > K \\ x & \text{kun } |x| \leq K \\ -K & \text{kun } x < -K \end{cases}$$

ja satunnaismuuttujat $X_n^{(K)}(\omega) = g^{(K)}(X_n(\omega))$, $X^{(K)}(\omega) = g^{(K)}(X(\omega))$.

Lauseesta (7.0.1) ja tasaisen integroitavuuden oletuksesta seuraa $\forall \varepsilon > 0$ $\exists K$ jolla

$$E_P(|X - X^{(K)}|) < \varepsilon \quad \text{ja} \quad E_P(|X_n - X_n^{(K)}|) < \varepsilon \quad \forall n,$$

80LUKU 7. TASAINEN INTEGROITUVUUS JA $L^1(P)$ -KONVERGENSSI

koska

$$\begin{aligned} \sup_n E_P(|X_n - X_n^{(K)}|) &= \sup_n \left\{ \int_{\{\omega: |X_n(\omega)| > K\}} |X(\omega)| P(d\omega) - KP(|X_n| > K) \right\} \\ &\leq \sup_n \int_{\{\omega: |X_n(\omega)| > K\}} |X(\omega)| P(d\omega) \longrightarrow 0 \text{ kun } K \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Osoitamme ensin että

$$E_P(|X^{(K)} - X_n^{(K)}|) \rightarrow 0 \text{ kun } K \rightarrow \infty.$$

Koska $|g^{(K)}(x) - g^{(K)}(y)| < |x - y|$, seuraa $X_n^{(K)} \xrightarrow{P} X^{(K)}$. On olemassa \bar{n} jolla

$$P(|X_n^{(K)} - X^{(K)}| > \frac{\varepsilon}{3}) < \frac{\varepsilon}{3K} \text{ kun } n \geq \bar{n},$$

josta seuraa

$$\begin{aligned} E_P(|X_n^{(K)} - X^{(K)}|) &= E_P\left(|X_n^{(K)} - X^{(K)}| \mathbf{1}\left(|X_n^{(K)} - X^{(K)}| > \frac{\varepsilon}{3}\right)\right) \\ &+ E_P\left(|X_n^{(K)} - X^{(K)}| \mathbf{1}\left(|X_n^{(K)} - X^{(K)}| \leq \frac{\varepsilon}{3}\right)\right) \\ &\leq 2K P\left(|X_n^{(K)} - X^{(K)}| > \frac{\varepsilon}{3}\right) + \frac{\varepsilon}{3} \leq 2K \frac{\varepsilon}{3K} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \quad \text{kun } n \geq \bar{n} \end{aligned}$$

Kolmioepäyhtälön avulla, kun $n \geq \bar{n}$

$$E_P(|X_n - X|) \leq E_P(|X_n - X_n^{(K)}|) + E_P(|X_n^{(K)} - X^{(K)}|) + E_P(|X^{(K)} - X|) \leq 3\varepsilon$$

Toisinpäin, kun $E_P(|X_n - X|) \rightarrow 0$, seuraa (kts. lause 7.0.1) että $X_n \xrightarrow{P} X$.

Olkoon $\varepsilon > 0$, ja $N \in \mathbb{N}$ jolla

$$E_P(|X - X_n|) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{kun } n \geq N.$$

lauseesta 7.0.1 $\exists \delta > 0$ jolla $\forall A \in \mathcal{F}$ jolla $P(A) < \delta$ seuraa

$$\max_{n \leq N} E_P(|X_n| \mathbf{1}_A) < \varepsilon \quad \text{ja} \quad E_P(|X| \mathbf{1}_A) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Koska $E_P(|X_n|) \leq E_P(|X|) + E_P(|X_n - X|)$ jossa oletetusti $E_P(|X_n - X|) \rightarrow 0$, seuraa

$$M := \sup_n E_P(|X_n|) \leq E_P(|X|) + \max_{1 \leq n \leq N} E_P(|X_n - X|) + \frac{\varepsilon}{2} < \infty.$$

Kun otetaan $K := M/\delta$, Chebychevin epäyhtälöstä seuraa

$$P(|X_n| > K) \leq K^{-1} E_P(|X_n|) < \delta \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Kun $n \geq N$,

$$E_P(|X_n| \mathbf{1}(|X_n| > K)) \leq E_P(|X| \mathbf{1}(|X_n| > K)) + E(|X - X_n|) < \varepsilon$$

Kun $n \leq N$ myös $P(|X_n| > K) < \delta$ ja

$$E_P(|X_n| \mathbf{1}(|X_n| > K)) < \varepsilon$$

eli tämä on voimassa kaikille $n \in \mathbb{N}$ kun K on tarpeeksi suuri,

ja $(X_n : n \in \mathbb{N})$ on tasaisesti integroituva \square

Seuraus 7.0.2. (*Lebesguen dominoidun konvergenssin lause, jatko*)

Olko $X_n \xrightarrow{P} X$ jossa $|X_n(\omega)| \leq Y(\omega)$ P -melkein varmasti jollekin $0 \leq Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Silloin

$$|E_P(X_n) - E_P(X)| \leq E_P(|X_n - X|) \rightarrow 0 \quad \text{kun } n \rightarrow \infty.$$

Tod. lause (7.0.2) ja lemma (7.0.1) \square

Voidaan osoittaa että tasainen integroituvuus vastaa kompaktisuuden ehtoa $L^1(P)$ avaruudessa varustettuna heikolla topologiolla. Tämä ei päde vahvemmalle $L^1(P)$ -normin topologialle.

Teoreema 7.0.3. (*Dunford-Pettisin lause*) Satunnaisuuttujen joukko $\mathcal{C} \subseteq L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ on tasaisesti integroituva P -mitan suhteen jos ja vain jos on esi-kompakti (precompact) $L^1(P)$ avaruuden heikossa topologiassa: kaikille jonolle $\{X_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{C}$ on olemassa indeksien jono $\{n(k) : k \in \mathbb{N}\}$ ja s.m. $X \in L^1(P)$ joilla

$$\lim_{k \rightarrow \infty} E_P((X_{n(k)} - X) \mathbf{1}_A) = 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$$

82LUKU 7. TASAINEN INTEGROITUVUUS JA $L^1(P)$ -KONVERGENSSI

Huomautus 7.0.1. Tästä ei seura alijonon vahvempi L^1 -konvergenssi

$$E_P(|X_{n(k)} - X|) \rightarrow 0.$$

Esimerkki 7.0.1. Olkoon $G(\omega)$ standardi gaussinen satunnaismuuttuja, jolla

$$P(G \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp(-y^2/2) dy$$

Määritellään satunnaismuuttujen jono

$$Z_n(\omega) = \exp(\sqrt{n}G(\omega) - n/2) > 0, \quad n \in \mathbb{N}$$

Koska Gaussisen jakauman momentti-generoiva funktio on $E_P(\exp(tG)) = \exp(t^2/2)$, $\forall t \in \mathbb{R}$, seuraa $E_P(Z_n) = 1 \forall n \in \mathbb{N}$.

Osoitan että $\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n(\omega) = 0$ P -melkein varmasti. Siitä seuraa että satunnaismuuttujen perhe $(Z_n : n \in \mathbb{N}) \subset L^1(P)$ ei ole tasaisesti integroituva, koska $E_P(Z_n) = 1 \not\rightarrow 0$.

Chebychevin epäyhtälön avulla, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$,

$$P(Z_n > \varepsilon) \leq \varepsilon^{-\alpha} E_P(Z_n^\alpha) = \varepsilon^{-\alpha} E_P\left(\exp(\alpha\sqrt{n}G - \alpha n/2)\right) = \varepsilon^{-\alpha} \exp(-(1-\alpha)\alpha n/2)$$

kun $\alpha \in (0, 1)$,

$$P(Z_n > K^{-1}) \leq K^\alpha \beta^n$$

jossa $\beta = \exp((1-\alpha)\alpha/2) \in (0, 1)$.

Koska geometrinen sarja $\sum_{n=0}^{\infty} \beta^n = (1-\beta)^{-1} < \infty$ suppenee, ensimmäisestä Borel Cantelli lemmasta (5.1.1) seuraa $\forall K \in \mathbb{N}$

$$P\left(\limsup_n \{Z_n > K^{-1}\}\right) = 0$$

ja ottaamalla numeroituvan leikkauksen komplementtijoukoista

$$P\left(\bigcap_{K \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \geq m} \{Z_n \leq K^{-1}\}\right) = 1$$

eli $Z_n(\omega) \rightarrow 0$ P -melkein varmasti \square

Huomautus 7.0.2. Siis ääretönulotteisessa $L^1(P)$ avaruudessa rajoitettu joukko ei tarvitse olla tasaisesti integroituva, eli esi-kompakti heikon topologian suhteen. Funktionaali analyysin Banach-Alaogluin lause sanoo että suljettu yksikköpallo on kompakti niin sanotun heikko-tähti (weak star) topologian suhteen.

Huomautus 7.0.3. Satunnaismuuttujien kokoelman tasainen integroituvuus koskee pelkästään satunnaismuuttujien jakaumat, niiden välinen riippuvusrakenteella ei ole yhtään roolia.

Teoreema 7.0.4. (Leskelän ja Viholan tasaisen integroituvuuden karakterisointio, 2011) Satunnaismuuttujien kokoelma \mathcal{C} on tasaisesti integroituva jos ja vain jos on olemassa $0 \leq Y(\omega) \in L^1(P)$ jolla $\forall K > 0$

$$\sup_{X \in \mathcal{C}} E_P \left((|X| - K)^+ \right) \leq E_P \left((Y - K)^+ \right)$$

jossa $x^+ = x \vee 0 = x \mathbf{1}(x > 0)$.

Tod. (Todistamme nyt \Leftarrow implikaation, todistamme \Rightarrow myöhemmin, kun konveksisuuden määritelmät ovat käytössä).

Käytämme epäyhtälöä

$$x \mathbf{1}(x > K) \leq 2(x - K/2)^+, \quad K \geq 0$$

Seuraa

$$\sup_{X \in \mathcal{C}} E_P(|X| \mathbf{1}(|X| > K)) \leq 2 \sup_{X \in \mathcal{C}} E_P((|X| - K/2)^+) \leq 2E_P((Y - K/2)^+) \rightarrow 0$$

kun $K \rightarrow \infty$, jossa dominoidun konvergenssi lauseen oletukset ovat voimassa:

$Y(\omega) \geq (Y(\omega) - K/2)^+ \geq 0$ jossa $(Y(\omega) - K/2)^+ \rightarrow 0$ P -melkein varmasti kun $K \rightarrow \infty$, ja yläraja $Y(\omega)$ on integroituva \square

Huomautus 7.0.4. Kun satunnaismuuttujan $Y(\omega) \geq 0$ tulkitaan osakkeen markkinaarvoksi ja $K > 0$ on deterministinen, satunnaismuuttuja $(Y(\omega) - K)^+$ kutsutaan eurooppalaiseksi osto-optioksi lunastushinnalla K . Option haltijalla on oikeus mutta ei velvollisuutta ostaa yhden osakkeen ennalta sovitulla hinnalla K . Option haltijan kannattaa käyttää optionsa kun osakkeen markkinahinta on suurempi kun ennalta sovittu lunastushinta, saadakseen voittonsa $(Y(\omega) - K)^+$. Kun markkinahinta on pienempi tai yhtä kuin lunastushinta, optio on arvoton.

84 LUKU 7. TASAINEN INTEGROITUVUUS JA $L^1(P)$ -KONVERGENSSI

Luku 8

Fubinin lause ja tulo-todennäköisyys

Lemma 8.0.1. *Olkoon $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq L^0(\Omega, \mathcal{F})$.*

1. *Kun $X_n(\omega) \geq 0$ P -melkein varmasti $\forall n$, seuraa*

$$\sum_{k=1}^{\infty} E_P(X_k) = E_P\left(\sum_{k=1}^{\infty} X_k(\omega)\right) \in [0, +\infty] \quad (8.0.1)$$

2. *Kun $(X_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq L^1(P)$ (ei välttämättä ei-negatiivisia),*

ja $\sum_{k=1}^{\infty} E_P(|X_k|) < \infty$, satunnais-sarja

$$S_{\infty}(\omega) = \sum_{k=1}^{\infty} X_k(\omega)$$

suppenee P -melkein varmasti ja $L^1(P)$ -normissa, (8.0.1) on voimassa.

Todistus:

1. selvästi kun $X_n(\omega) \geq 0$, $S_n(\omega) := \sum_{k=1}^n X_k(\omega) \uparrow S_{\infty}(\omega) \in [0, +\infty]$ P -m.v. kun $n \uparrow \infty$, ja väite seuraa monotonisen konvergenssilauseesta.

2. Olkoon $Y_n = S_n(\omega) := \sum_{k=1}^n |X_k(\omega)|$, $Y_n \uparrow Y_{\infty} := \sum_{k=1}^{\infty} |X_k(\omega)|$ ja monotonisen konvergenssi lauseesta (4.1.1) seuraa

$$E_P(Y_{\infty}) = \sum_{k=1}^{\infty} E_P(|X_k|)$$

siis $Y_\infty \in L^1(P)$ ja erityisesti $P(Y_\infty < \infty) = 1$. P -melkein varmasti, ja tästä seuraa että P -m.v. $S_n(\omega) \rightarrow S_\infty(\omega)$ koska sarja suppenee absoluuttisesti.

Koska

$$|S_n(\omega)| \leq Y_n(\omega) \uparrow Y_\infty(\omega) < \infty$$

jossa $Y_\infty \in L^1(P)$, dominoidun konvergenssi lauseesta (7.0.2) seuraa odotusarvojen sarjan konvergenssi $L^1(P)$ avaruudessa ja yhtälö (8.0.1) \square

Seuraava lause on Dynkinin lemmän (2.1.3) vastine satunnaismuuttujille:

Teoreema 8.0.1. (Monotonisen luokan lause)

Olko \mathcal{C} kokoelma rajoitetuista funktioista $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. \mathcal{C} kutsutaan **monotoniseksi luokaksi** kun

1. \mathcal{C} on vektoriavaruus.
2. vakio funktio $\mathbf{1} \in \mathcal{C}$.
3. \mathcal{C} on suljettu monotonisen rajankäynnin suhteen:

kaikille jonoille $\{X_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{C}$ joilla $0 \leq X_n(\omega) \leq X_{n+1}(\omega) \forall \omega \in \Omega, n \in \mathbb{N}$ kun $n \uparrow \infty$, ja $X(\omega) := \lim_{n \uparrow \infty} X_n(\omega)$ on rajoitettu funktio, seuraa $X \in \mathcal{C}$.

Kun monotoninen luokka \mathcal{C} sisältää indikaattorit $\mathbf{1}_A(\omega) \forall A \in \mathcal{I}$, jossa \mathcal{I} on π -luokka (eli suljettu leikkauksen suhteen),

silloin \mathcal{C} sisältää kaikki rajoitetut $(\Omega, \sigma(\mathcal{I})) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ mitalliset funktiot.

Tod. Olkoon $\mathcal{D} = \{A \subseteq \Omega : \mathbf{1}_A \in \mathcal{C}\}$.

Seuraa monotonisen luokan määritelmästä että \mathcal{D} on d -luokka joka sisältää π -luokan \mathcal{I} . Dynkinin lemmasta (2.1.3) seuraa että $\mathcal{D} \supseteq \sigma(\mathcal{I})$.

Olkoon $X(\omega)$ $\sigma(\mathcal{I})$ -mitallinen satunnaismuuttuja jolla $0 \leq X(\omega) \leq K \forall \omega \in \Omega$.

Määritellään kuvausten jono

$$X^{(n)}(\omega) := \sum_{\ell=0}^{n-1} \frac{K\ell}{n} \mathbf{1}\{X(\omega) \in (K\ell/n, K(\ell+1)/n]\} \quad , \quad n \in \mathbb{N}$$

Koska \mathcal{C} on vektoriavaruus, seuraa $\{X^{(n)}\} \subseteq \mathcal{C}$, ja koska

$$0 \leq X^{(n)}(\omega) \uparrow X(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega$$

jossa oletetusti $X(\omega)$ on rajoitettu, seuraa että $X(\omega) \in \mathcal{C}$ \square

Seuraava lause on esimerkki monotonisen luokan lauseen käytöstä.

Teoreema 8.0.2. *Olkoon kuvaus $Y : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (S, \mathcal{S})$ S -arvoinen satunnaismuuttuja, esimerkiksi $(S, \mathcal{S}) = (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$.*

Olkoon

$$\sigma(Y) := \{ Y^{-1}(A) : A \in \mathcal{S} \}$$

satunnaismuuttujan Y :n virittämä σ -algebra

Silloin satunnaismuuttuja $X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ on $\sigma(Y)$ -mitallinen jos ja vain jos on olemassa mitallinen kuvaus $f : (S, \mathcal{S}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ jolla $X(\omega) = f(Y(\omega))$.

Proof \Leftarrow implikaatio on jo osoitettu (lemma 3.0.2).

Olkoon

$$\mathcal{C} = \{ f(Y(\omega)) : f \text{ on Borel-mitallinen ja } |f(Y(\omega))| \text{ on rajoitettu} \}$$

Selvästi \mathcal{C} on vektoriavaruus joka sisältää vakiot. Olkoon

$$0 \leq f_n(Y(\omega)) \leq f_{n+1}(Y(\omega)) \leq K < \infty \quad \forall n \in \mathbb{N}, \omega \in \Omega_i$$

Olkoon $f(y) := \limsup_n f_n(y) \forall y \in S$. Seuraa että $f : (S, \mathcal{S}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ on mitallinen, ja

$$0 \leq f_n(Y(\omega)) \uparrow f(Y(\omega)) \leq K < \infty \quad \text{kun } n \uparrow \infty$$

Siis \mathcal{C} on monotoninen luokka. Koska $\mathbf{1}_A(Y(\omega)) \in \mathcal{C} \forall A \in \mathcal{S}$, ja

$$\sigma(Y) = \{ Y^{-1}(A) : A \in \mathcal{S} \}$$

seuraa että \mathcal{C} sisältää kaikki $\sigma(Y)$ -mitallisia ja rajoitettuja R -arvoisia satunnaismuuttujia.

Yleisemmin, jos $X(\omega)$ on $\sigma(Y)$ -mitallinen \mathbb{R} -arvoinen satunnaismuuttuja, joka ei ole välttämättä rajoitettu, koska $\arctan(x)$ on jatkuva bijektio \mathbb{R} :n ja $(-\pi/2, \pi/2)$ välissä, satunnaismuuttuja $\arctan(X(\omega))$ on rajoitettu ja $\sigma(Y)$ -mitallinen, siksi $\arctan(X(\omega)) = f(Y(\omega))$ jollekin Borel-mitalliselle funktiolle f , ja $X(\omega) = \tan(f(Y(\omega)))$ jossa $\tan(f(x))$ on myös Borel-mitallinen funktio \square

Lemma 8.0.2. *Todennäköisyysavaruuksien $(\Omega_i, \mathcal{F}_i, P_i)$, $i=1,2$, tuloavaruus $\Omega_1 \times \Omega_2$ on varustettu tulo- σ -algebralla $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 := \sigma(\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2)$.*

Olkoon $X : (\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ satunnaismuuttuja.

Silloin kaikille kiinnitetyle $\omega_2 \in \Omega_2$ kuvaus

$$\omega_1 \mapsto X(\omega_1, \omega_2)$$

on $(\Omega_1, \mathcal{F}_1) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ satunnaismuuttuja, ja tietysti myös kaikille kiinnitetyle $\omega_1 \in \Omega_1$ kuvaus

$$\omega_2 \mapsto X(\omega_1, \omega_2)$$

on $(\Omega_2, \mathcal{F}_2) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ satunnaismuuttuja. Myös päinvastainen implikaatio on tosi:

jos $\omega_1 \mapsto X(\omega_1, \omega_2)$ on \mathcal{F}_1 -mitallinen $\forall \omega_2 \in \Omega_2$, ja $\omega_2 \mapsto X(\omega_1, \omega_2)$ on \mathcal{F}_2 -mitallinen $\forall \omega_1 \in \Omega_1$,

seuraa että kuvaus $(\omega_1, \omega_2) \mapsto X(\omega_1, \omega_2)$ on $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ -mitallinen.

Tod. Oletamme ensin että $|X(\omega_1, \omega_2)| \leq K$ jossa K on deterministinen.

Olkoon

$\mathcal{C} = \{ (\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)\text{-mitalliset ja rajoitetut satunnaismuuttujat joilla väite on tosi} \}$

On selvää \mathcal{C} on monotoninen luokka ja

$$\mathbf{1}_{(A_1 \times A_2)}(\omega_1, \omega_2) = \mathbf{1}_{A_1}(\omega_1)\mathbf{1}_{A_2}(\omega_2) \in \mathcal{C}, \forall A_i \in \mathcal{F}_i, i = 1, 2.$$

Koska $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$ on π -luokka, monotonisen luokan lauseesta seuraa että \mathcal{C} sisältää kaikki rajoitetut $(\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$ -mitalliset kuvaukset.

Lause seuraa myös kun satunnaismuuttuja X ei ole rajoitettu, koska

$$X(\omega) = \lim_{K \rightarrow \infty} X^{(K)}(\omega) \quad \forall \omega = (\omega_1, \omega_2) \in \Omega_1 \times \Omega_2 \quad \text{jossa}$$

$$X^{(K)}(\omega) = X(\omega) \mathbf{1}(|X(\omega)| \leq K) \in [-K, K]$$

jossa on osoitettu että $X^{(K)}(\omega_1, \cdot)$ on \mathcal{F}_2 -mitallinen $X^{(K)}(\cdot, \omega_2)$ on \mathcal{F}_1 -mitallinen.

Toiseen suuntaan, olkoon

$$\mathcal{C} = \left\{ \text{funktioit } X(\omega_1, \omega_2) \text{ jotka ovat rajoitettuja ja erikseen } \mathcal{F}_i\text{-mitallisia} \right\}$$

Seuraa että \mathcal{C} on monotoninen luokka, ja $\forall A_1 \in \mathcal{F}_1, A_2 \in \mathcal{F}_2 \mathbf{1}_{A_1}(\omega_1) \times \mathbf{1}_{A_2}(\omega_2) \in \mathcal{C}$. Monotonisen luokan lauseesta seuraa että \mathcal{C} sisältää kaikki rajoitetut ja $(\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$ -mitalliset funktiot.

Teoreema 8.0.3. (*Fubinin lause*)

Olkoon $X : (\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ satunnaismuuttuja.

- Kun $X(\omega_1, \omega_2) \geq 0$ määritellään marginaali-integraalit

$$I_1^X(\omega_1) = \int_{\Omega_2} X(\omega_1, \omega_2) P_2(d\omega_2), \quad I_2^X(\omega_2) = \int_{\Omega_1} X(\omega_1, \omega_2) P_1(d\omega_1)$$

(lemmasta 8.0.2 ja positiivisuudesta seuraa että nämä ovat hyvin määritellyitä).

Silloin iteroitu integraali ei riipu integroinnin järjestyksestä

$$\int_{\Omega_1} I_1^X(\omega_1) P_1(d\omega_1) = \int_{\Omega_1} \left\{ \int_{\Omega_2} X(\omega_1, \omega_2) P_2(d\omega_2) \right\} P_1(d\omega_1) = (8.0.2)$$

$$\int_{\Omega_2} I_2^X(\omega_2) P_1(d\omega_2) = \int_{\Omega_2} \left\{ \int_{\Omega_1} X(\omega_1, \omega_2) P_1(d\omega_1) \right\} P_2(d\omega_2) :=$$

$$\int_{\Omega_1 \times \Omega_2} X(\omega_1, \omega_2) (P_1 \otimes P_2)(d\omega_1 \times d\omega_2)$$

ja tulotodennäköisyys $(P_1 \otimes P_2)(A)$ on hyvin määritetty kun $A \in (\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$ ottaamalla $X(\omega_1, \omega_1) = \mathbf{1}_A(\omega_1, \omega_2)$.

- Yleisemmin kaava (8.0.2) on voimassa kun

$$\int_{\Omega_1 \times \Omega_2} |X(\omega_1, \omega_2)| (P_1 \otimes P_2)(d\omega_1 \times d\omega_2) < \infty$$

Todistus: määritellään

$\mathcal{C} = \{(\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$ -mitalliset ja rajoitetut satunnaismuuttujat joilla väite on tosi }

Osoitamme että \mathcal{C} on monotoninen luokka. Selvästi vakio $\mathbf{1} \in \mathcal{C}$ ja $(aX + bY) \in \mathcal{C}$ kun $X, Y \in \mathcal{C}$, $a, b \in \mathbb{R}$.

Olkoon jono $\{X^{(n)} : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{C}$ jolla

$$0 \leq X_n(\omega_1, \omega_2) \uparrow X(\omega_1, \omega_2) \leq K < \infty \quad \forall \omega_i \in \Omega_i, i = 1, 2.$$

Lemmasta 8.0.2 ja monotonisen konvergenssin lauseesta (4.1.1) seuraa

$$I_i^{X^{(n)}}(\omega_i) \uparrow I_i^X(\omega_i) \in L^0(\Omega_i, \mathcal{F}_i), \quad i = 1, 2.$$

Soveltamalla monotonisen konvergenssin lausetta toista kertaa seuraa

$$E_{P_1}(I_1^X) = \lim_{n \uparrow \infty} E_{P_1}(I_1^{X^{(n)}}) = \lim_{n \uparrow \infty} E_{P_2}(I_2^{X^{(n)}}) = E_{P_2}(I_2^X)$$

Fubinin lauseen väite pätee myös X :lle, siis $X \in \mathcal{C}$ joka on monotoninen luokka.

Selvästi $\mathbf{1}_{(A_1 \times A_2)} \in \mathcal{C} \quad \forall A_i \in \mathcal{F}_i, i = 1, 2.$

Koska $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$ on π -luokka, monotonisen luokan lauseesta seuraa että \mathcal{C} sisältää kaikki rajoitetut $(\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$ -mitalliset kuvaukset. Erityisesti \mathcal{C} sisältää kaikki yksinkertaiset satunnaismuuttujat $X \in \mathcal{Y}(\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$. Nyt monotonisen konvergenssi lauseen avulla väite seuraa myös kun $X \in (\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)^+$.

Osoitamme että kuvaus

$$(P_1 \otimes P_2) : (\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2) \longrightarrow [0, 1]$$

on σ -additiivinen todennäköisyys:

Olkoon $\{A^{(n)} : n \in \mathbb{N}\} \subseteq (\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$ ei-vähenevä tapahtuma jono, siis

$$A^{(n)} \subseteq A^{(n+1)} \uparrow A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A^{(n)}$$

Määritellään joukkojen leikkeitä: kun $\omega_1 \in \Omega_1$,

$$A_2^{(n)}(\omega_1) := \{\omega_2 : (\omega_1, \omega_2) \in A^{(n)}\} \uparrow A_2(\omega_1) := \{\omega_2 : (\omega_1, \omega_2) \in A\} \text{ kun } n \uparrow \infty .$$

$\forall \omega_1 \in \Omega_1$, koska P_2 on σ -additiivinen seuraa $P_2(A_2^{(n)}(\omega_1)) \uparrow P_2(A_2(\omega_1))$, jossa $P_2(A_2^{(n)}(\omega_1))$ ja $P_2(A_2(\omega_1))$ ovat \mathcal{F}_1 -mitallisia satunnaismuuttujia. Nyt monotonisen konvergenssi lauseesta seuraa

$$(P_1 \otimes P_2)(A^{(n)}) = \int_{\Omega_1} P_2(A_2^{(n)}(\omega_1)) P_1(d\omega_1) \uparrow \int_{\Omega_1} P_2(A_2(\omega_1)) P_1(d\omega_1) = (P_1 \otimes P_2)(A) .$$

Hajottamalla $X(\omega) = (X^+(\omega) - X^-(\omega))$, odotusarvon linearisuudesta väite seuraa myös silloin kun $X \in L^1(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, P_1 \otimes P_2)$ \square .

Seuraus 8.0.1. *Fubini lause on voimassa myös kun todennäköisyysavaruuDET $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$ varustetaan σ -additiivisilla mitoilla $\mu_i, i = 1, 2$.*

Tod. Kun mitat $\mu_i(d\omega_i)$ ovat äärellisiä, sovelletaan Fubini lauseen ensin todennäköisyysmitoille $P_i(d\omega_i) = \mu_i(d\omega_i)/\mu_i(\Omega_i)$ $i = 1, 2$.

Kun mitat μ_i ovat σ -äärellisiä on olemassa numeroituvia mitallisia osituksia

$$\Omega_i = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \Omega_i^{(n)}, \text{ jossa } (\Omega_i^{(n)} \cap \Omega_i^{(m)}) = \emptyset, n \neq m, \text{ ja } \mu_i(\Omega_i^{(n)}) < \infty \quad i = 1, 2$$

Väite seuraa kun integroidaan erikseen tulo-avaruuksissa $(\Omega_1^{(n)} \times \Omega_2^{(k)})$, $n, k \in \mathbb{N}$.

Seuraus 8.0.2. *Fubini lause yleistyy suoraan äärelliseen tuloavaruuteen*

$$(\Omega_1 \times \cdots \times \Omega_d, \mathcal{F}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{F}_d, P_1 \otimes \cdots \otimes P_d), \quad d \in \mathbb{N}$$

Lause 8.0.1. *TodennäköisyysavaruuDESSA (Ω, \mathcal{F}, P) , olkoon*

$$X(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_d(\omega)) \in \mathbb{R}^d$$

satunnaisvektori, ja olkoon $P_X(dt)$ sen todennäköisyysjakauma $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ avaruudessa:

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)) = P(\{\omega : X(\omega) \in B\}), \quad \text{kun } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$$

Satunnaismuuttujat $X_1(\omega), \dots, X_d(\omega)$ ovat rippumattomia P -mitan suhteen jos ja vain jos vektorin todennäköisyysjakauma on koordinaattien jakaumien tulo:

$$P_X = (P_{X_1} \otimes \dots \otimes P_{X_d})$$

Tod. harjoitustehtävä.

Huomaat että kuten lemmassa 8.0.2 kuvaus $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ on mitallinen jos ja vain jos koordinaatti-kuvaukset $X_i : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ $i = 1, \dots, d$ ovat mitallisia.

Esimerkki 8.0.1. Olkoon satunnaismuuttuja $X(\omega) \geq 0$ P -melkein varmasti. Silloin

$$E_P(X) = \int_{\Omega} X(\omega)P(d\omega) = \int_0^{\infty} t P_X(dt) = \int_0^{\infty} P(X > t)dt$$

Tod. koska $t = \int_0^{\infty} \mathbf{1}(s < t)ds$

$$\int_0^{\infty} t P_X(dt) = \int_0^{\infty} \left(\int_0^{\infty} \mathbf{1}(s < t)ds \right) P_X(dt)$$

Koska $\mathbf{1}(s < t) \geq 0$ ja Lebesguen mitta on σ -äärellinen, Fubini lause soveltuu. Vaihdamme integroinnin järjestyksen:

$$= \int_0^{\infty} \left(\int_0^{\infty} \mathbf{1}(s < t)P_X(dt) \right) ds = \int_0^{\infty} P_X((s, +\infty))ds = \int_0^{\infty} P(X > s)ds$$

8.0.1 Osittaisintegroinnin kaava

Lause 8.0.2. Olkoon $F, G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ei väheneviä ja oikealta jatkuvia funktioita. Silloin kun $a < b$,

$$\begin{aligned} \int_a^b G(x)F(dx) &= \int_a^b G(x-)F(dx) + \sum_{y \in (a,b]} \Delta G(y)\Delta F(y) \\ &= F(b)G(b) - F(a)G(a) - \int_a^b F(x-)G(dx) \end{aligned}$$

jossa integraalit ovat olemassa Riemann-Stieltjesin mielessä. Osittaisintegrointi kaava pätee myös kun $F(x) = F^+(x) - F^-(x)$, $G(x) = G^+(x) - G^-(x)$, jossa F^{\pm}, G^{\pm} ovat ei väheneviä ja oikealta jatkuvia.

Tod. Huomaamme ensin että

$$\int_a^b G(x)F(dx) = \int_{(a,b]} G(x)F(dx) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{1}_{(a,b]}(x)G(x)F(dx),$$

ja kun $x \geq a$,

$$G(x) = G(a) + \int_a^{\infty} \mathbf{1}(y \leq x)G(dy).$$

Tästä seuraa

$$\int_a^b G(x)F(dx) = \int_a^b \left\{ G(a) + \int_a^{\infty} \mathbf{1}(y \leq x)G(dy) \right\} F(dx) =$$

$$G(a)(F(b) - F(a)) + \int_a^b \left(\int_a^b \mathbf{1}(y \leq x)G(dy) \right) F(dx)$$

Koska mitat $F(dx)$ ja $G(dy)$ ovat ääreläisiä kompakteissa ja integrandi on ei-negatiivinen, Fubinin lause soveltuu:

$$= G(a)(F(b) - F(a)) + \int_a^b \left(\int_a^b \mathbf{1}(y \leq x)F(dx) \right) G(dy) =$$

$$G(a)(F(b) - F(a)) + \int_a^b (F(b) - F(y-))G(dy) =$$

$$F(b)G(b) - F(a)G(a) - \int_a^b F(y-)G(dy).$$

Huomataan myös että voidaan kirjoittaa

$$\int_a^b G(x)F(dx) = \int_a^b G(x-)F(dx) + \sum_{y \in (a,b]} \Delta G(y)\Delta F(y)$$

koska ei-vähenevällä funktiolla on korkeintaan numeroituva määrä hyppyjä \square

8.0.2 Sovellus: odotusarvon derivointi parametrin suhteen

Lemma 8.0.3. *Olkoon $X_i : (\Omega_i, \mathcal{F}_i) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ $i = 1, 2$ reaaliarvoisia satunnaismuuttujia eri todennäköisyysavaruuksissa. Silloin tulo $X(\omega_1, \omega_2) = X_1(\omega_1)X_2(\omega_2)$ on satunnaismuttuja tuloavaruudessa $(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$.*

Tod. Olkoon $X_i(\omega_i) \geq 0 \forall \omega_i \in \Omega_i, i = 1, 2$

(yleisemmin voidaan ensin hajottaa $X_i = (X_i^+ - X_i^-)$). Kun $t \geq 0$

$$\begin{aligned} & \{(\omega_1, \omega_2) : X_1(\omega_1)X_2(\omega_2) \leq t\} = \\ & \bigcup_{0 < q \in \mathbb{Q}} \left(\left\{ \omega_1 : X_1(\omega_1) \leq \frac{t}{q} \right\} \cap \left\{ \omega_2 : X_2(\omega_2) \leq q \right\} \right) \in (\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2) \quad , \end{aligned}$$

ja Dynkinin lemmasta (2.1.3) seuraa

$$\{(\omega_1, \omega_2) : X_1(\omega_1)X_2(\omega_2) \in B\} \in (\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2) \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \square$$

Lause 8.0.3. Olkoon (Ω, \mathcal{F}, P) todennäköisyysavaruus jossa

$$\{Y(t, \omega) : t \in [a, b]\} \subseteq L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$$

on tasaisesti integroitava satunnaismuuttujen joukko, $a < b \in \mathbb{R}$. Oletamme sen lisäksi

- Kaikille $\omega \in \Omega$, kuvaus $t \mapsto Y(t, \omega)$ on jatkuva.
- Kaikille $t \in [a, b]$ kuvaus $\omega \mapsto Y(t, \omega)$ on \mathcal{F} -mitallinen.

Tästä seuraa

1. kuvaus $(t, \omega) \mapsto Y(t, \omega)$ on $(\mathcal{B}([a, b]) \otimes \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathbb{R})$ mitallinen.
2. kuvaus $t \mapsto E_P(Y(t))$ on jatkuva.
3. Satunnaiskuvauksen

$$X(t, \omega) := \int_a^t Y(s, \omega) ds, \quad t \in [a, b].$$

odotusarvo $E_P(X(t))$ on derivoitua kaikissa $t \in (a, b)$, jatkuvalla derivaatalla

$$\frac{d}{dt} E_P(X(t)) = E_P(Y(t)) = E_P\left(\frac{d}{dt} X(t)\right)$$

Tod. Määritellään tuloavaruudessa $[a, b] \times \Omega$ satunnaismuuttujien jono

$$Y^{(N)}(t, \omega) = \sum_{k=0}^{(N-1)} Y\left(a + (b-a)\frac{k}{N}, \omega\right) \mathbf{1}\left(a + (b-a)\frac{k}{N} < t \leq a + (b-a)\frac{(k+1)}{N}\right), \quad N \in \mathbb{N}$$

Lemma (8.0.3) nojalla seuraa $Y^{(N)}$ on $(\mathcal{B}([a, b]) \otimes \mathcal{F})$ -mitallinen, ja jatkuvuudesta seuraa

$$\lim_{N \uparrow \infty} Y^{(N)}(t, \omega) = Y(t, \omega) \quad \forall \omega,$$

siksi $Y(t, \omega)$ on myös $(\mathcal{B}([a, b]) \otimes \mathcal{F})$ -mitallinen.

Koska $\lim_{s \rightarrow t} Y_s(\omega) = Y_t(\omega)$ ja tasaisen integroituvuuden oletuksesta, seuraa

$$|E_P(Y_t) - E_P(Y_s)| \leq E_P|Y_t - Y_s| \rightarrow 0 \quad \text{kun } s \rightarrow t.$$

Koska $\{Y_t : t \in [a, b]\}$ on tasaisesti integroitava (koska löytyy integroitava yläraja). Siitä seuraa

$$\sup_{t \in [a, b]} E_P(|Y_t|) < \infty$$

ja siksi $|Y(t, \omega)| \in L^1([a, b] \times \Omega, \mathcal{B}([a, b]) \otimes \mathcal{F}, dt \otimes P(d\omega))$. Fubinin lause soveltuu

$$E_P(X_t) = E_P\left(\int_a^t Y(s) ds\right) = \int_{[a, b] \times \Omega} Y(s, \omega) (P(d\omega) \otimes ds) = \int_a^t E_P(Y(s)) ds$$

ja koska kuvaus $t \mapsto E_P(Y(t))$ on jatkuva, analyysin keskiarvon lauseesta

$$\begin{aligned} & \lim_{\Delta \rightarrow 0} \Delta^{-1} \{E_P(X_{t+\Delta}) - E_P(X_t)\} \\ &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \Delta^{-1} \int_t^{t+\Delta} E_P(Y(s)) ds = E_P(Y(t)) \quad \square \end{aligned}$$

Esimerkki 8.0.2. Olkoon satunnaismuuttuja $X(\omega) \in \mathbb{R}$, ja $a < 0 < b$ jolla

$$m_X(t) := E_P(\exp(tX)) < \infty, \quad \forall t \in [a, b].$$

Olkoon $a < -\varepsilon < 0 < \varepsilon < b$, ja x' yhtälön $x'/\log(x') = (b - \varepsilon)$ ratkaisu.

Koska $x \exp(\varepsilon x) \leq \exp(bx)$ kun $x \geq x'$, seuraa

$$E_P(X^+ \exp(\varepsilon X)) \leq x' \exp(\varepsilon x') + E_P(\exp(bX)) < \infty$$

Vastaavasti, kun $x''/\log(x'') = -(a + \varepsilon)$, koska $x \exp(\varepsilon x) \leq \exp(-ax)$ kun $x \geq x''$, seuraa

$$E_P(X^- \exp(-\varepsilon X)) \leq x'' \exp(\varepsilon x'') + E_P(\exp(-aX)) < +\infty .$$

Tästä seuraa

$$|X(\omega)| \exp(tX(\omega)) \leq |X(\omega)| \left\{ \exp(\varepsilon X(\omega)) + \exp(-\varepsilon X(\omega)) \right\} \in L^1(P) \quad \forall t \in [-\varepsilon, \varepsilon]$$

ja kokoelma

$$\left\{ X(\omega) \exp(tX(\omega)) : t \in [-\varepsilon, \varepsilon] \right\} \subseteq L^1(P)$$

on tasaisesti integroitava ,

$$\frac{d}{dt} m_X(t) = E_P \left(\frac{d}{dt} \exp(tX) \right) = E_P(X \exp(tX)) \quad \forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon).$$

Erityisesti pisteessä $t = 0$

$$\frac{d}{dt} m_X(0) = E_P(X) .$$

Koska eskponentiaali funktio kasvaa polynoomien nopeammin, $\forall n \in \mathbb{N}$, samoin seuraa satunnaismuuttujien joukon

$$\left\{ X^n(\omega) \exp(tX(\omega)) : t \in [-\varepsilon, \varepsilon] \right\} \subseteq L^1(P)$$

tasainen integroitavuus, ja

$$\frac{d^n}{dt^n} m_X(t) = E_P \left(\frac{d^n}{dt^n} \exp(tX) \right) = E_P(X^n \exp(tX)), \quad \forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon).$$

Erityisesti pisteessä $t = 0$

$$\frac{d^n m_X}{dt^n}(0) = E_P(X^n) .$$

Kuvaus $m_X(t) = E_P(\exp(tX))$ kutsutaan momentti-generoivaksi funktioksi.

Esimerkki 8.0.3. (Esscherin muunnos)

Olkoon $\Theta = \{m_X(t) = E_P(\exp(tX)) < \infty\}$. Kun $t \in \Theta$ määritellään mitanvaihtokaavan kautta todennäköisyyksimitta

$$P^{(t)}(A) = \frac{E_P(\exp(tX)\mathbf{1}_A)}{m_X(t)}, \quad \forall A \in \mathcal{F}.$$

Kun on olemassa $\varepsilon > 0$ jolle $[t - \varepsilon, t + \varepsilon] \subseteq \Theta$, seuraa

$$E_{P^{(t)}}(X^n) = \frac{E_P(X^n \exp(tX))}{m_X(t)} = \frac{1}{m_X(t)} \frac{d^n m_X}{dx^n}(t), \text{ erityisesti}$$

$$E_{P^{(t)}}(X) = \frac{d}{dt} \log(m_X(t))$$

Tod. Kuten tapauksessa $t = 0$.

Luku 9

$L^p(\Omega)$ avaruudet

9.0.1 Epäyhtälöt

Määritelmä 9.0.1. Olkoon V vektoriavaruus, esimerkiksi $V = \mathbb{R}^d$. Kuvaus $g : V \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ on konvekksi kun

$$g(px + (1-p)y) \leq pg(x) + (1-p)g(y) \quad \forall x, y \in V, p \in [0, 1]$$

Lause 9.0.1. Kuvaus $g : V \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ jos ja vain jos

$$\text{epi}(g) = \{ (x, r) \in V \times \mathbb{R} : r \geq g(x) \}$$

on konvekssi joukko, eli kun (x, r) ja $(x', r') \in \text{epi}(g)$, myös pisteiden konvekssi-kombinaatiolle pätee

$$(x, r)p + (x', r')(1-p) = (xp + x'(1-p), rp + r'(1-p)) \in \text{epi}(g), \quad \forall p \in [0, 1]$$

Lause 9.0.2. Olkoon $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ konvekssi funktio. Silloin g on jatkuva, ja jokaisessa pisteessä on olemassa derivaatat oikealta ja vasemmalta

$$\nabla g^-(t) = \lim_{r \uparrow t} \frac{g(r) - g(t)}{r - t} \leq \nabla g^+(t) = \lim_{r \downarrow t} \frac{g(r) - g(t)}{r - t}$$

ja $\nabla g^\pm(s) \leq \nabla g^\pm(t)$ kun $s \leq t$.

Tod. kun $t \leq s \leq r$,

$$\frac{g(s) - g(t)}{s - t} \leq \frac{g(r) - g(t)}{r - t}$$

koska kun $p = (r - s)/(r - t) \in [0, 1]$, $s = pt + (1 - p)r$, konveksisuudesta

$$g(s) - g(r) \leq (g(t) - g(r)) p$$

Tästä seuraa että jokaiselle t , jono

$$(g(t + n^{-1}) - g(t))n \quad n \in \mathbb{N}$$

ei kasva ja siksi monotoninen raja on olemassa. Koska oikea ja vasen derivaatat $\nabla^\pm g(t)$ ovat olemassa, $g(t)$ on jatkuva jokaisessa $t \in \mathbb{R}$. Konveksisuudesta seuraa myös

$$\frac{g(s) - g(t)}{s - t} \leq \frac{g(r) - g(s)}{r - s}$$

kun $t \leq s \leq r$, siksi $\nabla^+ g(t) \leq \nabla^- g(r)$ kun $t < r$ \square

Huomautus 9.0.1. Koska derivaatat ovat ei-väheneviä,

1. Joukko

$$D := \left\{ t : \nabla^+ g(t) > \nabla^- g(t) \right\}$$

on korkeintaan numeroituva.

2. jokaiselle $t \in \mathbb{R}$, $\delta \in [\nabla^- g(t), \nabla^+ g(t)]$

$$g(s) = g(t) + \int_t^s \nabla^\pm g(r) dr \geq g(t) + (s - t)\delta \quad \forall s$$

Seuraa myös että $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ on konvekksi jos ja vain jos on absoluuttisesti jatkuva Lebesgue mitan suhteen ja Radon-Nikodymin-derivaatta $\frac{dg}{dx}(x)$ on ei-vähenevä.

Lause 9.0.3. (Jensenin epäyhtälö) Olkoon $X(\omega) \in \mathbb{R}$ satunnaismuuttuja jolla $E_P(|X|) < \infty$ ja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ konveksikuvaus. Silloin

$$g(E_P(X)) \leq E_P(g(X))$$

R. Koska g on konvekksi, sen oikea ja vasen derivaatat pisteessä $\mu = E_P(X)$ ovat olemassa. Kaikille $\delta \in [\nabla^- g(\mu), \nabla^+ g(\mu)]$

$$g(X(\omega)) \geq g(E_P(X)) + \delta\{X(\omega) - E_P(X(\omega))\}$$

ja väite seuraa ottaamalla odotusarvon \square

Huomautus Huomataan että Jensenin epäyhtälö on voimassa myös silloin kun integroidaan positiivisen mitan $\nu(dx)$ suhteen vaikka olisi $\nu(\mathbb{R}) = +\infty$. Siis kun g on konvekksi,

$$\int_{\mathbb{R}} |x| \nu(dx) < \infty \implies g\left(\int_{\mathbb{R}} x \nu(dx)\right) \leq \int_{\mathbb{R}} g(x) \nu(dx)$$

mutta on mahdollista että

$$\int_{\mathbb{R}} |x| \nu(dx) = \infty \text{ ja } \int_{\mathbb{R}} |g(x)| \nu(dx) < \infty$$

Lemma 9.0.1. Kun $1 \leq p < r$, $L^p(\Omega, \mathcal{F}, P) \supseteq L^r(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Tod. Olkoon $X \in L^r(P)$.

Kun $r = \infty$, $|X(\omega)|^p \leq \|X\|_{\infty}^p$ P -melkein varmasti ja väite seuraa.

Kun $r < \infty$, olkoon

$$Y_n(\omega) = n \wedge |X(\omega)|^p \in L^{r/p}(P) .$$

Koska $0 \leq Y_n(\omega) \leq n$ seuraa $Y_n(\omega) \in L^1(P)$.

Kuvaus $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ jolla $x \mapsto g(x) = x^{r/p}$ on konvekksi. Jensenin epäyhtälöstä seuraa:

$$E_P(Y_n^{r/p}) \geq E_P(Y_n)^{r/p}$$

Monotonisen konvergenssi lauseesta, koska $0 \leq Y_n(\omega) \uparrow |X(\omega)|^p \forall \omega$ seuraa

$$E_P(|X|^r) \geq E_P(|X|^p)^{r/p}.$$

Emme olisi voineet soveltaa Jensenin epäyhtälöä suoraan satunnaismuuttujalle $|X(\omega)|^p$ koska apriori oli epäselvää kuuluuko $L^{r/p}(P)$ avaruuteen. Siksi käytettiin kätkeytyä muuttuja $\{Y_n\}$ \square

Huomautus 9.0.2. Tässä on olennaista että P on todennäköisyysmitta tai äärellinen mitta, koska silloin kun $\nu(\Omega) = \infty$ $L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \nu) \not\subseteq L^1(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$, ja pelkästään kätkeisemällä ei saadan integroituvia satunnaismuuttujia.

Väite ei päde $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$ avaruuksille silloin kun $\nu(\Omega) = \infty$.

Kun $\nu(\Omega) < \infty$ määritellään $P(A) = \nu(A)/\nu(\Omega)$ josta seuraa

$$\left\{ \int_{\Omega} |X(\omega)|^p \nu(d\omega) \right\}^{1/p} \leq \nu(\Omega)^{(r-p)/(rp)} \left\{ \int_{\Omega} |X(\omega)|^r \nu(d\omega) \right\}^{1/r}$$

siis $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \nu) \supseteq L^r(\Omega, \mathcal{F}, \nu)$ myös tässä tapauksessa. Tämä epäyhtälö ei kerro meille mitään kun $\nu(\Omega) = \infty$.

Lause 9.0.4. (Cauchy Schwartzin epäyhtälö , $p = 2$)

Olkoon $X(\omega), Y(\omega) \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ silloin

1. tulo $(X(\omega)Y(\omega)) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ja

$$\| XY \|_1 = E_P(|XY|) \leq \sqrt{E_P(X^2)} \sqrt{E_P(Y^2)} = \| X \|_2 \| Y \|_2$$

jossa yhtäsuuruisuus on voimassa jos ja vain jos $Y(\omega) = cX(\omega)$ P m.v. jollekin $c \in \mathbb{R}$. Kun $E_P(XY) = 0$ sanomme että satunnaismuuttujat ovat ortogonaaliisia.

2. Kolmion epäyhtälö on voimassa:

$$\| X + Y \|_2 \leq \| X \|_2 + \| Y \|_2$$

1. Tod. Olkoon

$$X_n(\omega) = n \wedge |X(\omega)|, \quad Y_n(\omega) = n \wedge |Y(\omega)|$$

koska $0 \leq X_n(\omega), Y_n(\omega) \leq n \forall \omega$, seuraa $(X_n(\omega)Y_n(\omega)) \in L^1(P)$.

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad 0 \leq \left(tX_n(\omega) + Y_n(\omega) \right)^2 = t^2 X_n(\omega)^2 + Y_n(\omega)^2 + 2tX_n(\omega)Y_n(\omega)$$

Ottaamalla odotusarvoa (joka on olemassa ainakin katkaistetuille satunnaismuuttujille), seuraa että toisen asteen yhtälöllä

$$t^2 E_P(X_n)^2 + 2t E_P(X_n Y_n) + E(Y_n^2) = 0$$

on korkeintaan yksi reaaliratkaisu, josta seuraa

$$E_P(X_n Y_n)^2 - E(X_n^2)E(Y_n^2) \leq 0$$

Koska

$$0 \leq |X_n(\omega)Y_n(\omega)| \uparrow |X(\omega)Y(\omega)| \quad \forall \omega$$

seuraa monotonisen konvergenssin lauseesta

$$E_P(|XY|)^2 - E(X^2)E(Y^2) \leq 0$$

2. Tod.

$$\begin{aligned} E_P((X+Y)^2) &= E_P(X^2) + E_P(Y^2) + 2E_P(XY) \\ &\leq E_P(X^2) + E_P(Y^2) + 2E_P(|XY|) \\ &\leq E_P(X^2) + E_P(Y^2) + 2\sqrt{E_P(X^2)}\sqrt{E_P(Y^2)} = \left\{ \sqrt{E_P(X^2)} + \sqrt{E_P(Y^2)} \right\}^2 \quad \square \end{aligned}$$

Lause 9.0.5. Seuraavat identiteetit ovat voimassa $L^2(P)$ avaruudessa:

$$1. \text{ Kun } X, Y \in L^2(P), \quad \|X+Y\|_2^2 + \|X-Y\|_2^2 = 2\|X\|_2^2 + 2\|Y\|_2^2$$

(Suunnikkaan identiteetti)

$$2. E_P(XY) = \frac{1}{4}(\|X+Y\|_2^2 - \|X-Y\|_2^2) \quad (\text{Polarisaation identiteetti})$$

Todistus: harjoitustehtävä.

Huomautus Voidaan myös osoittaa että kun normi $\|x\|$ toteuttaa suunnikkaan identiteetti, on olemassa skalaari tulo (x, y) jolla $\|x\|^2 = (x, x)$.

Jensenin epäyhtälön avulla Cauchy-Schwarz epäyhtälö yleistyy $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ avaruuksiin, jossa $1 < p < \infty$ ja μ on yleinen positiivinen mitta.

Huomataan myös että kun $X \in L^1(\mu), Y \in L^\infty(\mu)$, koska

$$|X(\omega)Y(\omega)| \leq |X(\omega)| \|Y\|_\infty$$

seuraa suoraan että tulo $(XY) \in L^1(\mu)$.

Lause 9.0.6. Olkoon $X \in L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ ja $Y \in L^q(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, $1 \leq p < \infty$
jossa $q = p/(p-1)$ on konjugattiekspONENTTI joka toteuttaa $(q^{-1} + p^{-1}) = 1$.
Silloin

$$\int_{\Omega} |X(\omega)Y(\omega)|\mu(d\omega) \leq \left\{ \int_{\Omega} |X(\omega)|^p \mu(d\omega) \right\}^{1/p} \left\{ \int_{\Omega} |X(\omega)|^q \mu(d\omega) \right\}^{1/q}$$

$$= \|X\|_{L^p(\mu)} \|Y\|_{L^p(\mu)}$$

(Hölderin epäyhtälö).

Kun $X, Y \in L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, $1 \leq p \leq \infty$

$$\|X + Y\|_{L^p(\mu)} \leq \|X\|_{L^p(\mu)} + \|Y\|_{L^p(\mu)}$$

(Minkowskin epäyhtälö).

Tod. (Hölder) Olkoon $1 < p < \infty$. Tietenkin voidaan olettaa $X(\omega) \geq 0$
 $Y(\omega) \geq 0$ ja $E_P(|X|^p) > 0$, muuten $X(\omega) = 0$ P -m.v. ja epäyhtälö seuraa.

Määritellään satunnaismuuttuja

$$\tilde{Y}(\omega) := \frac{Y(\omega)}{X(\omega)^{p-1}} \mathbf{1}(X(\omega) > 0) \geq 0$$

ja todennäköisyysmitta

$$\tilde{P}(d\omega) = \frac{X(\omega)^p}{\|X\|_{L^p(\mu)}^p} \mu(d\omega)$$

Jensenin epäyhtälöstä

$$\{E_{\tilde{P}}(\tilde{Y})\}^q \leq E_{\tilde{P}}(\tilde{Y}^q)$$

kaikille $q \geq 1$ erityisesti kun $q = p/(p-1)$

$$\left\{ \int_{\Omega} \frac{Y(\omega)}{X(\omega)^{p-1}} \mathbf{1}(X(\omega) > 0) \frac{X(\omega)^p}{\|X\|_{L^p(\mu)}^p} \mu(d\omega) \right\}^q$$

$$\leq \int_{\Omega} \left\{ \frac{Y(\omega)}{X(\omega)^{p-1}} \mathbf{1}(X(\omega) > 0) \right\}^q \frac{X(\omega)^p}{\|X\|_{L^p(\mu)}^p} \mu(d\omega) \iff$$

$$\|X\|_{L^p(\mu)}^{-pq} \left\{ \int_{\Omega} Y(\omega)X(\omega) \mu(d\omega) \right\}^q \leq \|X\|_{L^p(\mu)}^{-p} \int_{\Omega} Y(\omega)^q X(\omega)^{(q(p-1)-p)} \mu(d\omega)$$

jossa $q(p-1) - p = 0$. Seuraa

$$\int_{\Omega} Y(\omega)X(\omega)\mu(d\omega) \leq \left\{ \int_{\Omega} Y(\omega)^q \mu(d\omega) \right\}^{1/q} \|X\|_{L^p(\mu)}^{(1-1/q)p}$$

jossa $(1 - 1/q)p = 1$.

Tod. (Minkowski) Huomataan ensin että $\forall x, y \geq 0$,

$$(x + y)^p \leq (2 \max(x, y))^p \leq 2^p(x^p + y^p),$$

siksi kun $X, Y \in L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, myös $(X + Y) \in L^p(\mu)$. Seuraa Hölderin epäyhtälöstä

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |X + Y|^p d\mu &\leq \int_{\Omega} |X| |X + Y|^{p-1} d\mu + \int_{\Omega} |Y| |X + Y|^{p-1} d\mu \\ &\leq (\|X\|_{L^p(\mu)} + \|Y\|_{L^p(\mu)}) \| |X + Y|^{p-1} \|_{L^q(\mu)} \\ &= (\|X\|_{L^p(\mu)} + \|Y\|_{L^p(\mu)}) (\|X + Y\|_{L^p(\mu)})^{p/q} \end{aligned}$$

Tästä seuraa

$$\|X + Y\|_{L^p(\mu)}^{(1-1/q)p} \leq \|X\|_{L^p(\mu)} + \|Y\|_{L^p(\mu)}$$

jossa $(1 - 1/q)p = 1$ \square

Lause 9.0.7. $\forall 1 \leq p \leq \infty$, $L^p(\Omega, \mathcal{F}, P)$ on **täydellinen** :

jos $\{X_n(\omega)\} \in L^p(\Omega, \mathcal{F}, P)$ on Cauchy jono,

eli $\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon$ jolle $\|X_n - X_m\|_{L^p(P)} < \varepsilon$ kun $n, m \geq N_\varepsilon$,

on olemassa $X_\infty(\omega) \in L^p(P)$ jolle $\lim_{n \uparrow \infty} \|X_n - X\|_{L^p(P)}$.

Tämä lause ja sen todistus pätevät myös silloin kun integroidaan positiivisen mitan $\mu(d\omega)$:n suhteen, jolla $\mu(\Omega) = +\infty$.

Tod. Tapaus jossa $p = \infty$ jää harjoitustehtäväksi.

Olkoon $p < \infty$ ja $\{X_n\} \subseteq L^p$ Cauchy jono. On olemassa jono (k_n) jolla

$$\|X_r - X_s\|_p \leq 2^{-n} \quad \forall r, s \geq k_n$$

Koska jono $(X_n - X_{k_0} : n \geq k_0)$ on myös Cauchy jono, voidaan unohtaa jonon alkuosaa ja olettaa $X_0(\omega) = 0$ ja $k_0 = 0$. Saadaan teleskooppinen esitys

$$X_{k_n}(\omega) = \sum_{m=1}^n (X_{k_m}(\omega) - X_{k_{m-1}}(\omega)).$$

Jokaiselle $\omega \in \Omega$, rakennetaan monotoninen jono

$$Y_n(\omega) := \sum_{m=1}^n |X_{k_m}(\omega) - X_{k_{m-1}}(\omega)| \uparrow Y_\infty(\omega) = \sum_{m=1}^{\infty} |X_{k_m}(\omega) - X_{k_{m-1}}(\omega)| \in [0, \infty]$$

Minkowskin epäyhtälöstä (9.0.1)

$$\|Y_n\|_{L^p} \leq \sum_{m=1}^n \|X_{k_m}(\omega) - X_{k_{m-1}}(\omega)\|_{L^p}$$

ja monotonisen konvergenssin lauseesta

$$\|Y_\infty\|_{L^p} \leq \sum_{m=1}^{\infty} \|X_{k_m}(\omega) - X_{k_{m-1}}(\omega)\|_{L^p} \leq \sum_{m=0}^{\infty} 2^{-m} = 2 < \infty$$

Tästä seuraa että P -melkein varmasti

$$Y_\infty(\omega) = \sum_{m=1}^{\infty} |X_{k_m}(\omega) - X_{k_{m-1}}(\omega)| < \infty,$$

josta seuraa että P -melkein varmasti sarjan

$$X_\infty(\omega) = \sum_{m=1}^{\infty} (X_{k_m}(\omega) - X_{k_{m-1}}(\omega))$$

suppenee absoluuttisesti. Jotta $X_\infty(\omega)$ olisi määritelty kaikille ω :lle, olkoon

$$X_\infty(\omega) := \limsup_{n \rightarrow \infty} X_{k_n}(\omega), \quad \forall \omega \in \Omega$$

Seuraa että $X(\omega)$ on satunnaismuuttuja ja $X_{k_n}(\omega) \rightarrow X(\omega)$ P -melkein varmasti. Kun $r > k_n$ ja $\forall m > n$

$$E_P(|X_r - X_{k_m}|^p) \leq 2^{-np} \quad \implies$$

$$E_P(|X_r - X_\infty|^p) = E_P(\liminf_m |X_r - X_{k_m}|^p) \leq \liminf_m E_P(|X_r - X_{k_m}|^p) \leq 2^{-np}$$

jossa käytettiin Fatoun lemma. Minkowskin epäyhtälöstä seuraa $X_\infty \in L^p$, ja $X_r \xrightarrow{L^p} X_\infty$ kun $r \rightarrow \infty$ \square

9.1 Projektio $L^2(P)$ avaruudessa

Lause 9.1.1. Olkoon $H \subseteq L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ aliavaruus joka on **suljettu**, eli jos $\{X_n\} \subseteq H$ ja on olemassa $X \in L^2(P)$ jolla $\|X_n - X\|_{L^2(P)} \rightarrow 0$, siitä seuraa $X \in H$.

Kaikille $X(\omega) \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ on olemassa ortogonaalinen projektio H -aliavaruuteen $Y(\omega) = (\Pi_H X)(\omega) \in H$ jolla

1. $E_P((X - Y)^2) = \Delta^2 := \inf_{W \in H} E_P((X - W)^2)$,
2. $E_P((X - Y)W) = 0, \forall W \in H$.

Projektio Y on P -melkein varmasti yksikäsitteinen.

Huomautus 9.1.1. Muistetaan että Eukliidisessä avaruudessa \mathbb{R}^d on määritelty vektoreiden skalaari tulo

$$\langle X, Y \rangle_{\mathbb{R}^d} = \sum_{\omega=1}^d X(\omega)Y(\omega) = d \cdot \sum_{\omega=1}^d X(\omega)Y(\omega)P(\{\omega\}) = E_P(XY)d$$

jossa $P(\omega) = 1/d$ on tasainen todennäköisyys äärellisessä avaruudessa $\Omega = \{1, \dots, d\}$. Sanomme että vektorit $X, Y \in \mathbb{R}^d$ ovat kohtisuoria (merkintä $X \perp_{\mathbb{R}^d} Y$), kun $\langle X, Y \rangle_{\mathbb{R}^d} = 0$. Tämä geometrinen käsite yleistyy varustamalla $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ skalaaritulolla

$$\langle X, Y \rangle_{L^2(P)} = E_P(XY) = \int_{\Omega} X(\omega)Y(\omega)P(d\omega)$$

ja tulkitaan satunnaismuuttuja $(X(\omega) : \omega \in \Omega)$ ääretönulotteisenä vektorina. Satunnais-muuttujat $X, Y \in L^2(P)$ ovat kohtisuoria (merkintä $X \perp_P Y$), kun $E_P(XY) = 0$.

Tod. Koska $0 \in H$, $\Delta^2 \leq E_P(X^2) < \infty$,

ja on olemassa jono $(Y_n : n \in \mathbb{N}) \subseteq H$ jolla $\|X - Y_n\|_2 \rightarrow \Delta$.

Olkoon $\varepsilon > 0$ ja \bar{n} jolla kun $n \geq \bar{n}$

$$\Delta^2 \leq E_P((X - Y_n)^2) < \Delta^2 + \varepsilon.$$

Kun sovelletaan suunnikkaan identiteetti vektoreille

$(Y_n - Y_m)/2$ ja $(X - (Y_n + Y_m)/2)$, seuraa

$$2 \| (Y_m - Y_n)/2 \|_2^2 = \| X - Y_m \|_2^2 + \| X - Y_n \|_2^2 - 2 \| X - (Y_m + Y_n)/2 \|_2^2.$$

Koska $(Y_n + Y_m)/2 \in H$,

$$\| X - (Y_n + Y_m)/2 \|_2^2 \geq \Delta^2,$$

ja kun $n, m \geq \bar{n}$ seuraa

$$2 \| (Y_m - Y_n)/2 \|_2^2 \leq 2\varepsilon.$$

Siksi $(Y_n) \subseteq H$ on Cauchy jono $L^2(P)$:ssa, ja $L^2(P)$ täydellisyydestä seuraa että on olemassa $Y \in L^2(P)$ jolla $Y_n \xrightarrow{L^2} Y$, ja koska H on suljettu aliavaruus seuraa $Y \in H$. Kun $W \in H \setminus \{0\}$ ja $t \in \mathbb{R}$, $(Y + tW) \in H$, ja $\forall t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \| X - Y \|_2^2 &\leq \| X - Y - tW \|_2^2 = \| X - Y \|_2^2 + t^2 \| W \|_2^2 - 2tE_P((X - Y)W) \\ &\iff t^2 \| W \|_2^2 \geq 2tE_P((X - Y)W) \quad \forall t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

josta seuraa $E_P((X - Y)W) = 0$. Jos $\tilde{Y}(\omega) \in H$ on myös projektio, ottamalla $W = (Y - \tilde{Y}) \in H$,

$$0 = E_P(XW) - E_P(XW) = E_P(YW) - E_P(\tilde{Y}W) = E_P((Y - \tilde{Y})W) = E_P((Y - \tilde{Y})^2)$$

josta seuraa $Y(\omega) = \tilde{Y}(\omega)$ P -m.v. \square

Lemma 9.1.1. L^2 -projektio on lineaarinen operaattori: kun $X, Z \in L^2(P)$, $a, b \in \mathbb{R}$ ja H on suljettu aliavaruus,

$$\Pi_H(aX + bZ) = a\Pi_H X + b\Pi_H Z,$$

Todistus: harjoitustehtävä.

Esimerkki 9.1.1. (Projektio satunnaismuuttujan virittämään lineaariseen aliavaruuteen): Olkoon olkoon $Y(\omega) \in L^2(P)$ jolla $E_P(Y^2) > 0$, ja

$$H = \{ aY(\omega) + b : a, b \in \mathbb{R} \} \subseteq L^2(P).$$

Koska

$$H = \{ a(Y(\omega) - E(Y)) + b : a, b \in \mathbb{R} \}$$

$Y(\omega)$ ja $(Y(\omega) - E_P(Y))$ virittävät saman lineaarisen aliavaruuden. Siksi voidaan olettaa $E_P(Y) = 0$.

Osoitan että H on suljettu: olkoon $X_n(\omega) = (a_n Y(\omega) + b_n) \in H$ jossa $(a_n), (b_n) \subseteq \mathbb{R}$, jolla

$$E_P((X_n - X)^2) = E_P((a_n Y + b_n - X)^2) \rightarrow 0$$

Silloin (X_n) on Cauchy jono $L^2(P)$:ssa, josta seuraa

$$E_P(Y^2)(a_n - a_m)^2 + (b_n - b_m)^2 \rightarrow 0$$

kun $n, m \rightarrow \infty$, ja koska $E_P(Y^2) > 0$, (a_n) ja (b_n) ovat Cauchy jonoja \mathbb{R} :ssa. Koska \mathbb{R} on täydellinen, on olemassa $a, b \in \mathbb{R}$ jolla $a_n \rightarrow a$ ja $b_n \rightarrow b$. Tästä seuraa $(a_n Y + b_n) \rightarrow (aY + b)$ $L^2(P)$ -normissa, ja $X(\omega) = (aY(\omega) + b)$ P -melkein varmasti, eli $X \in H$. Esitämme X :n projektio aliavaruuteen H : mimoidaan yli $a, b \in \mathbb{R}$

$$E_P\left(\{aY + b - X\}^2\right) = E(X^2) + a^2 E(Y^2) + b^2 + 2abE(Y) - 2aE(XY) - 2bE(X).$$

Koska oletetusti $E(Y) = 0$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial a} E_P\left(\{aY + b - X\}^2\right) &= 2aE(Y^2) - 2E(XY) \\ \frac{\partial}{\partial b} E_P\left(\{aY + b - X\}^2\right) &= 2b - 2E(X) \end{aligned}$$

josta seuraa $b = E(X)$, $a = E(Y^2)/E(XY)$. Siis kun $E(Y) = 0$, X :n projektio Y :n virittämään aliavaruuteen H :n on

$$\Pi_H(X) = E_P(X) + \frac{E(XY)}{E(Y^2)} Y$$

Yleisemmin

$$\Pi_H(X) = E(X) + \frac{\text{Cov}(XY)}{\text{Var}(Y^2)} (Y - E(Y))$$

Luku 10

Ehdollinen odotusarvo

Olkoon $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ ali- σ -algebra.

Silloin $L^p(\Omega, \mathcal{G}, P) \subseteq L^p(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\forall 0 \leq p \leq \infty$, ja kun $p > 0$, $L^p(\Omega, \mathcal{G}, P)$ on suljettu aliavaruus.

Tod. Olkoon $\{X_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq L^p(\Omega, \mathcal{G}, P)$ ja $X \in L^p(\Omega, \mathcal{F}, P)$ joilla $E_P(|X_n - X|^p) \rightarrow 0$. Seuraa että $X \implies X_n \xrightarrow{P} X$ ja on olemassa alijono jolla $\{n_k\} : X_{n_k}(\omega) \rightarrow X(\omega)$ P m.v. . Olkoon $\tilde{X}(\omega) := \liminf_k X_{n_k}(\omega) \in L^p(\Omega, \mathcal{G}, P)$. Seuraa että $X_n \xrightarrow{L^p} \tilde{X}$ ja siksi $X(\omega) = \tilde{X}(\omega)$ P -m.v.

Kun $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ja $H = L^2(\Omega, \mathcal{G}, P)$ seuraa projektio lauseesta (9.1.1) että on olemassa ortogonaalinen projektio

$$Y(\omega) = E_P(X|\mathcal{G})(\omega) := (\Pi_{L^2(\Omega, \mathcal{G}, P)} X)(\omega)$$

joka kutsutaan *ehdolliseksi odotusarvoksi* jolla

- $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, P)$
- $E_P(XW) = E_P(YW) \quad \forall W \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, P)$

Lemma 10.0.1. *Ehdollinen odotusarvo on positiivinen operaattori:*

Olkoon $0 \leq X(\omega) \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ ali- σ -algebra. Silloin

$$Y(\omega) = E_P(X|\mathcal{G})(\omega) \geq 0 \quad P\text{-m.v.}$$

Tod. Koska $L^\infty(P) \subseteq L^2(P)$ ehdollinen odotusarvo $Y(\omega)$ on olemassa L^2 -projektiona. Olkoon $A = \{\omega : Y(\omega) < 0\} \in \mathcal{G}$. Koska $\mathbf{1}_A(\omega) \in L^\infty(P) \subseteq L^2(P)$,

$$0 \leq E_P(X\mathbf{1}_A) = E_P(Y\mathbf{1}_A) = E_P(Y\mathbf{1}_{(Y < 0)}) = -E_P(Y^-) \leq 0$$

ja väite seuraa.

Ehdollisen odotusarvon määritelmä laajennetaan $L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ avaruuteen:

Teoreema 10.0.1. (Kolmogorovin määritelmä) Kun $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, ja $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ on ali- σ -algebra, on olemassa ehdollinen odotusarvo $Y(\omega) = E_P(X|\mathcal{G})(\omega) \in L^1(\Omega, \mathcal{G}, P)$ jolla $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{G}, P)$ ja

$$E_P(X\mathbf{1}_A) = E_P(Y\mathbf{1}_A) \quad \forall A \in \mathcal{G}$$

Ehdollinen odotusarvo on P -m.v. yksikäsitteinen.

Tod. Voidaan olettaa että $X(\omega) \geq 0 \forall \omega$, muuten käytämme ensin hajotelmaa $X(\omega) = X(\omega)^+ - X(\omega)^-$ ja sitten määrittelemme

$$E_P(X^+|\mathcal{G})(\omega) = E_P(X^+|\mathcal{G})(\omega) - E_P(X^-|\mathcal{G})(\omega)$$

Olkoon $0 \leq X_n(\omega) = X(\omega) \wedge n \uparrow X(\omega)$ kun $n \uparrow \infty$. Koska $X_n \in L^\infty$ seuraa että $X_n \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ja projektio lauseesta seuraa että on olemassa $Y_n \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, P)$ jolla

$$E_P(X_n\mathbf{1}_A) = E_P(Y_n\mathbf{1}_A) \quad \forall A \in \mathcal{G}$$

Seuraa lemmasta (10.0.1) että $Y_n(\omega) \geq 0$ P -melkein varmasti.

Kun $n \geq m$ $(X_n(\omega) - X_m(\omega)) \geq 0$ josta seuraa

$$(Y_n(\omega) - Y_m(\omega)) = E_P(X_n|\mathcal{G})(\omega) - E_P(X_m|\mathcal{G})(\omega) = E_P(X_n - X_m|\mathcal{G})(\omega) \geq 0 \quad P\text{-m.v.}$$

Olkoon $Y(\omega) = \limsup_n Y_n(\omega)$. Seuraa että $Y_n(\omega) \uparrow Y(\omega)$ P -m.v. ja monotonisen konvergenssin lauseesta, $\forall A \in \mathcal{G}$

$$E_P(X\mathbf{1}_A) = \lim_{n \uparrow \infty} E_P(X_n\mathbf{1}_A) = \lim_{n \uparrow \infty} E_P(Y_n\mathbf{1}_A) = E_P(Y\mathbf{1}_A)$$

Jos $\tilde{Y}(\omega) \in L^1(\Omega, \mathcal{G}, P)$ toteuttaa Kolmogorovin määritelmää, koska $A = \{\omega : Y(\omega) > \tilde{Y}(\omega)\} \in \mathcal{G}$,

$$0 \leq E_P((Y - \tilde{Y})\mathbf{1}_A) = E_P(X\mathbf{1}_A) - E_P(X\mathbf{1}_A) = 0$$

seuraa että $Y(\omega) \leq \tilde{Y}(\omega)$ P -m.v., samoin seuraa että $Y(\omega) \geq \tilde{Y}(\omega)$ ja siksi $Y(\omega) = \tilde{Y}(\omega)$ P -m.v.

Tehtävä 10.0.1. Osoita että (10.0.1) pätee jos ja vain jos

$$E_P(XW) = E_P(YW) \quad \forall W \in L^\infty(\Omega, \mathcal{G}, P)$$

Tehtävä 10.0.2. Olkoon $\mathcal{G} = \sigma(A_1, \dots, A_n) \subseteq \mathcal{F}$ äärellisesti generoitu ali σ -algebra, jossa $\{A_1, \dots, A_n\}$ on Ω :n \mathcal{F} -mitallinen ositus, $A_i \in \mathcal{F}$, $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$, $A_i \cap A_j = \emptyset$ kun $i \neq j$.

Olkoon $X(\omega) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Silloin

$$E_P(X|\mathcal{G})(\omega) = \sum_{i=1}^n \frac{E_P(X\mathbf{1}_{A_i})}{P(A_i)} \mathbf{1}_{A_i}(\omega) := \sum_{i=1}^n E_P(X|A_i)\mathbf{1}_{A_i}(\omega) \quad (10.0.1)$$

jossa $E_P(X|A) = E_P(X\mathbf{1}_A)/P(A)$ on elementaarinen ehdollinen odotusarvo, joka saa mielivaltaisen arvo (esimerkiksi 0) silloin kun $P(A) = 0$. Osoita että (10.0.1) toteuttaa Kolmogorovin ehdollisen odotusarvon määritelmän.

Huom: Kolmogorovin ehdollinen odotusarvo σ -algebran ehdolla $E_P(X|\mathcal{G})(\omega)$ on satunnaismuuttuja, kun elementaarinen odotusarvo tapahtuman ehdolla $E_P(X|A)$ on vakio joka on hyvin määritelty vain silloin kun $P(A) > 0$.

10.1 Ehdollinen odotusarvo Radon-Nykodim derivaattana

Olkoon $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ Määritellään merkkinen mitta

$$\mu_X(A) = E_P(X\mathbf{1}_A) \quad \forall A \in \mathcal{F}$$

Huomataan että $\mu_X(A) = 0$ silloin kun $A \in \mathcal{F}$ ja $P(A) = 0$, eli $\mu \ll P$ σ -algebrassa \mathcal{F} , ja $X(\omega) = \frac{d\mu_X}{dP}(\omega)$ on vastaava Radon-Nikodymin derivaatta.

Olkoon $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ ali σ -algebra. Erityisesti $\mu \ll P$ σ -algebrassa \mathcal{G} . Radon-Nikodymin lauseesta seuraa että on olemassa R-N derivaatta

$$Y(\omega) := \frac{d\mu_X|_{\mathcal{G}}}{dP|_{\mathcal{G}}}(\omega)$$

jossa $Y(\omega) \in L^1(\Omega, \mathcal{G}, P)$ joka toteuttaa mitanvaihtokaavaa

$$E_P(X\mathbf{1}_A) = \mu_X(A) = E_P(Y\mathbf{1}_A) \quad \forall A \in \mathcal{G}$$

Kolmogorovin määritelmästä seuraa että $Y(\omega) = E_P(X|\mathcal{G})(\omega)$.

Siis ehdollisen odotusarvon olemassa olo seuraa R-N lauseesta. Kuitenkin, koska emme ole vielä todistaneet R-N lauseetta käyttimme L^2 -projektiota.

10.2 Mitä voidaan sanoa kun $E_P(|X|) = \infty$?

Olkoon $0 \leq X(\omega) \in L^0(\Omega, \mathcal{F}, P)$ mutta $E_P(X) = \infty$. Myös tässä tapauksessa monotonisen konvergenssilauseen kautta seuraa että on olemassa ehdollinen odotusarvo $Y(\omega) = E_P(X|\mathcal{G})(\omega) \in [0, +\infty]$ joka on \mathcal{G} -mitallinen joka toteuttaa $\forall A \in \mathcal{G}$.

$$E_P(X\mathbf{1}_A) = E_P(Y\mathbf{1}_A) \in [0, +\infty]$$

Toki $Y(\omega)$ voi saada myös arvoa $+\infty$, joka tapauksessa $E_P(Y) = E_P(X) = \infty$.

Yleisemmin olkoon $X(\omega) = (X(\omega)^+ - X(\omega)^-)$, jossa $E_P(|X|) = \infty$. Silloin ehdollinen odotusarvo

$$E_P(X|\mathcal{G})(\omega) := E_P(X^+|\mathcal{G})(\omega) - E_P(X^-|\mathcal{G})(\omega) \in [-\infty, +\infty]$$

on hyvin määritelty vain joukon

$$U := \{ \omega : E_P(X^+|\mathcal{G})(\omega) = E_P(X^-|\mathcal{G})(\omega) = +\infty \}$$

ulkopuolella. Kun käy hyvin joskus $P(U) = 0$.

10.3 Ehdollisen odotusarvon ominaisuudet

1. Monotoninen konvergenssi :

$$0 \leq X_n(\omega) \uparrow X(\omega) \implies 0 \leq E_P(X_n | \mathcal{G})(\omega) \uparrow E_P(X | \mathcal{G})(\omega) \quad P \text{ m.v.}$$

2. $E_P(E_P(X | \mathcal{G})) = E_P(X)$

3. Kun $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$,

$$E_P(X | \mathcal{H})(\omega) = E_P(E_P(X | \mathcal{G}) | \mathcal{H})(\omega) \quad P \text{ m.v.}$$

4. Jos $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{G}, P)$, ja $X, (XY) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, seuraa

$$E_P(YX | \mathcal{G})(\omega) = Y(\omega)E_P(X | \mathcal{G})(\omega)$$

5. jos σ -algebra \mathcal{H} on P -riippumaton σ -algebrasta $\sigma(X) \vee \mathcal{G}$,

$$E_P(X | \mathcal{G} \vee \mathcal{H}) = E_P(X | \mathcal{G})$$

Tod. $\forall G \in \mathcal{G}, H \in \mathcal{H}$, seuraa

$$E_P(X \mathbf{1}_G \mathbf{1}_H) = E_P(X \mathbf{1}_G)P(H) = E_P(E_P(X | \mathcal{G}) \mathbf{1}_G)P(H) = E_P(E_P(X | \mathcal{G}) \mathbf{1}_G \mathbf{1}_H)$$

ja väite seuraa koska $\mathcal{G} \vee \mathcal{H} = \sigma(G \cap H : G \in \mathcal{G}, H \in \mathcal{H})$.

6. (Jensenin epäyhtälö): Kun $E_P(X | \mathcal{G})$ on hyvin määritelty ja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ on konvekksi,

$$E_P(g(X) | \mathcal{G}) \geq g(E_P(X | \mathcal{G}))$$

Tod.

$$g(X(\omega)) \geq g(E_P(X | \mathcal{G})(\omega)) + \delta(\omega) \left(X(\omega) - E_P(X | \mathcal{G})(\omega) \right)$$

jossa $\delta(\omega) = \nabla g_+(E_P(X | \mathcal{G})(\omega))$ on \mathcal{G} -mitallinen. Kun otetaan ehdollista odotusarvoa molemmista puolesta, väite seuraa odotusarvon positiivisuudesta.

10.4 Säännöllinen ehdollinen todennäköisyys ja ytimet

Tapahtuman $A \in \mathcal{F}$ ehdollinen todennäköisyys ehdolla \mathcal{G} σ -algebra on luonnollisesti

$$P(A|\mathcal{G})(\omega) = E_P(\mathbf{1}_A|\mathcal{G})(\omega)$$

joka on yksikäsitteinen modulo P -nolla mittaisia joukkoja. Koska ehdollinen odotusarvo on ei-negatiivinen operaattori, seuraa $P(A|\mathcal{G})(\omega) \in [0, 1]$ P -melkein varmasti.

Voidaanko sanoa että P -melkein varmasti, kuvaus $A \mapsto P(A|\mathcal{G})(\omega) \in [0, 1]$ on todennäköisyysmitta ?

Olkoon $\{A_n\} \subseteq \mathcal{F}$ tapahtumien jono jolla $A_n \downarrow \emptyset$. Seuraa ehdollisen odotusarvon monotonisen konvergenssin lauseesta että on olemassa joukko N jolla $P(N) = 0$

$$P(A_n|\mathcal{G})(\omega) \downarrow 0 \quad \forall \omega \in N^c \tag{10.4.1}$$

Tämä joukko voi toki riippua $\{A_n\} \subseteq \mathcal{F}$ jonosta, ja kun yleisesti jonojen määrä on ylinumeroituva, ei mikään takaa että löytyy sellainen P -nolla mittainen joukko N jossa (10.4.1) pätee samaan aikaan kaikille tapahtumien jonoille joilla $A_n \downarrow \emptyset$.

Siis ehdollinen todennäköisyys ei ole automaattisesti P -melkein varmasti σ -additiivinen.

Määritelmä 10.4.1. *Olkoon (Ω, \mathcal{F}) ja $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}})$ todennäköisyysavaruuudet.*

Kuvaus $K : \Omega \times \tilde{\mathcal{F}} \rightarrow [0, 1]$ on $(\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}})$ todennäköisyys ydin kun

- *kaikille kiinnitetyille $\omega \in \Omega$ kuvaus $K(\omega, \cdot) : \tilde{\mathcal{F}} \rightarrow [0, 1]$ jossa $\tilde{A} \mapsto K(\omega, \tilde{A})$ on todennäköisyysmitta.*
- *kaikille kiinnitetyille tapahtumille $\tilde{A} \in \tilde{\mathcal{F}}$ kuvaus $K(\cdot, \tilde{A}) : \Omega \rightarrow [0, 1]$ jossa $\omega \mapsto K(\omega, \tilde{A})$ on \mathcal{F} -mittallinen.*

10.5. EHDOLLISEN ODOTUSARVON LASKENTA P -RIIPPUMATTOMUUDEN OLETUKSEN NOJALLA

Määritelmä 10.4.2. Olkoon $\tilde{\Omega} = \Omega$ ja $\tilde{\mathcal{F}} \subseteq \mathcal{F}$, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$.

Ehdollisella todennäköisyydellä $(\tilde{A}, \omega) \mapsto P(\tilde{A}|\mathcal{G})(\omega)$ jossa $\tilde{A} \in \tilde{\mathcal{F}}$ on säännöllinen versio jos on olemassa $(\Omega, \mathcal{G}) \rightarrow (\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}})$ todennäköisyys-ydin $K(\omega, \tilde{A})$, joka on \mathcal{G} -mitallinen ω :n suhteen, ja

$$E_P(X|\mathcal{G})(\omega) = \int_{\tilde{\Omega}} X(\tilde{\omega})K(\omega, d\tilde{\omega})$$

kaikille $X \in L^1(\Omega, \tilde{\mathcal{F}}, P)$

Huomautus 10.4.1. määritelmässä esiintyy ali- σ algebra $\tilde{\mathcal{F}} \subseteq \mathcal{F}$ koska joskus ehdollisen todennäköisyyden säännöllinen versio on olemassa vain jollekin pienelle σ -algebralle eikä alkuperäiselle σ -algebralle \mathcal{F} . Esimerkki: $\tilde{\mathcal{F}} = \sigma(X)$ jossa X on (\mathcal{F} -mitallinen) reaal-arvoinen satunnaismuuttuja.

Määritelmä 10.4.3. Todennäköisyysavaruus (Ω, \mathcal{F}) on Borel jos on olemassa mitallinen injektio $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow [0, 1], \mathcal{B}([0, 1])$ jonka käänteiskuvaus $f^{-1} : f(\Omega) \rightarrow \Omega$ on myös mitallinen.

Teoreema 10.4.1. Olkoon (Ω, \mathcal{F}, P) todennäköisyyskolmikko.

Olkoon $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\Omega', \mathcal{F}')$ mitallinen kuvaus, jossa (Ω', \mathcal{F}') on Borelin avaruus, ja $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ ali σ -algebra

On olemassa $(\Omega, \mathcal{G}) \rightarrow (\Omega', \mathcal{F}')$ todennäköisyys ydin $K(\cdot, \cdot)$ joka on ehdollisen todennäköisyyden säännöllinen versio: P melkein varmasti,

$$P(X \in D|\mathcal{G})(\omega) := E_P(\mathbf{1}(X \in D)|\mathcal{G})(\omega) = K(\omega, D) \quad \text{kaikille } D \in \mathcal{F}'$$

Todistus sivutetaan, katso Kallenbergin kirjasta Foundations of Modern Probability, Thm 6.3, 6.4.

Huomautus 10.4.2. Meidän onneksi $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ on Borel avaruus, siis satunnaisvektorin ehdollisella todennäköisyydellä on aina säännöllinen versio.

10.5 Ehdollisen odotusarvon laskenta P -riippumattomuuden oletuksen nojalla

Lause 10.5.1. Todennäköisyysavaruudella (Ω, \mathcal{F}) , olkoon $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ ali σ -algebra, $Y(\omega)$ \mathcal{G} -mitallinen satunnaismuuttuja, joka saa arvot mitallisessa avaruudessa

(S, \mathcal{S}) , ja olkoon $X(\omega) \in (\tilde{S}, \tilde{\mathcal{S}})$ riippumaton \mathcal{G} σ -algebrasta.

Olkoon $f : (\tilde{S} \times S) \rightarrow \mathbb{R}$ rajoitettu ja Borel-mitallinen kuvaus.

Silloin ehdollisella odotusarvolla on integraali-esitys

$$E_P(f(X, Y)|\mathcal{G})(\omega) = E_P(f(X, y))\Big|_{y=Y(\omega)} = \int_{\tilde{S}} f(x, Y(\omega))P_X(dx) \quad (10.5.1)$$

jossa $P_X(B) = P(\{\omega : X(\omega) \in B\})$.

Tod. Olkoon

$V := \{f : (\tilde{S} \times S) \rightarrow \mathbb{R} \text{ Borel mitalliset ja rajoitetut funktiot joille pätee 10.5.1}\}$

Osoitamme ensi että V on monotoninen luokka. Ehdollisen odotusarvon määritelmästä seuraa 10.5.1 on voimassa funktiolle $f(x, y)$ jos ja vain jos $\forall G \in \mathcal{G}$

$$E_P(f(X, Y)\mathbf{1}_G) = \int_{\Omega} \left\{ \int_{\tilde{S}} f(x, Y(\omega))P_X(dx) \right\} \mathbf{1}_G(\omega)P(d\omega)$$

Selvästi V on vektori avaruus koska odotusarvo on lineaarinen. Jos $\{f_n(x, y) : n \in \mathbb{N}\} \subseteq V$ ja $0 \leq f_n(x, y) \uparrow f(x, y)$ jossa $f(x, y)$ on rajoitettu, seuraa monotonisen konvergenssin lauseesta että $f(x, y) \in V$.

Monotonisen luokan lauseesta seuraa että jos $\mathcal{I} \subseteq V$ on π -luokka, V sisältää kaikki rajoitettu $\sigma(\mathcal{I})$ mitalliset funktiot. Väite on osoitettu kun näytämme että 10.5.1 pätee funktiolle $f(x, y) = \mathbf{1}_B(x)\mathbf{1}_D(y) : \forall G \in \mathcal{G}$ riippumattomuudesta seuraa

$$\begin{aligned} E_P(\mathbf{1}_B(X)\mathbf{1}_D(Y)\mathbf{1}_G) &= P_X(B)P(\{Y \in D\} \cap G) \\ &= \int_{\Omega} \left\{ \int_{\Omega} \mathbf{1}_B(X(\tilde{\omega}))P(d\tilde{\omega}) \right\} \mathbf{1}_D(Y(\omega))\mathbf{1}_G(\omega)P(d\omega) = \\ &= \int_{\Omega} \left\{ \int_{\Omega} \mathbf{1}_B(X(\tilde{\omega}))\mathbf{1}_D(Y(\omega))P(d\tilde{\omega}) \right\} \mathbf{1}_G(\omega)P(d\omega) = \\ &= \int_{\Omega} \left\{ \int_{\Omega} f(X(\tilde{\omega}), Y(\omega))P(d\tilde{\omega}) \right\} \mathbf{1}_G(\omega)P(d\omega) \end{aligned}$$

joka tarkoittaa $\mathbf{1}_B(x)\mathbf{1}_D(y) \in V \square$.

10.6 Ehdollisen odotusarvon laskenta mitan-vaihdon avulla: Bayesin kaava

Lemma 10.6.1. *Ehdollinen odotusarvon on itse-adjungoitu operaattori, eli kun $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ on ali σ -algebra, $\forall A \in \mathcal{F}$*

$$E_P(X E_P(\mathbf{1}_A|\mathcal{G})) = E_P(E_P(X|\mathcal{G}) E_P(\mathbf{1}_A|\mathcal{G})) = E_P(E_P(X|\mathcal{G}) \mathbf{1}_A)$$

Tod. Suoraan ehdollisen odotusarvon ominaisuuksista.

Olemme esittäneet kaksi tapausta jossa osaamme laskea ehdollisia odotusarvoja: silloin kun σ -algebralla \mathcal{G} on numeroituva määrä atomeja, ja riippumattomuuden nojalla lauseessa 10.5.1.

Yleisemmin voidaan joskus paluuttaa ehdollisen odotusarvon laskeminen lauseen 10.5.1 tilanteeseen mitan-vaihdon avulla. Ensin esitämme mitanvaihtokaavan ehdolliselle odotusarvolle:

Teoreema 10.6.1. *(Abstrakti Bayesin kaava). Todennäköisyysavaruudella (Ω, \mathcal{F}) , olkoon $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ ja $P \ll_{\mathcal{F}} Q$ todennäköisyysmitat joilla $Q(A) = 0 \implies P(A) = 0$ kun $A \in \mathcal{F}$.*

Radon-Nikodym lauseesta seuraa että on olemassa Radon-Nikodym derivaatta eli satunnaismuuttuja

$$0 \leq Z(\omega) := \frac{dP}{dQ}(\omega) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, Q)$$

jolle odotusarvon mitanvaihtokaava on voimassa:

$$E_P(X) = E_Q(XZ) \quad \forall X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$$

Silloin ehdolliselle odotusarvolle pätee Bayesin kaava:

$$E_P(X|\mathcal{G})(\omega) = \frac{E_Q(XZ|\mathcal{G})(\omega)}{E_Q(Z|\mathcal{G})(\omega)} \in L^1(\Omega, \mathcal{G}, P) \quad (10.6.1)$$

Huomautus 10.6.1. *Olkoon*

$$N = \{ \omega : E_Q(Z|\mathcal{G})(\omega) = 0 \}$$

$N \in \mathcal{G}$ koska $E_Q(Z|\mathcal{G})$ on \mathcal{G} -mitallinen, mitan vaihto kaavasta ja ehdollisen odotusarvon määritelmästä

$$P(N) = E_Q(Z\mathbf{1}_N) = E_Q\left(E_Q(Z|\mathcal{G})\mathbf{1}_N\right) = E_Q\left(E_Q(Z|\mathcal{G})\mathbf{1}_{\{E_Q(Z|\mathcal{G})=0\}}\right) = 0$$

Seuraa että P -melkein varmasti (mutta ei välttämättä Q -melkein varmasti) $E_P(Z|\mathcal{G})(\omega) > 0$, ja yhtälön (10.6.1) vasen puoli on hyvin määritelty.

Tod. Olkoon $G \in \mathcal{G}$. Mitanvaihto kaavasta odotusarvolle ja ehdollisen odotusarvon määritelmästä seuraa

$$\begin{aligned} E_P(X\mathbf{1}_G) &= E_Q(ZX\mathbf{1}_G) = E_Q(E_Q(ZX\mathbf{1}_G|\mathcal{G})) = E_Q(E_Q(ZX|\mathcal{G})\mathbf{1}_G) \\ &= E_Q\left(\frac{E_Q(Z|\mathcal{G})}{E_Q(Z|\mathcal{G})}E_Q(ZX|\mathcal{G})\mathbf{1}_G\right) = E_Q\left(Z\frac{E_Q(ZX|\mathcal{G})}{E_Q(Z|\mathcal{G})}\mathbf{1}_G\right) = E_P\left(\frac{E_Q(ZX|\mathcal{G})}{E_Q(Z|\mathcal{G})}\mathbf{1}_G\right) \quad \square \end{aligned}$$

Esimerkki 10.6.1. (Perinteinen Bayesin kaava) Todennäköisyysavaruudella (Ω, \mathcal{F}) , olkoon ja $X(\omega) \in \mathbb{R}^d, Y(\omega) \in \mathbb{R}^m$ satunnaismuuttujia joilla $\mathcal{F} = \sigma(X, Y)$, $\mathcal{G} = \sigma(Y)$.

Olkoon $P \stackrel{\mathcal{F}}{\ll} Q$ todennäköisyyksimitat joilla $X \perp\!\!\!\perp Y$ ja olkoon

$$0 \leq Z(\omega) := z(X(\omega), Y(\omega)) = \frac{dP}{dQ}(\omega) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, Q)$$

jollakin Borel-mitallisilla funktiolla $z(x, y) \geq 0$. Olkoon $f(x, y)$ rajoitettu Borel-mitallinen kuvaus. Bayesin kaavasta

$$\begin{aligned} E_P(f(X, Y)|\mathcal{G})(\omega) &= \frac{E_Q(f(X, Y)Z|\mathcal{G})(\omega)}{E_Q(Z|\mathcal{G})(\omega)} \\ &= \frac{\int_{\Omega} f(X(\tilde{\omega}), Y(\omega)) z(X(\tilde{\omega}), Y(\omega)) P(d\tilde{\omega})}{\int_{\Omega} z(X(\tilde{\omega}), Y(\omega)) P(d\tilde{\omega})} \\ &= \int_{\Omega} f(X(\tilde{\omega}), Y(\omega)) K(\omega, d\tilde{\omega}) \quad \text{jossa} \\ K(\omega, d\tilde{\omega}) &= \frac{z(X(\tilde{\omega}), Y(\omega))}{\int_{\Omega} z(X(\omega'), Y(\omega)) P(d\omega')} P(d\tilde{\omega}) \end{aligned}$$

on ehdollisen todennäköisyyden ydin. Voidaan myös integroida suoraan \mathbb{R}^d avaruudessa jossa $X(\omega)$ saa arvoja:

$$E_P(f(X, Y)|\mathcal{G})(\omega) = \frac{\int_{\mathbb{R}^d} f(x, Y(\omega)) z(x, Y(\omega)) P_X(dx)}{\int_{\mathbb{R}^d} z(x, Y(\omega)) P_X(dx)} = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, Y(\omega)) k(Y(\omega), dx)$$

10.6. EHDOLLISEN ODOTUSARVON LASKENTA MITAN-VAIHDON AVULLA: BAYESIN KAAVA

jossa

$$k(y, dx) = \frac{z(x, y)}{\int_{\mathbb{R}^d} z(x', y) P_X(dx')} P_X(dx)$$

Kun satunnaisvektorin (X, Y) jakaumalla on tiheysfunktio $(d + m)$ -ulotteisen Lebesgue mitan suhteen, siis $P(X \in dx, Y \in dy) = p_{X,Y}(x, y) dx dy$, Fubini lauseesta seuraa että silloin myös marginaalijakaumilla P_X ja P_Y ovat tiheydet,

$$P(X \in dx) = p_X(x) dx = \int_{\mathbb{R}^m} p_{X,Y}(x, y) dy$$

$$P(Y \in dy) = p_Y(y) dy = \int_{\mathbb{R}^d} p_{X,Y}(x, y) dx$$

ja voidaan valita todennäköisyysavaruudeksi $\Omega = \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m$ todennäköisyysmitoilla

$$Q_{X,Y}(dx, dy) := (P_X \otimes P_Y)(dx, dy) = p_X(x) p_Y(y) dx dy, \quad P_{X,Y}(dx, dy) = p_{X,Y}(x, y) dx dy$$

Oletuksesta $P_{X,Y} \ll (P_X \otimes P_Y)$, seuraa että Radon Nykodim derivaatta on

$$\frac{dP_{X,Y}}{dQ_{X,Y}}(x, y) = \frac{dP_{X,Y}}{d(P_X \otimes P_Y)}(x, y) = z(x, y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_X(x) p_Y(y)}$$

Voidaan silloin kirjoittaa ehdollisen todennäköisyyden ytimen tiheysfunktioiden avulla

$$k(y, dx) = \frac{z(x, y)}{\int_{\mathbb{R}^d} z(x', y) P_X(dx')} P_X(dx) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)} dx = p_{X|Y}(x|y) dx$$

jossa viimeinen yhtälö on ehdollisen tiheysfunktion määritelmä. Perinteinen Bayesin kaava on

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)} = \frac{p_X(x) p_{Y|X}(y|x)}{p_Y(y)} .$$

10.6.1 Ehdollisen odotusarvon laskenta tuloavaruudessa

Olkoon (Ω, \mathcal{F}, P) todennäköisyyskolmikko ja $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{F}, \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$.

Tuloavaruudessa $(\Omega \times \Omega)$ varustettuna tulo σ -algebralla $\mathcal{H} \otimes \mathcal{G}$ määritellään Dynkinin laajennuslauseen kautta todennäköisyysmitta \mathbb{P} jolla

$$\mathbb{P}(H \times G) = P(H \cap G) \quad \forall H \in \mathcal{H}, G \in \mathcal{G}$$

Lause 10.6.1. Olkoon $X(\omega, \omega') \in L^1(\Omega \times \Omega, \mathcal{H} \otimes \mathcal{G}, \mathbb{P})$.

Silloin

$$\iint_{\Omega \times \Omega} X(\omega, \omega') \mathbb{P}(d\omega \times d\omega') = \int_{\Omega} X(\omega, \omega) P(d\omega) \quad (10.6.2)$$

Tod. Kun $X(\omega, \omega') = \mathbf{1}_H(\omega) \mathbf{1}_G(\omega')$ jossa $H \in \mathcal{H}$ ja $G \in \mathcal{G}$, väite seuraa suoraan \mathbb{P} :n määritelmästä. Olkoon

$V := \{X(\omega, \omega') : \text{rajoitetut ja } \mathcal{H} \otimes \mathcal{G}\text{-mitalliset s.m. joilla (10.6.2) on voimassa} \}$

Selvästi V on vektori avaruus, ja monotonisen konvergenssin lauseesta seuraa että V on monotoninen luokka. Koska V sisältää satunnaismuuttujat $\mathbf{1}_H(\omega) \mathbf{1}_G(\omega')$ jossa $H \in \mathcal{H}$ ja $G \in \mathcal{G}$, monotonisen luokan lauseesta seuraa sisältää myös kaikki rajoitetut $\mathcal{H} \otimes \mathcal{G}$ -mitalliset satunnaismuuttujat.

Yleisemmin kun X on ei-rajoitettu ja $\mathcal{H} \otimes \mathcal{G}$ -mitallinen voidaan ensin hajottaa $X = (X^+ - X^-) \in L^1(\Omega \times \Omega, \mathcal{H} \otimes \mathcal{G}, P^{\otimes 2})$ satunnais-muuttujen jonolla $X_n = (X^+ \wedge n) - (X^- \wedge n)$, ja käyttää monotonisen konvergenssin lausetta erikseen positiivisille ja negatiivisille puolille \square

Esimerkki 10.6.2. Olkoon $\xi(\omega), \eta(\omega) \in \mathbb{R}$ satunnaismuuttujat $\mathcal{H} = \sigma(\xi)$, $\mathcal{G} = \sigma(\eta)$. Jos $X(\omega, \omega') \geq 0$ on $\sigma(\xi) \otimes \sigma(\eta)$ -mitallinen, on olemassa Borel-mitallinen kuvaus $f : (\mathbb{R} \times \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^+$ jolla $X(\omega, \omega') = f(\xi(\omega), \eta(\omega'))$. Silloin

$$\int_{\Omega} f(\xi(\omega), \eta(\omega)) P(d\omega) = \iint_{\Omega \times \Omega} f(\xi(\omega), \eta(\omega')) \mathbb{P}(d\omega, d\omega')$$

Oletamme nyt että σ -algebrat \mathcal{H} ja \mathcal{G} ovat P -riippumattomia eli

$$P(H \cap G) = P(H)P(G) \text{ kun } H \in \mathcal{H} \text{ ja } G \in \mathcal{G}$$

Silloin $\mathbb{P} = P \otimes P = P^{\otimes 2}$ eli

$$\mathbb{P}(H \times G) = P(H \cap G) = P(H)P(G) \quad \forall H \in \mathcal{H}, G \in \mathcal{G}$$

Tästä esityksestä seuraa suoraan että kun $G \in \mathcal{G}$, $X(\omega, \omega) = f(\xi(\omega), \eta(\omega))$,

$$\begin{aligned} E_P(X \mathbf{1}_G) &= \int_{\Omega} X(\omega, \omega) \mathbf{1}_G(\omega) P(d\omega) = \iint_{\Omega \times \Omega} X(\omega, \omega') \mathbf{1}_G(\omega') P^{\otimes 2}(d\omega, d\omega') \\ &= \int_{\Omega} \left\{ \int_{\Omega} X(\omega, \omega') P(d\omega) \right\} \mathbf{1}_G(\omega') P(d\omega') \end{aligned}$$

10.6. EHDOLLISEN ODOTUSARVON LASKENTA MITAN-VAIHDON AVULLA: BAYESIN KAA

ehdollisen odotusarvon määritelmästä seuraa

$$E_P(X|\mathcal{G})(\omega') = \int_{\Omega} X(\omega, \omega') P(d\omega)$$

joka vastaa kaavan (10.5.1)

Yleisemmin, kun σ -algebrat \mathcal{H} ja \mathcal{G} eivät ole riippumattomia P -mitan suhteen, oletamme että $\mathbb{P} \ll P^{\otimes 2}$ tulo σ -algebrassa $(\mathcal{H} \otimes \mathcal{G})$, eli $\mathbb{P}(C) = 0$ kun $C \in (\mathcal{H} \otimes \mathcal{G})$ ja $P^{\otimes 2}(C) = 0$.

Seuraa Radon-Nikodymin lauseesta että on olemassa $(\mathcal{H} \otimes \mathcal{G})$ -mitallinen Radon-Nikodymin derivaatta

$$0 \leq Z(\omega, \omega') := \frac{d\mathbb{P}}{dP^{\otimes 2}}(\omega, \omega') \in L^1(\Omega \times \Omega, \mathcal{H} \otimes \mathcal{G}, P^{\otimes 2})$$

jolla mitan vaihdon kaava on voimassa kaikille $X \in L^1(\Omega \times \Omega, \mathcal{H} \otimes \mathcal{G}, \mathbb{P})$

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} X(\omega, \omega) P(d\omega) &= \iint_{\Omega \times \Omega} X(\omega, \omega') \mathbb{P}(d\omega, d\omega') = \iint_{\Omega \times \Omega} X(\omega, \omega') Z(\omega, \omega') P^{\otimes 2}(d\omega, d\omega') = \\ &= \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} X(\omega, \omega') Z(\omega, \omega') P(d\omega) \right) P(d\omega') \end{aligned}$$

Kun $G \in \mathcal{G}$ saadaan

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} X(\omega, \omega) \mathbf{1}_G(\omega) P(d\omega) &= \\ \iint_{\Omega \times \Omega} X(\omega, \omega') \mathbf{1}_G(\omega') \mathbb{P}(d\omega, d\omega') &= \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} X(\omega, \omega') Z(\omega, \omega') P(d\omega) \right) \mathbf{1}_G(\omega') P(d\omega') = \\ \int_{\Omega} Y(\omega') \mathbf{1}_G(\omega') P(d\omega'), \end{aligned}$$

jossa

$$Y(\omega') = \int_{\Omega} X(\omega, \omega') Z(\omega, \omega') P(d\omega)$$

on \mathcal{G} -mitallinen,

$$\begin{aligned} &= \iint_{\Omega \times \Omega} Z(\omega, \omega') Y(\omega') \mathbf{1}_G(\omega') P^{\otimes 2}(d\omega \times d\omega') = \iint_{\Omega \times \Omega} Y(\omega') \mathbf{1}_G(\omega') \mathbb{P}(d\omega, d\omega') \\ &= \int_{\Omega} Y(\omega') \mathbf{1}_G(\omega') P(d\omega') \end{aligned}$$

Kolmogorovin ehdollisen odotusarvon määritelmästä seuraa $Y(\omega') = E_P(X|\mathcal{G})(\omega')$.

Huomataan myös että

$$K(\omega, d\omega') := Z(\omega, \omega')P(d\omega')$$

on ehdollisen todennäköisyyden ydin: $\forall A \in \mathcal{H}$, kuvaus

$$\omega \mapsto K(\omega, A) := \int_A Z(\omega, \omega')P(d\omega')$$

on \mathcal{G} -mitallinen, ja $\int_{\Omega} Z(\omega, \omega')P(d\omega) \equiv 1$ koska

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\Omega \times G) &= P(\Omega \cap G) = P(G) = P(\Omega)P(G) = P^{\otimes 2}(\Omega \times G) \quad \forall G \in \mathcal{G} \\ \iff P(G) &= \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} Z(\omega, \omega')P(d\omega) \right) \mathbf{1}_G(\omega')P(d\omega') \quad \forall G \in \mathcal{G} \end{aligned}$$

Samoin, $\int_{\Omega} Z(\omega, \omega')P(d\omega') \equiv 1$.

Huomautus 10.6.2. Tässä kappaleessa yleistettiin lause 10.5.1 ja esimerkki 10.6.1 tilanteeseen jossa \mathcal{H} ja \mathcal{G} ovat yleisiä ali- σ -algebrat eikä välttämättä satunnaisvektoreiden virittämiä.

10.7 Ehdollistaminen nollamittaisiin tapahtumiin: varoitus

Olkoon $X(\omega), Y(\omega)$ riippumattomia standardi gaussisia satunnaismuuttujia,

$E_P(X) = E_P(Y) = 0, E_P(X^2) = E_P(Y^2) = 1$. Olkoon

$$W(\omega) = (X(\omega) - Y(\omega)), \quad Z(\omega) = \mathbf{1}(Y(\omega) \neq 0) \frac{X(\omega)}{Y(\omega)}$$

Olkoon $N = \{\omega : Y(\omega) = 0\}$.

Selvästi $P(N) = 0$ ja

$$N^c \cap \{\omega : X(\omega) = Y(\omega)\} = N^c \cap \{\omega : W(\omega) = 0\} = N^c \cap \{\omega : Z(\omega) = 1\}$$

Olkoon $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ rajoitettu Borel mitallinen kuvaus.

$$\begin{aligned}
 i) \quad E_P(f(X)|\{X = Y\}) &= \frac{\iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} f(x)\delta_0(x - y)p_X(x)p_Y(y)dx dy}{\iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} \delta_0(x - y)p_X(x)p_Y(y)dx dy} \\
 ii) \quad E_P(f(X)|W = 0) &= \int_{\mathbb{R}} f(x)p_{X|W}(x|0)dx \\
 iii) \quad E_P(f(X)|Z = 1) &= \int_{\mathbb{R}} f(x)p_{X|Z}(x|1)dx
 \end{aligned}$$

eivät ole valttämättä samasuuruisia, vaikka

$$\begin{aligned}
 \{\omega : X(\omega) = Y(\omega)\} \cap \{\omega : Y(\omega) \neq 0\} &= \{\omega : W(\omega) = 0\} \cap \{\omega : Y(\omega) \neq 0\} \\
 &= \{\omega : Z(\omega) = 1\} \cap \{\omega : Y(\omega) \neq 0\}.
 \end{aligned}$$

Näytämme että $i) = ii) \neq iii)$.

$i)$ Perustuu tulkintaan

$$\begin{aligned}
 E_P(f(X)|\{X = Y\}) &:= \lim_{\varepsilon \downarrow 0} E_P(f(X)|\{|X - Y| < \varepsilon\}) \\
 &= \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{E_P(f(X)\mathbf{1}\{|X - Y| < \varepsilon\})}{P(|X - Y| < \varepsilon)} = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} p_Y(y)dy \right) f(x)p_X(x)dx}{\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} p_Y(y)dy \right) p_X(x)dx} \\
 &= \frac{\int_{\mathbb{R}} \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \left((2\varepsilon)^{-1} \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} p_Y(y)dy \right) f(x)p_X(x)dx}{\int_{\mathbb{R}} \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \left((2\varepsilon)^{-1} \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} p_Y(y)dy \right) p_X(x)dx} \\
 &= \frac{\int_{\mathbb{R}} f(x)p_Y(x)p_X(x)dx}{\int_{\mathbb{R}} p_Y(x)p_X(x)dx} = \frac{\iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} f(x)\delta_0(x - y)p_X(x)p_Y(y)dx dy}{\iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} \delta_0(x - y)p_X(x)p_Y(y)dx dy}
 \end{aligned}$$

Tässä δ_0 on Diracin delta distribuutio jolla on ominaisuus

$$\int_{\mathbb{R}} g(x)\delta_0(x)dx = g(0) = \int_{\mathbb{R}} g(x)F(dx)$$

kaikille jatkuville funktioille g , ja $F(x) = \mathbf{1}(x \geq 0)$. Diracin δ on porraskfunktion F :n derivaatta distribution mielessä.

Lasketaan:

$$i) \frac{\int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} f(x) \delta_0(x-y) p_X(x) p_Y(y) dx dy}{\int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} \delta_0(x-y) p_X(x) p_Y(y) dx dy} = \frac{\int_{\mathbb{R}} f(x) p_X(x) p_Y(x) dx}{\int_{\mathbb{R}} p_X(x) p_Y(x) dx} = \frac{\int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-x^2} dx}{\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-x^2} dx$$

ii) Bayesin kaavasta

$$p_{X|W}(x, w) = \frac{p_X(x) p_{W|X}(x, w)}{p_W(w)} = \frac{p_X(x) p_{W|X}(x, w)}{p_W(w)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}x^2\right) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}(w-x)^2\right) \left(\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \exp\left(-\frac{1}{4}w^2\right)\right)^{-1}$$

koska $p_{W|X}(w|x) = p_Y(w-x)$ ja W on gaussinen ja $E(W) = E(X) - E(Y) = 0$, $E(W^2) = E(X^2) + E(Y^2)$, siis

$$p_{W|X}(w|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(w-x)^2}{2}\right)$$

joka on gaussisen jakauman $\mathcal{N}(x, 1)$ tiheysfunktio.

Tästä seuraa

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) p_{X|W}(x|0) dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-x^2} dx$$

joka täsmää i) arvon kanssa.

Kuitenkin

$$p_{Z|X}(z|x) = p_Y(x/z) \left| \frac{dy}{dz} \right| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2z^2}\right) \frac{|x|}{z^2}$$

muuttujan vaihdolla $z = x/y$, ja

$$\begin{aligned} p_Z(z) &= \int_{\mathbb{R}} p_{Z|X}(z|x) p_X(x) dx = \frac{1}{z^2 2\pi} \int_{\mathbb{R}} |x| \exp\left(-\frac{x^2}{2}(1+z^{-2})\right) dx \\ &= \frac{1}{z^2 2\pi} 2 \int_0^\infty r^{1/2} \exp\left(-\frac{r}{2}(1+z^{-2})\right) \frac{r^{-1/2}}{2} dr \\ &= \frac{1}{z^2 2\pi} \int_0^\infty \exp\left(-\frac{r}{2}(1+z^{-2})\right) dr = \frac{1}{z^2 2\pi} \frac{2}{(1+z^{-2})} = \frac{1}{(1+z^2)\pi} \end{aligned}$$

10.7. EHDOLLISTAMINEN NOLLAMITTAISIIN TAPAHTUMIIN: VAROITUS 127

muuttujan vaihdolla $r = x^2$. Tämän jakauman nimi on Student-t vapausasteella 1.

Tästä seuraa Bayesin kaavalla

$$\begin{aligned} p_{X|Z}(x|z) &= \frac{p_X(x)p_{Z|X}(x|z)}{p_Z(z)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-x^2/2) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{x^2}{2z^2}) \frac{|x|}{z^2}}{(1+z^2)^{-1}\pi^{-1}} \\ &= \frac{(1+z^2)|x|}{2} \exp(-\frac{x^2}{2}(1+z^{-2})) \end{aligned}$$

Kun $z = 1$ saadaan $p_{X|Z}(x|1) = |x| \exp(-x^2)$ ja

$$E_P(f(X)|Z = 1) = \int_{\mathbb{R}} f(x)p_{X|Z}(x|1)dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)|x| \exp(-x^2)dx$$

joka on eri kuin integraalien i) ii) arvo.

Nolla-mittaisilla tapahtumilla voi olla eri esityksiä eri satunnaismuuttujien avulla, ja vastaavien ehdollisten odotusarvojen pistettäiset arvot saattavat olla eriläisiä. Tämä ei ole ristiriidassa todennäköisyysteorian kanssa koska aina voidaan vaihtaa ehdollisen odotusarvon arvot pistettäin nolla mittaisissa joukoissa.

Luku 11

Jakaumien konvergenssi

Olkoon $(\Omega_n, \mathcal{F}_n, P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ jono todennäköisyysavaruuksia, ja $X_n : \Omega_n \rightarrow (S, \mathcal{B}(S))$ satunnaismuuttujien jono jossa (S, ρ) on metrinen avaruus, esimerkiksi $S = \mathbb{R}^d$, Olkoon $X(\omega)$ satunnaismuuttuja todennäköisyysavaruudessa (Ω, \mathcal{F}, P) .

Määritelmä 11.0.1. Sanotaan että jono X_n suppenee heikosti tai jakauman mielessä kohti X :n ja merkitään $X \xrightarrow{d} X$, kun

$$\forall f \in C_b(S; \mathbb{R}) = \{f : S \mapsto \mathbb{R}, \text{ jatkuva ja rajoitettu} \}, \\ E_{P_n}(f(X_n)) \rightarrow E_P(f(X)) \quad \text{kun } n \rightarrow \infty$$

Huomataan että heikko konvergenssin käsite koskee vain satunnaismuuttujien jakaumia, siksi soveltuu myös tapaukseen jossa satunnaismuuttujat eivät elä samalla todennäköisyysavaruudella. Kun $\Omega_n = \Omega$, $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}$ ja $P_n = P \forall n$, nähdään myös että heikko konvergenssi on kaikkien heikompi konvergenssikäsite:

Lemma 11.0.1. Kun $X_n \xrightarrow{P} X$ (stokastisesti) ja f on jatkuva seuraa että $f(X_n) \xrightarrow{P} f(X)$.

Tod. Kaikille alijonolle (n_k) on olemassa alijono (n_{k_l}) jolla $X_{n_{k_l}}(\omega) \rightarrow X(\omega)$ P -melkein varmasti. Koska f on jatkuva seuraa myös että samalla alijonolla $f(X_{n_{k_l}}(\omega)) \rightarrow f(X(\omega))$. Tästä seuraa $f(X_n) \xrightarrow{P} f(X)$.

Lause 11.0.1. Kun $X_n \xrightarrow{P} X$ (stokastisesti) seuraa että $X_n \xrightarrow{w} X$ (jakauman mielessä)

Tod. Olkoon f jatkuva ja rajoitettu. Seuraa lemmasta että $f(X_n) \xrightarrow{P} f(X)$. Koska f on rajoitettu jono $\{f(X_n) : n \in \mathbb{N}\}$ on tasaisesti integroituva ja siksi $f(X_n) \xrightarrow{L^1(P)} f(X)$, josta seuraa $E_P(f(X_n)) \rightarrow E_P(f(X))$.

Stokastinen konvergenssi seuraa jakauman konvergenssista ainoastaan kun rajajakauma on degeneroitu:

Lause 11.0.2. Jos $\forall n$ X_n on satunnaismuuttuja todennäköisyysavaruudessa $(\Omega_n, \mathcal{F}_n, P_n)$ ja $X_n \xrightarrow{d} c$ (jakauman mielessä) jossa c on vakio, seuraa että $X_n \xrightarrow{P_n} c$ (stokastisesti), eli

$$P_n(|X_n - c| > \varepsilon) \rightarrow 0 \quad \text{kun } n \rightarrow \infty$$

Tod. Koska

$$P_n(X_n \leq t) = F_n(t) \rightarrow F(t) = \mathbf{1}(c \leq t) \quad \text{kun } t \neq c.$$

seuraa $\forall \varepsilon > 0$

$$P_n(|X_n - c| \leq \varepsilon) = P_n(X_n \leq c + \varepsilon) - P_n(X_n \leq c - \varepsilon) \rightarrow F(c + \varepsilon) - F(c - \varepsilon) = 1 - 0$$

Lause 11.0.3. Olkoon $X_n : \Omega_n \rightarrow \mathbb{R}$, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ satunnaismuuttujat, $F_n(t) = P_n(X_n \leq t)$, $F(t) = P(X \leq t)$. Silloin

$$X_n \xrightarrow{w} X \iff F_n(t) \rightarrow F(t) \quad \forall t : F(t-) = F(t)$$

Tod. \implies Approksimoidaan indikaattorin $x \mapsto \mathbf{1}(x \leq t)$ jatkuvalla funktiolla h_ε jossa $\varepsilon > 0$

$$h_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1 & t \geq x \\ 1 - \frac{t-x}{\varepsilon} & t < x < t + \varepsilon \\ 0 & t + \varepsilon < x \end{cases}$$

Huomataan että

$$\mathbf{1}(x \leq t) \leq h_\varepsilon(x) \leq \mathbf{1}(x \leq t + \varepsilon)$$

josta seuraa

$$\begin{aligned} F_n(t) &\leq E_{P_n}(h_\varepsilon(X_n)) \rightarrow E_P(h_\varepsilon(X)) \leq F(t + \varepsilon) \\ \implies \limsup_n F_n(t) &\leq F(t + \varepsilon) \quad \forall \varepsilon > 0, \\ \implies \limsup_n F_n(t) &\leq F(t+) = F(t) \end{aligned}$$

koska $t \mapsto F(t)$ on oikealta jatkuva.

Samoin valitsemalla $g_\varepsilon(x) = h_\varepsilon(x + \varepsilon)$, koska

$$\mathbf{1}(x \leq t - \varepsilon) \leq g_\varepsilon(x) \leq \mathbf{1}(x < t)$$

seuraa

$$\begin{aligned} F_n(t-) &\geq E_{P_n}(g_\varepsilon(X_n)) \rightarrow E_P(g_\varepsilon(X)) \geq F(t - \varepsilon) \\ \implies \liminf_n F_n(t-) &\geq F(t - \varepsilon) \quad \forall \varepsilon > 0 \\ \implies \liminf_n F_n(t-) &\geq F(t-) \end{aligned}$$

Kun $F(t) = F(t-)$ tästä seuraa että $\lim F_n(t) = F(t)$.

Toinen implikaatio seuraa Skorokhodin esityksestä.

11.0.1 Skorokhodin esitys

Olkoon $t \mapsto F(t)$ ei-vähenevä, oikealta jatkuva, $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$. Kanonisessa todennäköisyysavaruudessa $\Omega = [0, 1]$, joka on varustettu Borelin σ -algebralla ja Lebesguen todennäköisyysmitalla P , voidaan rakentaa satunnaismuuttuja $X(\omega)$ jolla $P(\omega : X(\omega) \leq t) = F(t)$.

Määritellään kertymäfunktion F :n yleistetyt käänteisfunktiot

$$X^+(\omega) := \inf\{t : F(t) > \omega\} = \sup\{t : F(t) \leq \omega\}, \quad (11.0.1)$$

$$X^-(\omega) := \inf\{t : F(t) \geq \omega\} = \sup\{t : F(t) < \omega\} \quad (11.0.2)$$

- $X^+(\omega) \geq X^-(\omega)$ ovat ei väheneviä ω :n suhteen
- $\omega \mapsto X^+(\omega)$ on oikealta jatkuva ja $\omega \mapsto X^-(\omega)$ on vasemmalta jatkuva.
- Huomataan myös että $F(X^-(\omega)) = \omega \leq F(X^+(\omega))$, koska F on oikealta jatkuva.

Osoitamme että $P(\omega : X^-(\omega) \leq z) = P(\omega : X^+(\omega) \leq z) = F(z)$,

ja $P(X^- = X^+) = 1$. Koska

$$X^-(\omega) \leq z \iff \omega \leq F(X^-(\omega)) \leq F(z),$$

ja P on Lebesguen todennäköisyysmitta, seuraa

$$F(z) = P([0, F(z)]) = P(\omega : \omega \leq F(z)) = P(\omega : X^-(\omega) \leq z).$$

Koska $X^+(\omega) \geq X^-(\omega) \geq X^+(\omega') \geq X^-(\omega')$ kun $\omega > \omega'$, seuraa

$$X^+(\omega) \geq X^-(\omega) \geq X^+(\omega-) := \lim_{\omega' \uparrow \omega} X^+(\omega'),$$

joukko $\{\omega : X^-(\omega) < X^+(\omega)\}$ on korkeintaan numeroituva ja

$P(X^- < X^+) = 0$ (P on Lebesguen mitta). Tästä seuraa

$$P(X^+ \leq z) = P(\{X^- \leq z\} \cap \{X^+ = X^-\}) = P(X^- \leq z) = F(z)$$

Lauseen 11.0.3 implikaation \Leftarrow todistus Olkoon $z \in \mathbb{R}$ jolla $F(z-) = F(z)$, ja $F_n(z) \rightarrow F(z)$. Olkoon $X_n^+(\omega), X_n^-(\omega)$ kertymäfunktion F_n yleistytyt käänteisfunktiot kuten kaavoissa 11.0.1-2.

Koska $X^+(\omega) < z \iff \omega < F(z)$, kun n on tarpeeksi suuri $\omega < F_n(z)$ ja tämä tapahtuu jos ja vain jos $X_n^+(\omega) < z$. Silloin, $\limsup_n X_n^+(\omega) \leq z$. Tästä seuraa

$$\limsup_n X_n^+(\omega) \leq X^+(\omega)$$

muuten olisi olemassa z jolla

$$\limsup_n X_n^+(\omega) > z > X^+(\omega),$$

josta seuraa ristiriita.

Jos $X^-(\omega) > z$ seuraa $\omega > F(z)$ ja kun n on tarpeeksi suuri $\omega > F_n(z)$ josta seuraa $X_n^-(\omega) \geq z$. Silloin $\liminf_n X_n^-(\omega) \geq X^-(\omega)$.

$$X^-(\omega) \leq \liminf_n X_n^-(\omega) \leq \liminf_n X_n^+(\omega) \leq \limsup_n X_n^+(\omega) \leq X^+(\omega)$$

Joukossa $\{\omega : X^-(\omega) = X^+(\omega)\}$ jolla on todennäköisyys $P = 1$, pätee

$$\lim_n X_n^+(\omega) = \lim_n X_n^-(\omega) = X^+(\omega) = X^-(\omega)$$

Siis olemme rakentaneet satunnaismuuttujan $X(\omega) = X^\pm(\omega)$ ja satunnaismuuttujien jonon $X_n(\omega) = X_n^\pm(\omega)$ (ei ole väliä kumpaa versiota valitaan) samassa todennäköisyysavaruudessa jolla

$$X_n(\omega) \rightarrow X(\omega) \quad P\text{-melkein varmasti}, \quad P(X_n \leq t) = F_n(t), \quad P(X \leq t) = F(t)$$

Jos $f(x)$ on rajoitettu ja jatkuva testifunktio, seuraa dominoidun konvergenssin lauseesta $E_P(f(X_n)) \rightarrow E_P(f(X))$. \square

Varoitus: Olkoon $X_n, n \in \mathbb{N}$ ja $X(\omega)$ satunnaismuuttujat jotka elävät samassa todennäköisyysavaruudessa (Ω, \mathcal{F}, P) , jolla $X_n \xrightarrow{d} X$.

Koska $P(X_n \leq t) = F_n(t) \rightarrow F(t) = P(X \leq t) \forall t$ jolla $F(t) = F(t-)$ Skorokhodin esityksellä saadaan kanonisessa todennäköisyysavaruudessa $\tilde{\Omega} = [0, 1]$ varustettuna Borelin σ -algebralla ja Lebesgue mitalla \tilde{P} ,

satunnaismuuttumien jono $\tilde{X}_n(\tilde{\omega})$ ja satunnaismuuttujan $\tilde{X}(\tilde{\omega})$ jotka elävät kanonisessa todennäköisyysavaruudessa $\tilde{\Omega} = [0, 1]$ varustettuna Borelin σ -algebralla ja Lebesgue mitalla \tilde{P} , joilla

$$\begin{aligned} \tilde{P}(\tilde{X}_n \in B) &= P(X_n \in B) \quad \text{ja} \quad \tilde{P}(\tilde{X} \in B) = P(X \in B), \\ \tilde{X}_n(\tilde{\omega}) &\rightarrow \tilde{X}(\tilde{\omega}) \quad \tilde{P} \text{ m.v} \end{aligned}$$

Tämä ei kerro yhtään mitään alkuperäisestä jonon $X_n(\omega)$ P -melkein varma konvergenssista alkuperäisessä todennäköisyysavaruudessa (Ω, \mathcal{F}, P) .

Skorokhodin esityksessä satunnaismuuttujien $(\tilde{X}(\omega), \tilde{X}_n(\omega), n \in \mathbb{N})$ yhteinen jakauma sattaa olla aivan eri kun alkuperäisten satunnaismuuttujien $(X(\omega), X_n(\omega), n \in \mathbb{N})$ yhteistä jakaumaa, vaikka yksi-ulotteiset marginaalijakaumat täsmävät.

Siksi, vaikka $\tilde{X}_n(\tilde{\omega}) \rightarrow \tilde{X}(\tilde{\omega})$ \tilde{P} -melkein varmasti kanonisessa avaruudessa $\tilde{\Omega}$, siitä ei saa tehdä johtopäätöksiä alkuperäisen jonon $X_n(\omega)$ stokastisesta konvergenssista alkuperäisessä todennäköisyysavaruudessa (Ω, \mathcal{F}, P) .

Esimerkki Todennäköisyysavaruudessa (Ω, \mathcal{F}, P) olkoon $(G_i(\omega) : i \in \mathbb{N})$ riippumattomia ja samoin jakautuneita standardi gaussisia satunnaismuuttujia, jolla $E_P(G_1) = 0, E_P(G_1^2) = 1$.

$$\text{Olkoon } \hat{S}_n(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2^n}}(G_1(\omega) + \dots + G_{2^n}(\omega))$$

Koska $S_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(G_1(\omega) + G_2(\omega))$ on standardi gaussinen (harjoitustettava) seuraa induktivisesti että myös \hat{S}_n on standardi gaussinen, $P(\hat{S}_n \in$

$B) = P(G_1 \in B)$, ja koska jakauma säilyy on selvää että $\widehat{S}_n \xrightarrow{d} G_1$ (jakauksen mielessä).

Kuitenkin voidaan osoittaa että \widehat{S}_n ei suppene stokastisesti.

Muuten voitaisiin kirjoittaa

$$\widehat{S}_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\widehat{S}_n + \widehat{S}'_n)$$

jossa $\widehat{S}'_n = \frac{1}{\sqrt{2^{n-1}}}(G_{2^{n-1+1}} + \dots + G_{2^n}) \perp\!\!\!\perp \widehat{S}_n$.

Koska jono (\widehat{S}_n) olisi stokastisesti Cauchy,

$$P(|\widehat{S}_{n+1} - \widehat{S}_n| \geq \varepsilon) = P(|\widehat{S}'_n - (\sqrt{2} - 1)\widehat{S}_n| \geq \sqrt{2}\varepsilon) = P(|G_1 - (\sqrt{2} - 1)G_2| \geq \sqrt{2}\varepsilon)$$

ja koska $\forall \varepsilon > 0$ vasemman puolen termi suppenee kohti nollaan kun n kasvaa, tästä seuraa että $G_1(\omega) = (\sqrt{2} - 1)G_2(\omega)$ P -melkein varmasti! Oletuksen mukaan $G_2 \perp\!\!\!\perp \sigma(G_1)$ P -mitan suhteen, josta seuraa että G_1 on P -rippumaton itsestään ja siksi P -triviaali, ja koska $E_P(G_1) = 0$ seuraa että $P(G_1 = 0) = 1$. Tämä on ristiriidassa koska $E_P(G_1^2) = 1$.

Esimerkki 11.0.1. Olkoon X_n binomi jakautunut parametreilla n ja p_n

$$P_n(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n, \quad \text{jossa oletetaan } \lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0.$$

Silloin $X_n \xrightarrow{d} X$ jossa X on Poisson(λ) jakautunut. Koska

$$\binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{n}{n} \frac{(n-1)}{n} \dots \frac{(n-k+1)}{n} \frac{1}{k!} (np_n)^k \left(1 - \frac{(n-k)p_n}{(n-k)}\right)^{n-k}$$

$$\text{ja } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\lambda}{n}\right)^n = \exp(\lambda),$$

Kun k on kiinteä ja $n \rightarrow \infty$, $np_n \rightarrow \lambda$, $\frac{(n-k)}{n} \rightarrow 1$, $(n-k) \rightarrow \infty$, josta seuraa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(X_n = k) = \frac{1}{k!} \lambda^k \exp(-\lambda) = P(X = k)$$

jossa X on Poisson(λ) jakautunut.

Seuraavaksi yleistetään lause 11.0.3 satunnaisvektoreille.

Lemma 11.0.2. (Portmanteau) Olkoon $X_n \in \mathbb{R}^d$ satunnaismuuttujat todennäköisyysavaruuksissa $(\Omega_n, \mathcal{F}_n, P_n)$ ja $X \in \mathbb{R}^d$ satunnaismuuttujat todennäköisyysavaruuksissa (Ω, \mathcal{F}, P) . Seuraavat lauseet ovat yhtä päteviä:

1. $P_n(X_n \leq x) \rightarrow P(X \leq x)$ kaikissa pisteissä jossa $F_X(x) = P(X \leq x)$ on jatkuva.
2. $E_{P_n}(f(X_n)) \rightarrow E_P(f(X))$ kaikille jatkuville rajoitetuille funktioille f .
3. $E_{P_n}(f(X_n)) \rightarrow E_P(f(X))$ kaikille rajoitetuille Lipschitz funktioille f .
4. $\liminf E_{P_n}(f(X_n)) \geq E_P(f(X))$ kaikille ei-negatiivisille jatkuville funktioille f .
5. $\liminf P_n(X_n \in U) \geq P(X \in U)$ kaikille avoimille $U \subseteq \mathbb{R}^d$.
6. $\limsup P_n(X_n \in C) \leq P(X \in C)$ kaikille suljetuille $C \subseteq \mathbb{R}^d$.
7. $P_n(X_n \in B) \rightarrow P(X \in B)$ kaikille $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ jolla $P(X \in \partial B) = 0$, jossa $\partial B = (\bar{B} \setminus \overset{\circ}{B})$ on joukon reuna, $\bar{B} = \left(\bigcap_{B \subseteq C \text{ suljettu}} C \right)$ on joukon sulkeuma, $\overset{\circ}{B} = \left(\bigcup_{B \supseteq U \text{ avoin}} U \right)$ on joukon sisus.

Huomautus 11.0.1. Ei ollut ketään kuuluisaa ranskalaista matematiikkaa nimeltä Portmanteau. Ranskankieleinen sana tarkoittaa naulakko, lemman nimi viittaa sen käyttökelpoisuuteen.

Tod (1) \implies (2) Oletetaan ensin että F_X on jatkuva. Oletuksesta (1) seuraa $P_n(X_n \in I) \rightarrow P(X \in I)$ kaikille suorakulmaisille tulojoukoille I . Olkoon $\varepsilon > 0$ ja I suorakulmainen kompakti joukko jolla $P(X \in I) > (1 - \varepsilon)$. Koska f on jatkuva, se on tasaisesti jatkuva kompaktissa I . On olemassa äärellinen ositus $I = \bigcup_{j=1}^m I_j$ jossa I_j ovat suorakulmaisia joukkoja ja $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ kun $x, y \in I_j$ jollekin j . Valitaan $x_j \in I_j \forall j = 1, \dots, m$ ja määrtiellään yksinkertainen funktio

$$f_\varepsilon(x) = \sum_{j=1}^m f(x_j) \mathbf{1}_{I_j}(x)$$

Koska $|f(x) - f_\varepsilon(x)| < \varepsilon$, seuraa

$$\begin{aligned} |E_P(f(X)) - E_P(f_\varepsilon(X))| &< \varepsilon + P(X \notin I) < 2\varepsilon \\ |E_{P_n}(f(X_n)) - E_{P_n}(f_\varepsilon(X_n))| &< \varepsilon + P_n(X_n \notin I) \quad \forall n, \\ &\leq 2\varepsilon \text{ kun } n \text{ on tarpeeksi suuri.} \end{aligned}$$

Myös

$$\begin{aligned} |E_{P_n}(f_\varepsilon(X_n)) - E_P(f_\varepsilon(X))| &< \sum_{j=1}^m |f(x_j)| |P_n(X_n \in I_j) - P(X \in I_j)| \\ &\leq \|f\|_\infty \sum_{j=1}^m |P_n(X_n \in I_j) - P(X \in I_j)| \longrightarrow 0 \text{ kun } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Kolmio epäyhtälön avulla

$$\begin{aligned} |E_{P_n}(f(X_n)) - E_P(f(X))| &\leq \\ |E_{P_n}(f(X_n)) - E_{P_n}(f_\varepsilon(X_n))| &+ |E_{P_n}(f_\varepsilon(X_n)) - E_P(f_\varepsilon(X))| + |E_P(f_\varepsilon(X)) - E_P(f(X))| \\ &\leq 5\varepsilon \quad \text{kun } n \text{ on tarpeeksi suuri, ja väite seuraa.} \end{aligned}$$

Sanotaan B on F_X jatkuvuuden joukko jos $P(X \in \partial B) = 0$. Kun $F_X(x)$ ei ole jatkuva, edellinen argumentti menee läpi jos voidaan valita kaikki suorakulmaisia joukkoja I ja I_k jatkuvuuden joukoiksi. Tämä on mahdollista koska jokaiselle satunnaisvektorin $X(\omega) = (X^{(1)}(\omega), \dots, X^{(d)}(\omega))$ koordinaateille, joukko

$$\left\{ r \in \mathbb{R} : P(X^{(i)}(\omega) = r) > 0 \right\}$$

on korkeintaan numeroituva. Siis on olemassa joukkoja $Q_i \subseteq \mathbb{R}, i = 1, \dots, n$ joilla on numeroituva komplementti ja jokainen suorakulmainen joukko joilla on kulmat tulojoukossa $Q_1 \times Q_2 \times \dots \times Q_d$ on kertymäfunktion $F_X(x)$ jatkuvuuden joukko.

(3) \implies (5) Olkoon $U \subseteq \mathbb{R}^d$ avoin. Määritellään Lipschitz funktioden jono

$$f_n(x) := nd(x, U^c) \wedge 1 \quad \text{jolla } 0 \leq f_n(x) \uparrow \mathbf{1}_U(x)$$

jolla $|f_n(x) - f_n(y)| \leq n|x - y|$. Tässä $d(x, A) := \inf_{y \in A} |x - y|$. Kaikille $m \in \mathbb{N}$,

$$\liminf_n P_n(X_n \in U) \geq \liminf_n E_{P_n}(f_m(X_n)) = E_P(f_m(X))$$

Kun $m \uparrow \infty$, monotonisen konvergenssin lauseesta seuraa $E_P(f_m(X)) \uparrow P(X \in U)$.

5) \iff 6) ottaamalla joukkojen komplementteja.

$$(5) + (6) \implies (7)$$

$$P(X \in \overset{\circ}{B}) \leq \liminf_n P_n(X_n \in \overset{\circ}{B}) \leq \limsup_n P_n(X_n \in \overline{B}) \leq P(X \in \overline{B})$$

Jos $P(X \in \partial B) = 0$, kaikki epäyhälöt ovat yhtälöitä, ja $P(X \in B) = \lim_n P_n(X_n \in B)$.

(7) \implies (1) Jos x on kuvauksen $x \mapsto P(X \leq x)$ jatkuvuuden piste, suorakulmainen joukko $B = (-\infty, x] = (-\infty, x_1] \times \cdots \times (-\infty, x_d]$ on jatkuvuuden joukko.

$$(2) \implies (4) \text{ Koska } 0 \leq f(x), \forall k \in \mathbb{N}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_{P_n}(f(X_n) \wedge k) = E_P(f(X) \wedge k),$$

ja monotonisen konvergenssin lauseesta $E_P(f(X) \wedge k) \uparrow E_P(f(X))$ kun $k \uparrow \infty$.

Olkoon $\varepsilon > 0$. Kun k on tarpeeksi suuri,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} E_{P_n}(f(X_n)) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} E_{P_n}(f(X_n) \wedge k) = E_P(f(X) \wedge k) \geq E_P(f(X)) + \varepsilon$$

ja väite on osoitettu koska ε on mielivaltainen.

$$(4) \implies (2) \text{ Olkoon } f(x) \text{ jatkuva ja rajoitettu.}$$

Voidaan olettaa $0 \leq f(x) \leq \|f\|_\infty$, muuten osoitetaan erikseen väite rajoitetuille jatkuville funktioille $f^+(x), f^-(x) \geq 0$.

$$\text{Koska } g(x) := \|f\|_\infty - f(x) \geq 0, \text{ seuraa}$$

$$\|f\|_\infty - \limsup_n E_{P_n}(f(X_n)) = \liminf_n E_{P_n}(g(X_n)) \geq E_P(g(X)) = \|f\|_\infty - E_P(f(X))$$

ja koska $\liminf_n E_{P_n}(f(X_n)) \geq E_P(f(X))$, seuraa

$$E_P(f(X)) \geq \limsup_n E_{P_n}(f(X_n)) \geq \liminf_n E_{P_n}(f(X_n)) \geq E_P(f(X)) \quad \square$$

Teoreema 11.0.1. (Jatkuvan kuvauksen lause) Olkoon $C \subseteq \mathbb{R}^d$ jolla $P(X \in C) = 1$, ja $g : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$ joka on jatkuva kaikissa pisteissä $x \in C$. Silloin jos $X_n \xrightarrow{d} X$, seuraa $g(X_n) \xrightarrow{d} g(X)$.

Tod. Jos $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ on jatkuva ja rajoitettu, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ on myös jatkuva ja rajoitettu, ja koska $X_n \xrightarrow{d} X$, seuraa

$$E_{P_n}(f(g(X_n))) \rightarrow E_P(f(g(X))). \quad \square$$

Seuraus 11.0.1. (Slutskyn lemma) Jos (X_n, Y_n) ovat satunnaismuuttujat todennäköisyysavaruuksissa $(\Omega_n, \mathcal{F}_n, P_n)$ ja $X_n \xrightarrow{d} c, Y_n \xrightarrow{d} Y$, seuraa

1. $(X_n, Y_n) \xrightarrow{d} (c, Y)$
2. $(X_n + Y_n) \xrightarrow{d} (c + Y)$
3. $X_n Y_n \xrightarrow{d} cY$
4. $\frac{Y_n}{X_n} \xrightarrow{d} \frac{Y}{c}$ kun $c \neq 0$.

Huomautus 11.0.2. Huomataan, jos $X_n \xrightarrow{d} X$ ja $Y_n \xrightarrow{d} Y$, yleisesti ei seuraa että pareina $(X_n, Y_n) \xrightarrow{d} (X, Y)$, koska ei ole mitään tietoa (X_n, Y_n) :n ja (X, Y) :n yhteisistä jakaumista. Tämä pätee pelkästään kun jommankumman jakauman raja on pistemassa.

Tod (1). Huomataan ensin että

$$(c, Y_n) \xrightarrow{d} (c, Y).$$

tämä seuraa koska jos $f(x, y)$ jatkuva ja rajoitettu testi-funktio, väite seuraa koska kuvaus $y \mapsto f(c, y)$ on jatkuva ja rajoitettu.

Jos $f(x, y)$ on jatkuva ja rajoitettu,

$$\begin{aligned} & |E_{P_n}(f(X_n, Y_n)) - E_P(f(c, Y))| \leq \\ & |E_{P_n}(f(X_n, Y_n) - f(c, Y_n))| + |E_{P_n}(f(c, Y_n)) - E_P(f(c, Y))| \end{aligned}$$

jossa $E_{P_n}(f(c, Y_n)) \rightarrow E_P(f(c, Y))$.

Olkoon $Z_n := (X_n, Y_n) - (c, Y_n)$, osoitamme että $Z_n \xrightarrow{d} \mathbf{0}$.

Tämä seuraa Portmanteau lemman viidennestä pykälästä, kun osoitamme $\forall \varepsilon > 0$

$$1 = \liminf_n P(|(X_n, Y_n) - (c, Y_n)| < \varepsilon)$$

joka on tosi koska $X_n \xrightarrow{P_n} c$ ja $\lim_n P(|X_n - c| < \varepsilon) = 1$.

Portmanteaun lemman pykälä soveltuu sitten avoimille joukolle $U \subseteq \mathbb{R}^2$, jossa

$$\liminf_n P(|(X_n, Y_n) - (c, Y_n)| \in U) = \mathbf{1}_U(0) = P(0 \in U)$$

(2),(3),(4) seuraavat sitten (1) ja jatkuvan kuvausken lauseesta 11.0.1 \square .

Huomautus 11.0.3. (Van Der Vaartin kirjasta 'Asymptotic Statistics'): Slutsky's lemman pykälät (4) sovelutuvat myös kun X_n, c, Y_n, Y ovat matriisi arvoisia ja c on $d \times d$ kääntyvä matriisi. Matriisin käänös on jatkuva kuvaus $\mathbb{R}^{d \times d} \rightarrow \mathbb{R}^{d \times d}$ kaikissa pisteissa jossa matriisi on kääntyvä.

Määritelmä 11.0.2. Satunnaismuuttujien jono $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ on tiukka (engl. tight) kun

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \sup_n P_n(|X_n| > K) = 0$$

Lause 11.0.4. (Hellyn valinta lause)

- Olkoon $(F_n : n \in \mathbb{N})$ kertymäjkaumien jono. On olemassa alijono F_{n_k} ja ei-vähenevä oikealta jatkuva $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ jolla $F_{n_k}(t) \rightarrow F(t)$ kaikissa t jossa $F(t) = F(t-)$.
- Ilman lisäoletuksia, rajafunktio $F(t)$ ei ole välttämättä kertymäfunktio, eli

$$F(+\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} F(t) \leq 1 \text{ ja } F(-\infty) = \lim_{t \rightarrow -\infty} F(t) \geq 0$$

jossa epäyhtälöt saavat olla aitoja. Seuraava tulos on Prohorovin lause:

Jos jono $(F_n : n \in \mathbb{N})$ on tiukka, kaikki alijonojen rajafunktiot F ovat kertymäfunktioita.

Tod.

Olkoon $\mathbb{Q} = \{\mathbb{Q}_n : n \in \mathbb{N}\}$ rationaali lukujen numerointi.

Koska $F_n(q_1) \in [0, 1]$ joka on kompakti, on olemassa alijono $n(1, k)$ ja rajapiste $G(q_1)$ jolla $F_{n(1,k)}(q_1) \rightarrow G(q_1)$.

Koska $F_{n(1,k)}(q_1) \in [0, 1]$ on olemassa alijonon alijono $n(2, k)$ ja rajapiste $G(q_2)$ jolla $F_{n(2,k)}(q_1) \rightarrow G(q_1)$ ja $F_{n(2,k)}(q_2) \rightarrow G(q_2)$ kun $k \rightarrow \infty$.

Induktiivisesti, kaikille i on olemassa alijono $\{n(i, k) : k \in \mathbb{N}\}$ ja raja-arvot joilla $\forall j = 1, \dots, i. F_{n(i,k)}(q_j) \rightarrow G(q_j)$ kun $k \rightarrow \infty$.

Olkoon $n_k = n(k, k)$ diagonaali jono. Seuraa että $\forall q \in \mathbb{Q}, F_{n_k}(q) \rightarrow G(q)$ kun $k \rightarrow \infty$. Koska kertymäfunctiot F_n ovat ei väheneviä, myös kuvaus $q \mapsto G(q)$ on ei-vähenevä.

Olkoon $\forall t \in \mathbb{R}$

$$F(t) := \inf\{G(q) : q \in \mathbb{Q} \text{ ja } q > t\}$$

Kun t kasvaa inf pienemmästä joukosta ei-vähene, $F(t)$ on ei-vähenevä. $F(t)$ on oikealta jatkuva: kun $\varepsilon > 0, \exists q > t$ jolla $\forall t \leq t' < q,$

$$F(t') - \varepsilon \leq G(q) - \varepsilon \leq F(t) \leq F(t') \leq G(q)$$

Osoitamme että jos $F(t) = F(t-)$ seuraa $F_n(t) \rightarrow F(t)$.

$\forall \varepsilon > 0$ On olemassa $s < t$ jolla $F(s) < F(t) < F(s) + \varepsilon$. Olkoon $r, q \in \mathbb{Q}$ jolla $s < r < t < q$ ja $G(q) < F(t) + \varepsilon$. Koska

$$F_n(r) \leq F_n(t) \leq F_n(q)$$

väite seuraa arviosta

$$F(t) - \varepsilon < F(s) \leq G(r) \leq \liminf_n F_n(t) \leq \limsup F_n(t) \leq G(q) < F(t) + \varepsilon$$

jossa ε on mielivaltainen.

Jos $\{F_n : n \in \mathbb{N}\}$ on tiukka, määritelmästä seuraa että

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \inf_{n \in \mathbb{N}} F_n(K) = 1, \quad \lim_{K \rightarrow -\infty} \sup_{n \in \mathbb{N}} F_n(K) = 0$$

ja koska kun $K \in \mathbb{Q}$

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} F_n(K) \leq \lim_{n \in \mathbb{N}} F_n(K) = G(q)$$

tästä seuraa että $\lim_{K \rightarrow \infty} G(K) = \lim_{K \rightarrow \infty} F(q) = 1$. Samoin

$$\lim_{K \rightarrow -\infty} G(K) = \lim_{K \rightarrow -\infty} F(q) = 0.$$