

Verkoista (engl. net)

kts. esim. [Kelley: General topology], [Väisälä: Top. II, s. 28-29]

Jonolla avaruudessa  $X$  tarkoitetaan funktiota  $S: \mathbb{N} \rightarrow X$ . Sen jäseniä merkitään jatkossa  $S_n$  tai  $S(n)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

Jono  $S$  suppenee kohti pistettä  $x \in X$ , jos jostaista  $x$ :n ympäristiä  $U$  kohti on olemassa sellainen  $n_0 \in \mathbb{N}$ , että  $S_n \in U$ , kun  $n \geq n_0$ .

Huomataan, että suppenemisen määritelmässä käytetään oleellisesti  $\mathbb{N}$ :n järjestyksrelaatiota, mutta ei muita  $\mathbb{N}$ :n ominaisuuksia, laskeutoimitusta tms.

Osajonon käsite voidaan määrittää seuraavasti: jos  $S: \mathbb{N} \rightarrow X$  on jono ja  $N: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  on aidosti kasvava funktio, niin yhdiste  $T = S \circ N: \mathbb{N} \rightarrow X$  on  $S$ :n osajono.

Yleisessä tilanteessa tämä ei osoittautu hyväksi määritelmäksi, vaan käytetään ideaa: "kun  $i$  tulee suureksi, myös  $N(i)$  tulee suureksi".

Tarkemmin:  $T$  on  $S$ :n osajono  $\Leftrightarrow$  on olemassa  $N: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  s.e.  $T = S \circ N$  ja  $\forall m \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N}$  s.e.  $N(i) \geq m$  kun  $i \geq n$ .

$N_1$ -avaruuksissa avaruuden topologia voidaan ilmaista jonojen ja niiden suppenemisen avulla. Esim. jos  $X$  on  $N_1$  top. avaruus ja  $A \subset X$ , niin:  
 $x \in \bar{A} \Leftrightarrow \exists$  jono  $A$ :n pisteitä, joka suppenee pisteeseen  $x$ .  
 $\leftarrow$  [Väisälä: Top. II, Laure 12.8]

Esim. B.1. [Väisälä, harj. teht. 7:5]

$X =$  tuloavaruus  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$  (kaikki funktiot  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ )

$A \subset X$  on kaikkien äärellisten joukkojen karakterististen funktioiden joukko.

Tällöin vakiofunktio  $g$ ,  $g(x) = 1$ , kuuluu  $A$ :n sulkeumaan, mutta mikään  $A$ :n jono ei suppene kohti  $g$ :tä.

Pal. mieleen merkintä:  $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ,  $f$ :n " $x$ -koordinaatti"  
 $f_x$  on  $f$ :n arvo  $f(x)$   
 (vrt. [Väisälä, 7.4])

1)  $g$ :n kantaympäristö tulovarmudessa  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$  on muotoa

$$U = \prod_{a \in \mathbb{R}} U_a, \text{ missä } U_a \text{ on luvun } 1 \text{ ympäristö } \mathbb{R} \text{:ssä}$$

jokaisella  $a \in \mathbb{R}$  ja  $U_a \neq \mathbb{R}$  vain äärell. monella  $a \in \mathbb{R}$ ;  
merk.  $B = \{a \in \mathbb{R} \mid U_a \neq \mathbb{R}\}$ ,  
 $B$  äärellinen.

Karakteristinen funktio  $\chi_B \in A^{\mathbb{R}}$  on funktio

$$(\chi_B)_a = \chi_B(a) = \begin{cases} 1, & a \in B \\ 0, & a \notin B. \end{cases}$$

Nyt  $(\chi_B)_a \in U_a$  jokaisella  $a$ , eli  $\chi_B \in U$ .  
Siis jokainen  $g$ :n ympäristö sisältää joukon  $A$  alkion, eli  $g \in \bar{A}$ .

2) Olkoon  $(f_n)$  mielivalt. jono  $A$ :n alkioita, eli  $f_n = \chi_{B_n}$ ,  
missä  $B_n \subset \mathbb{R}$  ovat äärellisiä joukkoja,  $n = 1, 2, \dots$

Nyt  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$  on numeroitava, joten se on  $\neq \mathbb{R}$ ,

ja löytyy  $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ . Siis  $f_n(x_0) = 0 \forall n$ .

Jos olisi  $f_n \rightarrow g$ , niin [Väisälä, Lause 7.13]  
 $\Rightarrow f_n(x) \rightarrow g(x) \forall x$ , mutta  $f_n(x_0) \not\rightarrow g(x_0) = 1$ .  
" 0 □ Esim. 1.

- Määr. B. 2. Joukon  $D$  relaatio  $\geq$  on suuntaus, jos  $D \neq \emptyset$  ja
- (1) jos  $m \geq n$  ja  $n \geq p$ , niin  $m \geq p \quad \forall m, n, p \in D$
  - (2)  $m \geq m \quad \forall m \in D$
  - (3) jos  $m, n \in D$ , niin  $\exists p \in D$  s.e.  $p \geq m$  ja  $p \geq n$ .

Joukko  $D$  varustettuna suuntauksella on suunnattu joukko.

Esim. • jokainen  $A \subset \mathbb{R}$  on suunnattu joukko (tavallinen  $\mathbb{R}$ :in  $\geq$ )  
• jos  $X$  on topologinen avaruus ja  $a \in X$ , niin pisteen ympäristöt muodostavat suunnatun joukon kun määritellään  
 $U \geq V \Leftrightarrow U \subset V$ .

Ehdot (1) ja (2) ovat selvästi voimassa.

Ehto (3): jos  $U$  ja  $V$  ovat  $a$ :n ymp., niin  $U \cap V$  on  $a$ :n ymp.  
ja  $U \cap V \geq U$  ja  $U \cap V \geq V$ .

(• vastaava kuin edellä, mutta  $U \geq V \Leftrightarrow U \supset V$ .)

Määr. B.3 Avaruuden  $X$  verkolla tarkoitetaan kuvausta  $\varphi: D \rightarrow X$ , missä  $(D, \geq)$  on suunnattu joukko.

Verkko  $\varphi$  suppenee kohti pistettä  $a \in X$ , jos jokaista  $a$ :n ympäristöä  $U$  kohti on olemassa sellainen  $\lambda \in D$ , että  $\varphi(\alpha) \in U \forall \alpha \geq \lambda$ . Merk.  $\varphi \rightarrow a$ .

Piste  $a \in X$  on verkon  $\varphi$  kasautumisarvo (engl. cluster point), jos jokaista  $a$ :n ympäristöä  $U$  ja jokaista  $\alpha \in D$  kohti on olemassa  $\beta \in D$ , s.e.  $\beta \geq \alpha$  ja  $\varphi(\beta) \in U$ .

Tapauksessa  $(D, \geq) = (\mathbb{N}, \geq)$  saadaan jonon, jonon suppenemisen ja jonon kasautumisarvon käsitteet.

Joitakin sanontatapoja: Verkko  $\varphi$  on joukossa  $A$  ( $A \subset X$ ), jos  $\varphi(\alpha) \in A \forall \alpha \in D$ . Verkko  $\varphi$  on lopulta joukossa  $A$  (engl. eventually), jos  $\exists \lambda \in D$  s.e.  $\varphi(\alpha) \in A \forall \alpha \geq \lambda$  (vrt. suppeneminen). Verkko  $\varphi$  on toistuvasti joukossa  $A$  (engl. frequently), jos  $\forall \alpha \in D \exists \beta \in D$  s.e.  $\beta \geq \alpha$  ja  $\varphi(\beta) \in A$  (vrt. kasautumisarvo).

Suunnatun joukon  $D$  osajoukko  $D'$  on kofinaalinen (engl. cofinal), jos  $\forall \alpha \in D \exists \beta \in D'$  s.e.  $\beta \geq \alpha$ . Kofinaalinen osajoukko on myös suunnattu joukko.

Esim.  $\mathbb{N}$ :ssä kofinaalinen = ei ylhäältä rajoitettu.

Havainto: Verkko  $\varphi$  on toistuvasti joukossa  $A$

$(\Leftrightarrow) \exists$  kofinaalinen  $D' \subset D$  s.e.  $\varphi(D') \subset A$

20.11.13  $(\Leftrightarrow) \varphi$  ei ole lopulta  $(X \setminus A)$ :ssa.

Teoreema B.4. Olk.  $X$  topologinen avaruus,  $A \subset X$ ,  $a \in X$ .

Tällöin  $a \in \bar{A} \Leftrightarrow \exists$  verkko joukossa  $A$ , joka suppenee kohti  $a$ :ta.

Tod. " $\Leftarrow$ " ol.  $\varphi$  verkko joukossa  $A$ ,  $\varphi \rightarrow a$ .

Olk.  $U$  pisteen  $a$  mielivalt. ympäristö. Koska  $\varphi \rightarrow a$ , ympäristöstä  $U$  löytyy verkon  $\varphi$  pistettä, eli joukon  $A$  pistettä. Siis  $a \in \bar{A}$ .

" $\Rightarrow$ " Olk.  $D$  kaikkien pisteen  $a$  ympäristöjen kokoelma, suuntauksena  $U \geq V \Leftrightarrow U \subset V$ .

Koska  $a \in \bar{A}$ , jokaisesta ympäristöstä  $U$  löytyy piste  $x_U \in U \cap A$ .  
 Nyt  $\varphi: D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $U \mapsto x_U$ , on verkko  $\mathbb{R}$ :ssä.  $A$ :ssa  
 lisäksi  $\varphi \rightarrow a$ : olk.  $U$  ain ympäristö. Jos  $V \geq U$ ,  
 on siis  $\varphi(V) = x_V \in V \subset U$ , joten suppenemisen määritelmän  
 ehto on voimassa.  $\square$

Teoreema B.5. Topologinen avaruus  $\mathbb{X}$  on Hausdorffin avaruus

$\Leftrightarrow$  jokainen verkko  $\mathbb{X}$ :ssä suppenee korkeintaan yhtä  
 pistettä kohti.

Tod. HT.  $\square$

Jos  $(D, \geq)$  ja  $(E, >)$  ovat suunnattuja joukkoja, määritellään  
 tulojoukkoon  $D \times E$  suuntaus  $\Rightarrow$  seuraavasti:

$$(d, e) \geq (f, g) \Leftrightarrow d \geq f \text{ ja } e > g.$$

Vastaavalla idealla saadaan määriteltyä suuntaus mielivaltaiseen  
 tuloavaruuksien  $\prod_{\alpha \in A} D_\alpha$ , jos jokainen  $D_\alpha$  on suunnattu joukko.  
 Ei ole vaikeaa tarkistaa, että näin saatu relaatio on suuntaus.

Esim.  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}: f \geq g \Leftrightarrow f(x) \geq g(x) \forall x \in \mathbb{R}.$

Seuraavaksi määritellään osaverkon (engl. subnet) käsite.

Määr. B.6. Verkko  $\varphi: D \rightarrow \mathbb{X}$  on verkon  $\mathcal{N}: E \rightarrow \mathbb{X}$  osaverkko,  
 jos on olemassa funktio  $N: D \rightarrow E$  s.e.

$$1) \varphi = \mathcal{N} \circ N: D \rightarrow E \rightarrow \mathbb{X}$$

$$2) \forall m \in E \exists n \in D \text{ s.e. jos } p \geq n, \text{ niin } N(p) \geq m.$$

Tärkeä havainto:

Lemma B.7. Jos verkko  $\mathcal{N}$  on lopulta joutkassa  $A \subset \mathbb{X}$ , niin  
 myös osaverkko  $\varphi = \mathcal{N} \circ N$  on lopulta joutkassa  $A$ .

Tod. Koska  $\mathcal{F}$  on lopulta joukossa  $A$ , niin  $\exists m \in E$  s.e.  
 $\mathcal{F}(\alpha) \in A$ , kun  $\alpha \geq m$ . Osaverkon määr. ehto 2)  $\Rightarrow$   
 $\exists n \in D$  s.e.  $N(p) \geq m$  kun  $p \geq n$ .  
 Siis kun  $p \geq n$ , on  $\mathcal{F}(p) = \mathcal{F}(N(p)) \in A$ ,  
 eli  $\mathcal{F}$  on lopulta joukossa  $A$ .  $\square$

Kor. Verkko suppenee  $\rightarrow a \Rightarrow$  jatkuva sen osaverkko  $\rightarrow a$ .

Huom. Jos  $D$  on  $E$ 'n kohtalainen osajoukko, niin inklusio  $N: D \rightarrow E$  toteuttaa osaverkon määritelmän ehdot. Tietyissä tilanteissa tämä riittää osaverkon määritelmäksi, mutta ei kaikissa. Tarvitaan siis y.o. yleisempi määritelmä.

Lemma B.8. Olk.  $\mathcal{F}$  verkko  $E \rightarrow \mathbb{I}$ ,  $\mathcal{A}$  joukko  $\mathbb{I}$ 'n osajoukkoja  
 s.e.  $\forall A, B \in \mathcal{A} \exists C \in \mathcal{A}$  s.e.  $C \subset A \cap B$  (\*).

Ol. lisäksi, että  $\mathcal{F}$  on toistuvasti  $\mathcal{A}$ 'ssa  $\forall A \in \mathcal{A}$ .

Tällöin on ol.  $\mathcal{F}$ 'n osaverkko  $\mathcal{G}$  s.e.  $\mathcal{G}$  on lopulta  $\mathcal{A}$ 'ssa  $\forall A \in \mathcal{A}$ .

Tod. Oletuksesta (\*) seuraa, että  $\mathcal{A}$  on suunnattu joukko,  
 kun määr.  $A \geq B \Leftrightarrow A \subset B$ .

Olkaon

$$D = \{ (m, A) \mid m \in E, A \in \mathcal{A} \text{ ja } \mathcal{F}(m) \in A \},$$

jolloin  $D$  on suunnattu joukko tulo-suuntauksen suhteen:

ehto (3): jos  $(m, A), (n, B) \in D$ , niin  $\exists C \in \mathcal{A}$  s.e.  $C \subset A \cap B$

eli  $C \geq A$  ja  $C \geq B$ . Lisäksi  $\exists p \in E$  s.e.

$$p \geq m, p \geq n \text{ ja } \mathcal{F}(p) \in C,$$

koska  $\mathcal{F}$  on toistuvasti joukossa  $C$ .

Nyt  $(p, C) \in D$  ja  $(p, C) \geq (m, A)$  sekä  $(p, C) \geq (n, B)$ .  $\square$ (3)

Määritellään  $N: D \rightarrow E$

$$(m, A) \mapsto m$$

ja osoitetaan, että  $\mathcal{G} = \mathcal{F} \circ N$  on  $\mathcal{F}$ 'n osaverkko:

ehto 2): olk.  $m \in E$ . Val.  $A \in \mathcal{A}$ . Koska  $\mathcal{F}$  on toistuvasti  
 joukossa  $A$ , niin  $\exists n \geq m$  s.e.  $\mathcal{F}(n) \in A$  eli  $(n, A) \in D$ .

Jos nyt  $(p, B) \geq (n, A)$ , on

$$N(p, B) = p \geq n \geq m \quad \text{eli B.6 ehto 2) on voimassa.}$$

Siis  $\mathcal{G}$  on osaverkko.

Olk. sitten  $A \in \mathcal{A}$ , Os. että  $\varphi$  on lopulta  $A$ :ssa: (B6)

olk.  $m \in E$  mielivalt. s.e.  $\varphi(m) \in A$ . Tällöin  $(m, A) \in D$ , osoitetaan, että  $(m, A)$  kelpaa määntelmän rajaksi  $\lambda$ .

Olk.  $(n, B) \in D$ ,  $(n, B) \geq (m, A)$ . Nyt  $\varphi(n, B) = \varphi \circ N(n, B) = \varphi(n) \in B \subset A$ . ok.  
koska  $(n, B) \geq (m, A)$   
koska  $(n, B) \in D$  □

Teoreema B.9.  $X$  top. avaruus,  $s \in X$ ,  $\varphi$  verkko  $X$ :ssä.

Piste  $s$  on verkon  $\varphi$  kasautumisarvo

$\Leftrightarrow \exists \varphi$ :n osaverkko  $\mathcal{Q}$ , jolle  $\mathcal{Q} \rightarrow s$ ,

Tod. " $\Rightarrow$ " ol.  $s$   $\varphi$ :n kasautumisarvo ja olk.  $\mathcal{A}$  kaikkien  $s$ :n ympäristöjen kokoelma. Tällöin kahden  $A$ :n jäsenen leikkaus  $\in \mathcal{A}$ , lisäksi verkko  $\varphi$  on toistuvasti joukossa  $A \forall A \in \mathcal{A}$ .

B.8.  $\Rightarrow \exists \varphi$ :n osaverkko  $\mathcal{Q}$ , joka on lopulta  $A$ :ssa  $\forall A \in \mathcal{A}$ , t.s.  $\mathcal{Q} \rightarrow s$ .

" $\Leftarrow$ " ol. että  $s$  ei ole verkon  $\varphi$  kasautumisarvo.

Tällöin  $\exists s$ :n ympäristö  $U$  s.e.  $\varphi$  ei ole toistuvasti  $U$ :issa, joten  $\varphi$  on lopulta komplementissä  $X \setminus U$ .

B.7  $\Rightarrow \varphi$ :n jokainen osaverkko on lopulta  $(X \setminus U)$ :ssa, joten mitkään osaverkko ei voi  $\rightarrow s$ . □

Jatkuvuus voidaan karakterisoida verkkojen avulla samoin kuin metrisissä avaruuksissa jonojen avulla.

Teoreema B.10. Olk.  $X, Y$  top. avaruuksia,  $f: X \rightarrow Y$  funktio,  $s \in X$ .

Tällöin  $f$  on jatkuva pisteessä  $s$

$\Leftrightarrow$  jokaisella verkolla  $\mathcal{Q}$   $X$ :ssä, jolla  $\mathcal{Q} \rightarrow s$  pätee  $f \circ \mathcal{Q} \rightarrow f(s)$ .

Tod. " $\Rightarrow$ ": olk.  $\mathcal{Q}$  verkko  $X$ :ssä,  $\mathcal{Q} \rightarrow s$ .

olk.  $U$  pisteen  $f(s)$  ympäristö  $Y$ :ssä.

Koska  $f$  on jatkuva, on olemassa pisteen  $s$  ympäristö  $V$   $X$ :ssä, s.e.  $f(V) \subset U$ .

Koska  $\mathcal{Q} \rightarrow s$ , niin  $\mathcal{Q}$  on lopulta joukossa  $V$ , joten (koska  $f(V) \subset U$ )  $f \circ \mathcal{Q}$  on lopulta joukossa  $U$ .  
Siis  $f \circ \mathcal{Q} \rightarrow f(s)$ .

" $\Leftarrow$ " [Väisälä, Lause 3.2]  $\Rightarrow$  riittää osoittaa, että jos  $A \subset \bar{X}$  ja  $s \in \bar{A}$ , niin  $f(s) \in \overline{fA}$ .

(B7)

Ollk. siis  $A \subset \bar{X}$  ja  $s \in \bar{A}$ .

Koska  $s \in \bar{A}$ , niin B.4  $\Rightarrow \exists$  verkko  $\varphi$   $A$ -ssa,  $\varphi \rightarrow s$ .  
Tällöin  $f \circ \varphi$  on verkko joukossa  $fA$  ja oletuksen nojalla  $f \circ \varphi \rightarrow f(s)$ .

Nyt B.4  $\Rightarrow f(s) \in \overline{fA}$ .  $\square$

25.11.13

Samoin kompaktilisuus:

Teoreema B.11, Topologiselle avaruudelle  $X$  seuraavat ehdot ovat yhtäpitäviä:

(1)  $X$  on kompakti

(2) jokaisella verkolla  $X$ -ssä on kasautumisarvo ( $X$ -ssä)

(3) jokaisella verkolla  $X$ -ssä on osaverkko, joka suppenee ( $X$ -ssä).

[Palautetaan ensin mieleen [Väisälä, s. 119]:

kokoelmalla  $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$  on äärellisten leikkausten ominaisuus (ÄLO),

jos  $\bigcap A \neq \emptyset$  kaikilla äärellisillä  $A$ , joilla  $\emptyset \neq A \subset \mathcal{F}$ .

Esim. välien kokoelmalla  $\mathcal{F} = \{ [n, \infty[ \mid n \in \mathbb{N} \}$  on ÄLO, vaikka  $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$ .

15.9. Laure S.E.Y.:

(1)  $X$  on kompakti

(2) Olkoon  $\mathcal{F}$  kokoelma  $X$ -in sulji. osajoukkoja ja olk.  $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$ .

Tällöin  $\exists$  äärellinen  $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}$  s.e.  $\bigcap \mathcal{F}_0 = \emptyset$

(3) Jos  $\mathcal{F}$  on kokoelma  $X$ -in suljettuja osajoukkoja ja jos  $\mathcal{F}$ -llä on ÄLO, niin  $\bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset$ .

Tod. (1)  $\Rightarrow$  (2): oli  $X$  kompakti,  $\varphi: (D, \geq) \rightarrow X$  verkko.

Jokaisella  $n \in D$  määr.

$$A_n = \{ \varphi(m) \mid m \geq n \},$$

Koska  $D$  on suunnattu joukko, on kokoelmalla  $\{A_n\}_{n \in D}$  ÄLO:

jos  $n_1, \dots, n_k \in D$ , niin määritelmän B.2 (3) nojalla

$\exists p \in D$  s.e.  $p \geq n_1, \dots, p \geq n_k$ . Tällöin  $\varphi(p) \in \bigcap_{i=1}^k A_{n_i}$ .

Myös kokoelmalla  $\{\bar{A}_n\}_{n \in D}$  on ÄLO.

Koska  $X$  on kompakti, niin  $\exists s \in \bigcap \bar{A}_n$ .

Nyt  $s$  on  $\mathcal{Q}$ :n kasautumisarvo, mistä väite seuraa:

Jos  $s$  ei olisi  $\mathcal{Q}$ :n kas. arvo, sillä olisi ympäristö  $U$  ja olisi olemassa  $n \in \mathbb{D}$  s.e.  $\mathcal{Q}(m) \notin U \ \forall m \geq n$ .

Tällöin olisi  $U \cap A_n = \emptyset$  eli  $s \notin \bar{A}_n$ , ristiriita.

(2)  $\Rightarrow$  (1): olk., että  $X$  on top. avaruus, jonka jokaisella verkolla on kasautumisarvo ja  $\mathcal{A}$  perhe  $X$ :n sulj. osajoukkoja, jolla on  $\bar{A}LO$ .

Määr.  $\mathcal{B} = \mathcal{A}$ :n jäsenten äärellisten leikkausten kokoelma.

Myös kokelmalla  $\mathcal{B}$  on  $\bar{A}LO$ .

Lisäksi koska  $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$ , riittää os. että  $\bigcap_{B \in \mathcal{B}} B \neq \emptyset$ .

Koska  $C \cap D \in \mathcal{B} \ \forall C, D \in \mathcal{B}$ , niin  $(\mathcal{B}, \supseteq)$  on suunnattu joukko, kun määritellään  $C \supseteq D \Leftrightarrow C \subset D$ .

Määritellään verkko  $\mathcal{Q}: (\mathcal{B}, \supseteq) \rightarrow X$  valitsemalla jokaisella  $B \in \mathcal{B}$  alkio  $\mathcal{Q}(B) \in B \subset X$ .

Oletuksen nojalla verkolla  $\mathcal{Q}$  on kasautumisarvo  $s \in X$ .

Os., että  $s \in B \ \forall B \in \mathcal{B}$ , mistä väite seuraa.

Olk.  $B \in \mathcal{B}$  ja olk.  $C \in \mathcal{B}$  s.e.  $C \subset B$ . Nyt  $\mathcal{Q}(C) \in C \subset B$ , mistä seuraa, että  $\mathcal{Q}$  on lopulta joulkossa  $B$ , koska  $B$  on suljettu, välttämättä kasautumisarvo  $s \in B$ .

(2)  $\Leftrightarrow$  (3): Seuraa Teoreemasta B.9.



Teoreema B.12, Olk.  $X, Y$  top. avaruuksia,  $f: X \rightarrow Y$  suljettu jatkuva kuvaus, jolle  $f^{-1}(y)$  on kompakti  $\forall y \in Y$  (vahva kuvaus, erään bijäällisyydessä esiintyvän määritelmän mukaan).

Olk.  $\mathcal{Q}: (D, \supseteq) \rightarrow X$  verkko s.e. verkko  $f \circ \mathcal{Q} \rightarrow y_0 \in Y$ .

Tällöin verkolla  $\mathcal{Q}$  on olemassa kasautumisarvo  $x \in X$ .

Tod. Merk.  $A_n = \{ \mathcal{Q}(m) \mid m \geq n \} \subset X$ , ja tank. sulkeumia  $\bar{A}_n$ .

Koska  $f$  on suljettu kuvaus, on  $f(\bar{A}_n) \in Y \ \forall n$ , joten  $f(\bar{A}_n) = \overline{f(A_n)}$   $\forall n$ .

Nyt  $f(\mathcal{Q}(m)) \in f(A_n) \ \forall m \geq n$ , joten  $y_0 \in \overline{f(A_n)} = f(\bar{A}_n) \ \forall n \in \mathbb{D}$ .

Tästä seuraa, että

$$f^{-1}(y_0) \cap \bar{A}_n \neq \emptyset \ \forall n. \quad (*)$$



Osoitetaan, että kokoelmalla  $\{f^{-1}(y_0) \cap \overline{A_n}\}_{n \in \mathbb{N}}$  on ÄLO:

olk.  $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$  nyt

$$(f^{-1}(y_0) \cap \overline{A_{n_1}}) \cap \dots \cap (f^{-1}(y_0) \cap \overline{A_{n_k}}) \\ = f^{-1}(y_0) \cap \bigcap_{i=1}^k \overline{A_{n_i}}.$$

Valitaan  $p \in \mathbb{D}$ , jolle pätee  $p \geq n_1, \dots, p \geq n_k$ .

Joukkojen  $A_n$  määritelmästä seuraa nyt, että  $A_p \subset \bigcap_{i=1}^k A_{n_i}$ ,

joten

$$f^{-1}(y_0) \cap \bigcap_{i=1}^k \overline{A_{n_i}} \supset f^{-1}(y_0) \cap \overline{\bigcap_{i=1}^k A_{n_i}} \supset f^{-1}(y_0) \cap \overline{A_p} \stackrel{(*)}{\neq} \emptyset.$$

Siis kokoelmalla on ÄLO, joten (koska  $f^{-1}(y_0)$  on kompakti),  
niin

$$\exists x \in f^{-1}(y_0) \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n}.$$

Tästä seuraa, että  $f(x) = y_0$  ja  $x \in \overline{A_n} \forall n \in \mathbb{N}$ ,

mistä seuraa, että jokaisen  $x$ in ympäristö sisältää joukon  $A_n$

pisteitä  $\forall n$ , joten verkko  $\mathcal{Q}$  on tiivistävä jokaisessa  $x$ in ympäristössä.

Siis  $x$  on verkon  $\mathcal{Q}$  kasaantumisarvo.

□

Edellinen tulos pätee myös toiseen suuntaan :

$X, Y$  Hausdorff

Teoreema B.13. Ol.  $f: X \rightarrow Y$  jatkava kuvaus, jolla on seuraava ominaisuus: jokaisella verkolla  $(x_i)_{i \in I}$   $X$ :ssä, jolla verkko  $(f(x_i))_{i \in I}$  suppenee  $Y$ :ssä, on kasautumisarvo  $X$ :ssä. Tällöin  $f$  on suljettu kuvaus ja  $f^{-1}(y)$  on kompakti  $\forall y \in Y$ .

Tod. Jos  $f$  ei olisi suljettu, olisi olemassa  $A \in X$  s.e.  $fA$  ei sulj.  $Y$ :ssä, eli  $\exists y \in \overline{fA} \setminus fA$ . B.4  $\Rightarrow \exists$  verkko  $(y_i)_{i \in I}$  joukossa  $fA$  s.e.  $y_i \rightarrow y$ . Jokaisella  $i \in I$  valitaan  $x_i \in A$  s.e.  $f(x_i) = y_i$ . Oletuksen nojalla verkolla  $(x_i)_{i \in I}$  on osaverkko  $(x_j)_{j \in J}$  s.e.  $x_j \rightarrow x \in X$ . Koska  $(x_j)$  on verkko  $A$ :ssä ja  $A \in X$ , on  $x \in A$ . Nyt  $f(x_j) \rightarrow f(x)$ , joten  $y = f(x) \in fA$  ristiriita. Siis  $f$  suljettu.

Olk.  $y \in Y$  ja  $(x_i)$  verkko joukossa  $f^{-1}(y)$ . Selvästi verkko  $f(x_i) \rightarrow y$ , joten oletuksen nojalla verkolla  $(x_i)$  on kasautumisarvo joukossa  $f^{-1}(y)$ . Nyt  $f^{-1}(y)$  on kompakti Teoreeman B.11 nojalla.  $\square$